S. 601

8.

MUSÉUM
D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS,

PAR

H. SCHLEGEL.

REVUE MÉTHODIQUE ET CRITIQUE

DES

COLLECTIONS

DÉPOSÉES DANS CET

ÉTABLISSEMENT.

Tome VIII.

CONTENANT:

Monographie 41: TINAMI.

LEIDE, E. J. BRILL.

LES TINAMOUS.

TINAMI.

PAR

H. SCHLEGEL.

Mars 1880.

Les Tinamous forment une tribu d'oiseaux parfaitement isolée et circonscrite, et bornée à la partie de l'Amérique comprise entre le Mexico méridional et la Patagonie. Ils se rattachent, toutefois, naturellement à l'ordre des Gallinae, tout en offrant certaines affinités avec l'ordre des Autruches. Illiger a, le premier, fixé l'attention sur une de ces affinités. Il dit dans son „Prodromus, p. 245", du Tinamus major: „rostri mira conformitas cum rostro Rheae est." — Wagler a été beaucoup plus loin. Il avait reconnu toutes les relations qui existent entre le squelette des Tinamous et celui des Autruches, et va même jusqu'à réunir ces oiseaux dans le même ordre; mais son travail, dont la publication a probablement été arrêtée par la mort prématurée et désastreuse de ce naturaliste ingénieux, ne nous est connu que par une courte notice qu'en a donné le savant Oken, et qui a été empruntée du manuscrit que lui avait communiqué Wagler: voir Oken, Isis, 1832, p.

51. — Depuis, Parker a publié la figure du squelette du Tinamus robustus et exposé les relations qu'il montre avec celui des Gallinae, et Struthiones: voir son mémoire intitulé: „On the Osteology of Gallinaceous birds and Tinamus," dans les Transactions of the Zool. Soc. London, vol 5, 1866, p. 149, pls. 39 et 40. On doit encore un travail sur la myologie des Tinamous à M. Alix: voir le Journal de Zoologie par M. Paul Gervais, tome 3, 1874, pp. 167 et 252; puis tome 5., 1876, p. 411. Ajoutons que la théorie de feu Wagler, a été, de nos jours, de rechef élaborée par le savant anatomiste Huxley dans sa classification des oiseaux.

La taille des Tinamous varie depuis celle d'une forte poule jusqu'à celle de la caille. Au premier aspect, ces oiseaux offrent plus de ressemblance aux perdrix ou aux cailles qu'aux autres Gallinae, aussi sont-ils généralement compris sous ces noms par les Européens, habitans de l'Amérique. Ils en diffèrent, toutefois, sous beaucoup de rapports dans l'ensemble des modifications apportées dans leur organisation et leurs habitudes.

A l'extérieur, ils se font plus particulièrement remarquer par la petitesse de leur tête, par leur cou allongé et revêtu de plumes assez petites, ce qui donne à cet organe une apparence grêle, enfin par les couvertures supérieures de leur queue plus développées. Le bassin offre cela de remarquable que, comme dans les Struthiones, les os pubis ne se trouvent pas soudés le long de la ligne médiane du corps. La gaîne cornée de la mandibule supérieure est encore, comme dans les Autruches, composée de plusieurs pièces; mais cette particularité n'existe pas dans les Rhynchotus, ni dans quelques espèces du sous-genre Nothura. Les pennes caudales sont quelquefois plus ou moins molles, et elles se montrent même, dans la plûpart des Nothures, semblables aux couvertures inférieures de la queue, c'est-à-dire sous la forme d'une sorte de duvet. Les Tinamous se rapprochent encore des Autruches par l'habitude qu' a le mâle de couver les oeufs.

Quant à la construction du bec, il est bon de rappeler que ce ne sont que les Rhynchotes et quelques espèces du sous-genre Nothura, qui ont la gaîne cornée de la mandibule supérieure, comme cela a lieu dans les oiseaux en général, composée d'une pièce unique. Dans toutes les autres espèces de la tribu entière, cette gaîne se trouve, par contre, comme cela se voit chez les Autruches, divisée en trois pièces, savoir: une pièce mitoyenne et deux latérales, et ces pièces sont réunies entre elles par une peau molle; cette construction particulière n'ayant, à ce qu'il paraît, d'autre but que celui produit par la division en plaques ou écailles du tarse des oiseaux, c'est-à-dire celui d'apporter une espèce de mobilité à la gaîne cornée, je suis d'avis qu'elle ne présente qu'un caractère tout-à-fait subordonné. La peau molle de la mandibule se répand, mais seulement dans les sous-genres Tinamus et Crypturus, derrière les narines, pour former une espèce de cire, tandis que, dans les espèces de Nothures à mandibule divisée et dans les Eudromias la pièce mitoyenne n'est séparée des pièces latérales que par un sillon abouchant à la base du bec. Les narines s'ouvrent, dans le sous-genre Tinamus, en avant du milieu de la longueur du bec; dans les Cryptures, sur le milieu ou un peu en arrière du milieu de cet organe; dans les Rhynchotes et les Nothures sur la fin du premier tiers du bec. Ajoutez à ces caractères que la mandibule supérieure est dans les Rhynchotes et plus particulièrement dans les Nothures à mandibule indivisée, applatie, sensiblement courbée vers le bas, et qu'elle offre des bords latéraux tranchants.

Les Tinamous se tiennent à terre, où ils cherchent leur nourriture qui consiste en insectes et leurs larves, en grains et fruits. La plûpart des espèces vit dans les forêts, dont les branches basses des arbres leur servent de perchoir pendant le repos de nuit. Quelques espèces habitant la partie méridionale de l'Amérique du Sud, aiment les plaines couvertes d'herbes touffues: ce sont les Rhynchotes et les Nothures. Les espèces à trois doigts ne fréquentent que les terrains élevés depuis le

Pérou et la Bolivie jusque dans la Patagonie. Le cri des Tinamous est sifflant et mélancolique. La femelle construit son nid composé simplement de quelques branchettes et brins d'herbe dans une faible excavation du sol, et y pond ses oeufs, au nombre de six à douze: ces oeufs sont de forme ovale et ordinairement d'un beau bleu-vert uniforme. C'est, suivant Bartlett, Proc. Zool. Soc. London, 1868, p. 114, le mâle qui prépare le lieu d'incubation et qui couve les oeufs. Il paraît encore, suivant ce même auteur, qu'un seul mâle sert à plusieurs femelles.

La distribution géographique des espèces présente souvent des lois assez exceptionelles. On a pu voir plus haut que les deux espèces à trois doigts ne se trouvent que dans les plaines élevées du Pérou, de la Bolivie, du Chilé et de la Patagonie, et que les espèces fréquentant les herbes touffues ne paraissent habiter que la partie méridionale de l'Amérique du Sud, où il arrive que plusieurs d'entre elles vivent dans la même localité. Quant aux espèces qui ne se tiennent que dans les forêts touffues, il n'est pas rare de leur trouver un cercle de répartition géographique très étendu.

Quoiqu'il en soit, on ne fait, pour le moment, qu'entrevoir l'histoire naturelle des Tinamous, les espèces n'étant, en partie, que très imparfaitement connues. Ce sont plus particulièrement celles introduites dans les temps récents dont on ne se saura faire une idée précise qu'au moyen d'une exposition exacte et comparative de leurs traits distinctifs. Il est évident qu'une exposition pareille ne peut être terminée avec succès qu'au milieu de nombreux objets réunis dans un de ces grands musées, centres de la science. Encore, le naturaliste le plus expérimenté éprouvera-t-il de nombreuses difficultés lorsqu'il s'agit d'exprimer, soit par des paroles, soit par le dessin et le coloris, les fines et variables nuances de couleur que présente le plumage de ces oiseaux, difficultés qui se présentent également lors de l'étude des Mégapodes.

Il est, toutefois, bon de fixer l'attention sur les travaux

consciencieux publiés à ce sujet par M. von Pelzeln [1]); aussi sont-ils basés sur les riches collections, fruits des récoltes de feu Natterer, naturaliste voyageur éclairé et circonspect.

En face des incertitudes, dont je viens de faire mention plus haut, je me suis vu dans la nécessité de me borner, dans mon travail, à ces espèces dont j'ai pu examiner moi-même les dépouilles.

Il est à regretter que dans un travail réduit même dans des limites si étroites, l'on se trouve arrêté, à chaque moment, par l'insuffisance des matériaux. On doit s'étonner à juste titre que les dépouilles de ces oiseaux répandus dans toute l'Amérique chaude soient en général assez rares dans les collections. Wallace et Bates (qui a fait une si longue résidence dans l'Amazonie), ne font pas même mention de ces oiseaux, quoique Natterer et Spix aient recueilli plusieurs espèces dans ces mêmes lieux. Il me semble cependant, que l'ornithologiste, préalablement formé à la chasse au gibier, ne puisse guère rester en défaut de se procurer ces oiseaux, d'autant plus qu'il peut se faire assister par les indigènes, habitués à ces sortes de chasse.

Afin d'établir les espèces d'une manière précise, il est, cependant, d'urgence, d'avoir sous les yeux de chacune d'entre elles des séries d'individus des deux sexes, de tout âge, recueillis dans les différentes saisons, et pourvus de l'indication exacte du sexe, de la date quand ils ont été tués et de la localité particulière de leur provenance.

Ces oiseaux forment naturellement deux grandes divisions, c'est-à-dire, l'on peut détacher de la pluralité des Tinamous à quatre doigts, deux espèces dépourvues de pouce.

Je termine ces généralités, en introduisant, dans ces pages, le nom de M. J. Büttikofer, l'un des aide-naturalistes de notre

---

1) Verhandlungen der zool. botan. Gesellschaft in Wien, 1863, et: Zur Ornithologie Brasiliens, Wien 1870, p. 290 et suivantes. M. von Pelzeln a, entre autres le premier, éclairci la confusion qui existait par rapport aux traits distinctifs et à la synonymie de deux des espèces les plus remarquables, savoir les Tinamus tao et solitarius.

Musée. Après l'avoir initié dans ce travail et dans celui qui va suivre sur les Mégapodes, je l'ai amené, pour compléter mes recherches, dans les Musées de Berlin, Dresden, Vienne, Pesth, Munich et Stuttgardt. Je lui dois des notes, quelques descriptions et plusieurs remarques très judicieuses sur ces oiseaux. Après notre retour, j'ai envoyé ce zélé naturaliste à la côte occidentale d'Afrique, où il explore en ce moment, accompagné de M. G. Sala, l'état de Libéria.

TINAMOUS A QUATRE DOIGTS.

Les Tinamous à quatre doigts se subdivisent de rechef au moyen d'un caractère très facile à saisir et tiré de la nature des plaques dont la face postérieure du tarse se trouve revêtue. Dans les uns, pour lesquels on peut conserver le nom de Tinamous proprement dits, ces plaques, disposées sur trois à cinq rangées, ont leur bord supérieur retroussé en guise de dent de râpe, ce qui rend cette partie du tarse très rude au toucher. Dans tous les autres Tinamous, la face postérieure du tarse est, au contraire, revêtue d'une seule ou de plusieurs rangées de plaques, comme d'ordinaire à bords couchés, en sorte que cette partie est parfaitement lisse au toucher.

On peut ranger les Tinamous à quatre doigts et à tarses lisses dans trois sous-genres. Celui des Cryptures a pour caractère des rémiges primaires d'un brun-noir uniforme. Puis, celui des Rhynchotes, qui se distingue de tous les autres par des rémiges primaires d'un roux uniforme. — Il y a enfin les Nothures, qui sont très reconnaissables, toutefois à l'exception du Nothura nana, à leurs rémiges primaires ornées de bandelettes blanches sur un fond foncé.

Il existe encore, dans la tribu des Tinamous, des traits tout-à-fait exceptionnels: tels sont une huppe composée de plumes effilées, retroussée vers le haut, semblable à ce que l'on voit

dans le vanneau ordinaire; puis la couleur très foncée de la gorge du Crypturus cinereus, tandis que cette partie est blanche ou roussâtre, rarement grisâtre ou tachetée de noir dans tous les autres Tinamous, puis l'intégrité des gaînes cornées du bec dans les Rhynchotes et quelques Nothures; enfin les pennes caudales et les couvertures inférieures de la queue remplacées, chez la plûpart des Nothures, par une espèce de duvet.

TINAMUS. TINAMOUS PROPREMENT DITS.

Les Tinamous proprement dits offrent un caractère constant, très facile à saisir et au moyen duquel on peut distinguer, au premier coup d'oeil, ces oiseaux de leurs congénères. Ce caractère réside dans la conformation du bord supérieur des plaques revêtant la face postérieure du tarse dont ce bord est relevé à l'instar de dents de râpe. Ces plaques étant distribuées sur trois à cinq rangées, l'aspérité que produisent leurs angles saillants est très sensible au toucher. Leurs rémiges primaires sont, comme dans les Cryptures d'un brun foncé uniforme.

Les narines sont ouvertes en avant du milieu de la longueur de la mandibule supérieure qui est composée de trois pièces et pourvue, comme dans les Cryptures d'une cire.

Les Tinamous proprement dits acquièrent une taille assez forte, l'aile offrant quelquefois en longueur neuf et trois quarts de pouce, rarement sept pouces seulement.

Ils vivent dans les bois, et ont été observés depuis le Paraguay jusqu'au Mexico.

Certaines espèces offrent, proportions gardées, des doigts considérablement plus effilés et plus longs que dans le reste des espèces, ce qui m'a engagé à établir deux subdivisions dans ce sous-genre.

I. Espèces à doigts courts: le doigt du milieu (sans son ongle) égalant en longueur tout-au-plus la moitié de celle du

tarse, et le pouce étant très court. Plumes de la nuque effilées et un peu allongées.

A. Dessus de la tête foncé.

a. Une raie composée de taches blanches descendant de chaque côté depuis les freins le long des côtés du cou: caractère unique dans toute la tribu des Tinamous. Teinte du fond du dessus en arrière du cou d'un gris olivâtre foncé.

TINAMUS TAO, Temminck, Pigeons et Gallinacés, III, pp. 569 et 749: établi d'après une description de feu Illiger, prise sur un individu du Musée de Berlin, et qui avait été tué par le voyageur du Comte de Hoffmannsegg dans la province Brasilienne de Parà où il porte le nom d'Inamb a tao. C'est-à-tort, toutefois, que Temminck, et après lui Lichtenstein et Wagler, y aient rapporté le Macoicogoé d'Azara, espèce très différente et nommée par Vieillot T. solitarius. Wagler, méconnaissant la description du tao de Temminck, introduisit l'espèce sous une nouvelle épithète: c'est son Tin. canus, Isis d'Oken, 1829, p. 746. C'est encore le Tin. Weddelli, de Bonaparte: Comptes rendus, tome 42, 1856, pp. 881 et 954, et tome 43, 1856, p. 572, que le Prince ne paraît avoir séparé du tao qu'il n'avait pas même examiné, que parce que son oiseau venait d'une autre localité que le tao, c'est-à-dire de la Bolivie. Ce savant n'a pas non plus comparé son oiseau au Tin. Kleei de Tschudi, Fauna Peruana, p. 284, pl. 62, que l'on dit être identique avec le tao, quoique l'auteur en dise sur la différence de taille de son oiseau.

Il est bon de faire observer que j'ai examiné, au Musée de Berlin l'individu type du comte de Hoffmannsegg, et qu'il y porte l'épithète de canus; et que j'en ai vu, au Musée de Vienne, trois individus recueillis au Brésil par feu J. Natterer.

Taille d'une poule ordinaire.

Dessus et côtés de la tête et du cou d'un gris foncé tirant

légèrement sur l'olivâtre; mais cette teinte est obscurcie par du noir répandu sur chaque plume, en forme de bandes transversales et d'un large bord terminal: distribution qui rend le noir prédominant sur ces parties. La teinte générale de ces parties est, en outre, interrompue par la raie composée de taches blanches, dont nous avons parlé plus haut; mais laquelle est, en vérité, formée par plusieurs rangées de plumes noires irrégulièrement tachetées et variées de blanc. Menton, gorge et moitié antérieure du dessous du cou d'un blanc varié de noir sur cette dernière partie. Tout le dessus de l'oiseau en arrière du cou, y compris la face supérieure des ailes est d'un gris foncé tirant sur l'olivâtre, varié de très fines lignes transversales, en zig-zag et noires, ainsi que de bandelettes transversales noires, larges environ d'une ligne, mais disparaissant peu-à-peu sur la queue et sur le devant du manteau. Dessous de la moitié postérieure du cou, le jabot, la poitrine et les flancs d'un gris plus clair que celui des parties supérieures cendré et lavé légèrement d'olivâtre: cette teinte, qui tire même un peu au blanchâtre sur la poitrine, est partout interrompue par de fines lignes transversales en zig-zag et noires. Plumes du ventre et des jambes ornées de bandelettes alternes noires et d'un jaune roussâtre, et plus ou moins irrégulières. Sous-caudales d'un roux-jaune pur et vif, mais elles sont sur leurs bords latéraux plus ou moins largement encadrées d'une teinte d'un vert d'olive présentant de nombreuses lignes vermiculées irrégulières, en zig-zag et noires. Rémiges primaires d'un brun-noir, tirant au gris sur leur face inférieure, cette dernière teinte occupe toute la face inférieure de l'aile, à l'exception des couvertures externes, qui sont d'un noir brunâtre.

Mandibule supérieure noire, inférieure blanchâtre. Pieds très foncés. Ongles noirâtres.

Aile neuf pouces dix lignes. Queue quatre pouces et demi. Tarse deux pouces et demi. Doigt du milieu sans son ongle un pouce et demi. Pouce trois lignes. Bec, depuis le front, quatorze lignes.

Le Tao a été observé au Para (Hommannsegg); depuis Matogrosso jusqu'à Borba, sur les bords du Madeira inférieur (Natterer); dans la province Bolivienne de la Paz (Weddell); au Pérou (Tschudi); suivant feu Verreaux à la Nouvelle Grenade. Lawrence, Proc. Zool. Soc. London. 1857, p. 20, en a reçu un individu de Bogotà.

1. Adulte, Nouvelle Grenade, acquis en 1863 de J. Verreaux.

b. Teinte du fond du dessus à partir du cou d'un olivâtre, soit foncé, soit plus clair, ou tirant même au roux.

TINAMUS SOLITARIUS, Vieillot, Dictionn. Déterville, tome 34, p. 105, établi d'après le Macoicogoé d'Azara, tome 4, p. 154. Tinamus tao, Lichtenstein, Verzeichniss Doubletten. 1823, p. 67; et G. R. Gray (nec Tin. tao, Temm.) — Tinam. brasiliensis, Wied, Beiträge, Vögel, tome 4, p. 49 (nec Latham).

Taille d'une forte poule. Dessus et côtés de la tête et du cou d'un brun olivâtre foncé, interrompu par une raie d'un roux clair ou blanchâtre laquelle longe les côtés de la nuque pour se perdre vers le manteau. Menton et devant de la gorge d'un blanc pur. Plumes du reste de la gorge et de la partie avoisinante du cou roussâtres, mais bordées de noirâtre; on voit du reste, de semblables bordures sur toutes les autres plumes de la tête et du cou. Parties supérieures de l'oiseau en arrière du cou y compris les ailes, d'un vert d'olive brunâtre et foncé, relevé par de nombreuses bandelettes transversales, ondulées et noires, tout-au-plus larges d'une ligne. On voit, en outre, sur la queue et les couvertures supérieures des ailes de petits points blanchâtres assez rares. Parties inférieures de l'oiseau d'un gris cendré, plus foncé sur les flancs, et dans toute son étendue très finement ondulé de gris brunâtre. Couvertures inférieures de la queue d'un roussâtre clair, mais pourvues d'un large bord olivâtre vermiculé de noir. Rémiges primaires et

couvertures inférieures des ailes ainsi que les teintes du bec et des pieds, comme dans le Tin. tao, mais les ongles sont jaunes au lieu de noirâtres. Iris d'un brun roussâtre.

Aile neuf pouces une ligne à neuf pouces onze lignes. Queue quatre pouces. Tarse deux pouces huit lignes. Doigt du milieu seize lignes. Pouce trois lignes. Bec, depuis le front, douze lignes.

Cet oiseau n'a été observé qu'au Paraguay (d'Azara), dans la capitainerie de St. Paul (Natterer et Lichtenstein); près de Rio de Janeiro (Natterer) et dans toutes les forêts vierges s'étendant de là jusqu'à Bahia (Wied de Neuwied). D'Azara rapporte également qu'il se tient dans les forêts touffues, et qu'il vit solitaire.

1. Adulte, Rio de Janeiro, acquis en 1863.

2. Mâle adulte, tué le 31 Janvier 1821, près d'Itarara, du voyage de Jean Natterer, acquis en 1864 du Musée de Vienne.

3. Adulte, St. Paul, au Brésil, acquis en 1879.

Un individu absolument semblable au N°. 2 fait partie du Musée de la Société Royale de Zoologie d'Amsterdam.

Cette espèce n'est pas rare dans les collections. J'en ai vu quatre individus au Musée de Berlin, cinq dans celui de Vienne, deux dans celui de Pesth et un, sous le nom de Tin. subcristatus, dans celui de Stuttgardt.

TINAMUS ROBUSTUS, Sclater et Salvin, Exotic Ornithology, pl. 44.

Très semblable au Tin. solitarius, dont il est le représentant dans l'Amérique mitoyenne, c'est à dire depuis le Panama jusqu'au Mexico; mais à taille moins forte, aux bandelettes des parties supérieures plus clair-semées, au sommet de la tête plus foncé, au gris du ventre tirant fortement au blanc; aux plumes postérieures des flancs avec des bandelettes très prononcées et passablement larges, enfin aux ongles bruns, ou seulement à leur pointe jaunes ou jaunâtres.

Aile huit pouces huit lignes à huit pouces dix lignes.

Queue quatre pouces. Tarse deux pouces cinq lignes à deux pouces six lignes. Doigt du milieu quatorze lignes. Pouce deux lignes. Bec treize lignes.

Observé dans le Guatemala oriental (Salvin), dans la province de Vera Cruz au Mexico (Sallé), depuis le Mexico austral jusqu'au Panama (Sclater). Se tient dans les forêts (Salvin).

1. Adulte, Vera Cruz, voyage de Sallé, acquis en 1870.

2, 3. Mâle et femelle. Chimuy, Vera-Paz au Guatemala, tués en Avril 1877, obtenus de M. G. Schneider de Bâle.

4. Mâle adulte, Mexico méridional, voyage de Sallé, acquis en 1879 de Mad. Verreaux.

5. Adulte, Costa Rica, acquis en 1879 de M. Schlüter à Halle.

TINAMUS GUTTATUS, v. Pelzeln dans Verhandlungen der Zool. Botan. Gesellschaft zu Wien, 1863, p. 1126. — Crypt. guttatus, Natterer (in litteris).

Espèce de taille moyenne, très reconnaissable aux traits suivants.

Plumes des deux tiers antérieurs du dessous et des côtés du cou, ainsi que les côtés de la tête roussâtres, mais bordées de noir. Menton et gorge blanc. Plumes du dessus de la tête et du cou d'un noir faiblement interrompu par des bandelettes d'un brun roussâtre. Manteau et dos d'un brun d'olive très foncé et tirant au roux. Croupion, queue et face supérieure des ailes plus clairs et tirant plus ou moins au vert d'olive. Toutes ces parties, à l'exception du manteau sont pourvues de bandelettes noires, les couvertures alaires et la queue, en outre, parsemées de nombreuses gouttelettes roussâtres; de semblables gouttelettes, mais transversalement élargies, ornent les rémiges secondaires. Dessous, en arrière du cou, d'un roux clair, passant au blanc sur le ventre, mais interrompu, sur les flancs, par des bandelettes noires. Sous-caudales d'un roux foncé passant au blanchâtre sur les tiges et sur l'extrémité des plumes. Grandes rémiges et dessous des ailes comme dans le T. tao. Pieds peu foncés avec une nuance verdâtre. Ongles jaunâtres comme dans le Tin. solitarius.

Aile sept pouces deux lignes. Queue deux pouces et demi. Tarse deux pouces. Doigt du milieu un pouce. Pouce une ligne et demie. Bec un pouce.

Iris d'un brun foncé. Pieds d'un gris clair, lavé de jaunâtre (Natterer).

Feu Jean Natterer a observé cette espèce dans la province de Parà, sur les bords du Madeira inférieur, et sur ceux du Rio Negro jusqu'au Rio Vaupé. Elle habite les forêts. Le Musée de Vienne possède, outre ceux recueillis par feu Natterer, un individu envoyé de St. Carlos en Colombie.

1. Mâle adulte, tué le 15 Novembre 1834 près de Parà, voyage de Natterer, acquis en 1864 du Musée de Vienne.

B. Dessus de la tête roux.

TINAMUS MAJOR, J. E. Gray, List Brit. Muséum, Gallinae, 1867, p. 96. — Tetrao major, Gmelin, 1, p. 767, sed non Tinamus major, Spix; Tinamus brasiliensis, Latham, Index ornithologicus, 2, p. 633: fondés l'un et l'autre sur Perdix major, Barrère, décrit et figuré par Buffon, sous les noms de Magoua et de Tinamou de Cayenne; voir Pl. enl., pl. 476, vol. 5, p. 221. L'épithète de brasiliensis, a été, du reste, empruntée par Latham au Perdix brasiliensis de Brisson. — Cryptura magna Vieillot, Dict. Déterv., 34, p. 104. — Pezus serratus, Spix, Aves Brasil., p 61, pl. 76 — Trachypelmus subcristatus, Cabanis, dans Schomburgk, Reise, 3, p. 749 (variété).

Dessus de la tête et nuque roux, passant quelquefois au gris sur le front. Menton et devant de la gorge blanc. Plumes des côtés de la tête ainsi que du dessous et des côtés des deux premiers tiers de la queue d'un roux clair, mais bordées de noir et à leur moitié basale, avec une tache longitudinale noire. Une large bande de plumes semblables entourent encore le cou derrière la nuque. Toutes les autres parties supérieures, y compris le dessus des ailes sont couleur d'olive tirant plus ou moins au brun roussâtre, mais relevé par des bandelettes noires peu

nombreuses et interrompues, c'est-à-dire composées, chacune, de deux taches transversales. Parties inférieures en arrière des plumes bigarrées du cou d'un olivâtre clair tirant au grisâtre ou au roussâtre, plus clair sur la poitrine, passant au blanc sur le ventre et au roux sur les sous-caudales, relevé par de fines lignes transversales en zig-zag et d'une teinte plus foncée, plus larges sur le derrière des flancs et sur les sous-caudales. Face inférieure des ailes comme dans le tao.

Mandibule supérieure brune, inférieure blanchâtre. Pieds foncés.

Aile huit pouces et trois à six lignes. Queue trois pouces et six à neuf lignes. Tarse vingt-neuf lignes. Doigt du milieu douze à quatorze lignes. Pouce deux lignes. Bec douze lignes.

Les plumes de la nuque étant, comme dans la plûpart des Tinamous proprement dits, un peu allongées, il arrive quelquefois que ces plumes, parfaitement développées, forment dans cette espèce une petite huppe pendante: ce qui a donné lieu à l'établissement d'une espèce particulière appelée „subcristatus" Le roux du dessus de la tête est quelquefois plus foncé que d'ordinaire, et il en est de même des teintes de la poitrine et du ventre.

J'ai encore sous les yeux un individu (notre N°. 8) d'une variété remarquable par des bandelettes des parties supérieures plus larges, complètes et s'étendant même sur les rémiges secondaires; par les couvertures des ailes, le croupion, la queue et le bord de la barbe externe des rémiges primaires, parsemés de petites taches d'un roussâtre clair, enfin, par les barbes externes des couvertures extérieures de l'aile ornées de larges bandelettes alternes rousses et noires. Le trait le plus remarquable et tout-à-fait exceptionel qu'offre cet individu réside, cependant, dans le coloris de la barbe externe des pennes de l'aileron, laquelle est d'un roux clair traversé par de larges bandes noires, au lieu d'un brun vermiculé de noir.

Aile huit pouces quatre lignes. Queue trois pouces et demi. Tarse vingt-huit lignes. Doigt du milieu treize lignes. Bec treize lignes. Cet individu fut tué près de Borba.

Les petits ont le front entier d'un roux blanchâtre. Le vertex, l'occiput et la nuque sont bordés de chaque côté d'une raie très foncée; une bande également très foncée, s'étend de l'oeil jusqu'au delà de la région des oreilles.

Adoptant des conspecies dans cette espèce, on peut leur assigner les traits suivants. 1. Tinamus major: côtés et dessus de la tête, y compris le front et la nuque, d'un brun ferrugineux uniforme, tantôt plus clair, tantôt plus foncé. 2. Tinamus major ruficeps (Tinamus ruficeps, Sclater et Salvin) originaire d'Ecuador: plumes du dessus et des côtés de la tête comme dans le Tinamus major; mais chacune d'entre elles terminée d'un fin liséré noir et à baguettes également noires. 3. Tinamus major subcristatus: Plumes de la nuque un peu allongées. Une raie d'un brun-gris foncé au dessus de l'oeil, et une autre semblable à travers cet organe.

Il n'existe nulle différence de taille dans les conspecies dont nous venons de parler, mais elles sont tous soumis aux variatons individuelles suivantes des teintes de leur plumage. La teinte du fond des parties supérieures de l'oiseau tire tantôt au vert olivâtre, tantôt au brun olivâtre, tantôt au roux; elle est tantôt uniforme, tantôt relevée par des taches transversales foncées, et quelquefois, notamment dans les jeunes, ornée en outre de petites taches d'un jaune d'ocre sale et clair. La teinte des parties inférieures de l'oiseau varie depuis le gris blanchâtre jusqu'au gris-cendré, tirant même à l'olivâtre ou au brun couleur de rouille, et elle est traversée par des lignes vermiculées plus ou moins prononcées, clair-semées ou serrées.

Cette espèce se trouve au nord des contrées habitées par le Tin. solitarius. Buffon avait reçu son individu de Cayenne et le Musée de Vienne en possède également un individu de cette colonie française. On nous en a envoyé de Suriname, et Schomburgk l'a rencontré dans la Guyane Anglaise. Spix a recueilli son Pezus serratus sur les bords du Rio-Negro. Natterer en a rapporté des individus de Matogrosso, Cachoeëra do Bananeira, Borba, et des bouches du Rio Negro jusqu'à Marabitanas.

Schomburgk rapporte que cet oiseau est répandu dans toute la Guyane Anglaise, qu'il ne se trouve que dans les forêts touffues, qu'il niche sur le sol, ordinairement au pied d'un arbre, que la femelle pond, au mois de Février ou Avril, sept à huit grands oeufs d'un vert bleuâtre, que l'oiseau vit, pendant le jour, à terre où il cherche sa nourriture qui consiste en fruits et insectes qu'il se perche, pendant la nuit, sur des arbres, enfin qu'il fait entendre un sifflement mélancolique au lever et au coucher du soleil.

1. Adulte, subcristatus; Brésil.

2. Adulte, monté à Suriname, présenté en 1878 par la Société Royale de Zoologie d'Amsterdam. Notez que l'on voit, dans le Musée de cette société un individu absolument semblable, mais à tête un peu plus foncée.

3. Jeune individu en partie en duvet, long de sept pouces, monté à Suriname, présenté en 1878 par la sus-dite société.

4. Petit, long de cinq pouces, en plus grande partie en duvet, présenté en 1863 par la sus-dite société.

5. Mâle adulte, subcristatus, tué le 8 Septembre 1832, Barra do Rio Negro, voyage de Natterer, acquis en 1864 du Musée de Vienne.

6. Femelle adulte, subcristatus, tuée le 9 Octobre 1832, Barra do Rio-Negro, voyage de Natterer, acquise en 1864 du Musée de Vienne.

7. Femelle adulte, tuée le 18 Janvier 1831, Marabitana, voyage de Natterer, acquise en 1864 du Musée de Vienne.

8. Variété ci-dessus indiquée; mâle tué au mois de Janvier près de Borba (Rio Madeira inférieur), acquis en 1862.

9. Je fais mention séparément d'un individu femelle, tué sur les bords de l'Orénoque et acquis en 1873 de feu J. Verreaux, individu seulement différent du Tin. major par sa moindre taille, ainsi que par ses couvertures alaires, son dos, croupion et sa queue parsemés de petites taches d'un roux clair.

Aile sept pouces dix lignes. Queue deux pouces huit lignes. Tarse deux pouces. Doigt du milieu un pouce. Bec douze lignes.

10. Mâle adulte, Iquitos (Quito), tué le vingt-six Septembre 1878, acquis en 1879.

11. Jeune individu, Pérou, tué le vingt Septembre 1878, acquis en 1879.

II. Espèces à doigts effilés et allongés, le doigt mitoyen, sans son ongle, égalant deux tiers de la longueur du tarse et l'ongle du pouce touchant le sol. Plumes de la nuque ordinaires. Je ne connais que deux espèces offrant le caractère saillant de doigts allongés. Elles ont le dessous du corps, en arrière du jabot, rougeâtre.

TINAMUS NIGRICAPILLUS, J. E. Gray, List. Br. Mus., Gallinae, 1867, p. 98.

Taille d'une poule. Caractérisé parmi toutes les espèces de Tinamous en général par le système de coloration de la barbe externe des grandes rémiges, dont la teinte du fond est interrompue par des bandelettes vermiculées, en zig-zag, d'un roux clair bordé de noir. Face inférieure des barbes internes offrant une disposition de dessin semblable. Dessus de l'oiseau en arrière de la nuque d'un brun d'olive relevé par de fines lignes noires, serrées, vermiculées et en zig-zag et, à l'exception du manteau et du dessus du cou, interrompu par des bandelettes noires et parsemé de nombreuses taches blanchâtres, s'élargissant en bandelettes sur les rémiges secondaires. Grandes sous-alaires avec des bandelettes alternes noires et d'un brun-roux; les autres sousalaires sont d'un brun vermiculé de noir. Dessus de la tête et nuque d'un noir foncé. Menton et devant de la gorge d'un roux clair. Dessous du cou et jabot d'un brun d'olive vermiculé de noir. Les autres parties inférieures d'un roux clair, vif et uniforme sur la poitrine, plus foncé sur le ventre et les souscaudales, mais interrompu, à l'exception de la poitrine, de bandelettes irrégulières et noires, entre lesquelles on voit de petites taches blanches. Mandibule supérieure foncée, inférieure blanchâtre. Pieds d'un brun verdâtre.

Aile huit pouces quatre lignes. Queue deux pouces dix lignes. Tarse deux pouces sept lignes. Doigt du milieu dix-huit lignes. Pouce sans son ongle quatre lignes.

Gray fait venir cette espèce du Chilé. Nous en avons reçu un individu avec l'indication de St. Fé da Bogotà. J'en ai vu, au Musée de Berlin un autre individu, provenant de Concordia (Medellin): il y porte le nom de Trachytelmus Frantzii, Lawrence. Un troisième que j'ai examiné fait partie du Musée de Vienne.

1. Mâle adulte, Bogotà, acquis de M. Deyrolle en 1873.
2. Adulte, Medellin, obtenu en 1879.
3. Adulte, Costa-Rica, acquis en 1879.

TINAMUS JULIUS, J. E. Gray, List Brit. Mus., Gallinae, 1867, p. 98. — Nothocercus Julius, Bonap., Comptes rendus, 1856, p. 957.

Taille de la gélinotte (Tetrao bonasia). Se distingue au premier abord, avec le Tin. cinereus, de toutes les espèces de la tribu entière par ses sousalaires foncées. Queue très courte.

Dessus de l'oiseau en arrière de la nuque d'un brun olivâtre relevé par des bandelettes noires. Dessus de la tête et nuque d'un brun tirant tantôt au fuligineux tantôt au marron. Menton et devant de la gorge d'un blanc pur. Dessous et côtés du cou et le jabot d'un brun d'olive, finement vermiculé de noir. Poitrine et ventre d'un roux vif. Partie postérieure des flancs et souscaudales d'un brun olivâtre, avec des bandelettes noires. Sousalaires noirâtres. On voit quelquefois de petites taches blanchâtres sur les couvertures alaires, les rémiges secondaires, le croupion et la queue.

Pieds d'un brun foncé.

Principales mesures de l'oiseau adulte: Aile sept pouces. Queue deux pouces deux lignes. Tarse vingt-huit lignes. Doigt du milieu dix-huit lignes. Pouce sans son ongle cinq lignes. Bec onze lignes.

Le système de coloration des petits diffère de celui des adul-

tes en ce que ceux-là ont le dessus de la tête et la nuque d'un noir interrompu, au milieu de la nuque, par une tache longitudinale blanche.

Cette espèce habite la Colombie. J'en ai vu des dépouilles dans les Musées de Paris, de Berlin, de Dresde, de Vienne et de Munich.

1. Adulte, Colombie.

2. Mâle, Colombie, voyage de Delattre, acquis en 1863.

3 et 4. Petits, chacun portant en longueur totale sept pouces; Colombie, voyage de Delattre, acquis en 1862.

5. Très jeune, long de cinq pouces; voyage de Delattre, Colombie, acquis en 1862.

6. Mâle adulte, Nouvelle Grenade, acquis en 1879.

7. Adulte, Nouvelle Grenade, acquis en 1879.

LES CRYPTURES.
CRYPTURUS.

Il convient de conserver le nom générique de Crypturus aux espèces à tarses glabres et aux grandes rémiges teintes d'un brun foncé uniforme, ayant ce dernier caractère en commun avec les Tinamous proprement dits. On peut comparer leur taille à celle des perdrix; mais la plupart des espèces est un peu plus petite, quoique surpassant, sous ce rapport, constamment la caille.

Ils ont la mandibule supérieure divisée en trois pièces, comme les Tinamous proprement dits; mais cet organe est dépourvu d'une cire et les narines sont plus reculées, c'est-à-dire elles s'ouvrent sur le milieu ou un peu en arrière du milieu du bec.

Ils vivent ordinairement dans les forêts et sont répandus depuis le Paraguay jusqu'au Mexico.

I. Teinte d'un brun fuligineux uniforme, se répandant même sur la gorge et les sousalaires: caractères uniques dans toute a tribu.

CRYPTURUS CINEREUS, Illiger; Tetrao cinereus, Gmelin, I, p. 766. Tinamus cinereus, Latham; Cryptura cinerea, Vieillot: tous reposant sur le Tinamou cendré de Buffon, Ois., tome 4, p. 510. Notez toutefois que Vieillot cite, mal-à-propos, la pl. 476 de Buffon.

Taille d'une forte perdrix. Plumage entier d'un brun fuligineux, lavé de roux sur l'occiput et la nuque, et aux plumes postérieures des flancs et aux sous-caudales bordées d'une teinte roussâtre. Pieds d'un jaune grisâtre. Mandibule supérieure noire, inférieure blanchâtre.

Aile six pouces cinq lignes. Queue deux pouces. Tarse deux pouces. Doigt du milieu quatorze lignes. Bec dix lignes.

Il existe, dans cette espèce, une variété aux teintes plus claires, c'est-à-dire d'un gris plus clair que d'ordinaire. Elle ne se distingue, du reste, en aucune manière, des individus foncés, et elle habite les mêmes localités que ceux-ci, puisque l'on voit, dans le Musée de Stoutgard, des individus des deux variétés, recueillis, l'un et l'autre, à Suriname. Feu J. Natterer a envoyé au Musée de Vienne cinq individus de la variété claire, tués près de Borbà sur le Rio Madeira; ils y portent l'épithète d'assimilis, attribuée par G. R. Gray à une Nothure très douteuse.

Le Crypturus cinereus a été observé à Cayenne, à Suriname, sur les bords du Rio-Madeira inférieur, et M. Tschudi l'énumère parmi les oiseaux du Pérou.

1. Adulte, Cayenne, tué le 13 Février 1837, acquis en 1864. — 2. Mâle adulte, Chamicuros, Amazonie Péruvienne, voyage de Bartlett, acquis en 1879. — 3. Femelle adulte, Iquitos, tuée le 27 Oct. 1878, obtenue en 1879. — 4. Femelle adulte, tuée le 19 Oct. 1878, Pérou, acquise en 1879.

II. Menton et gorge blanchâtre ou roussâtre, passant quelquefois au gris cendré.

A. Dessus unicolore.

a. Les deux mandibules et les pieds rouges dans le vivant, d'un jaune pâle après la mort. Plumes postérieures des flancs, du bas-ventre et des sous-caudales noires, mais offrant une bordure et une bande en fer de cheval blanches.

CRYPTURUS TATAUPA, Lichtenstein. — Cryptura tataupa, Vieillot. — Le Tataupa, d'Azara. — Pezus japura, Spix, pl. 78 A. — Tin. tataupa, Temm., Pl. col. 415.

Taille considérablement plus forte que celle de la caille. Les mandibules d'une teinte claire; plumes postérieures des flancs noires, mais à bordure blanche suivie en dedans d'un trait blanc en fer de cheval; plumes du bas-ventre et sous-caudales offrant un dessin semblable quoique moins prononcé et ces dernières tirant en outre au roux: caractères que l'espèce n'a en commun qu'avec la suivante.

Menton et devant de la gorge d'un blanc tirant rarement au gris. Tête, cou, jabot et flancs d'un gris cendré, clair sur cette dernière partie, tirant plus ou moins au noirâtre sur le dessus de la tête. Dessus, en arrière du cou, d'un brun roussâtre. Poitrine d'un gris blanchâtre. Ventre et sousalaires blanchâtres.

Le tarse est d'un rouge lustré et quelquefois violet, le bec de même que l'iris d'un rouge de corail (d'Azara). — Dans les individus desséchés le bec est jaune et les pieds offrent une teinte brunâtre.

Aile quatre pouces huit lignes. Queue dix-huit lignes. Tarse quinze lignes. Doigt du milieu onze lignes. Bec dix lignes.

Les petits ont les ailes ornées de taches transversales blanches et noires.

Cet oiseau a été observé par d'Azara au Paraguay; nous en avons reçu un individu de la province de Rio Grande do Sul. Natterer l'a rencontré dans les provinces de St. Paul et de Rio Janeiro, le Prince M. Wied de Neuwied dans celle de Bahia; Spix dans les forêts avoisinant le Japura (ou Caqueta), affluent

septentrional du Solimoëns, à l'ouest du Rio-Negro. Tschudi, enfin, en fait mention comme habitant du Pérou.

Il s'approche ordinairement des habitations champêtres et voisines des cantons les plus couverts. Il se tient dans les bosquets et les forêts, et même dans les plantages où il se trouve des buissons touffus ou de grandes herbes dans lesquelles il peut sa cacher (d'Azara). — Le Prince de Neuwied l'a rencontré le plus souvent dans des lieux découverts garnis d'herbes touffues.

1 et 2. Adultes, Brésil. — 3. Individu du Brésil, acquis en 1866. — 4. Mâle, province de Rio Grande, obtenu en 1875. — 5. Adulte, Cayenne, obtenu en 1879.

CRYPTURUS PARVIROSTRIS, Wagler, Systema avium, N°. 13. — Tinamus cervinus, Bonaparte? — Les deux individus du Musée de Berlin portent, l'un le nom de Crypturus exiguus, Olbers, l'autre celui de Tinamus pallescens.

Absolument semblable au tataupa; mais à taille un peu moins forte et aux teintes du plumage plus pâles et faisant, pour ainsi dire, l'effet d'être décolorées.

Aile quatre pouces quatre lignes. Queue vingt lignes. Tarse onze lignes. Doigt du milieu huit lignes. Bec sept lignes.

Natterer a observé cette espèce dans les provinces Brésiliennes de St. Paul et de Goyaz; Reinhardt, Bidrag, p. 49, dans celles de Minas-Geraës et Bahia.

1. Mâle, tué le 28 Août 1826, Engenho do Cap. Gama, voyage de Natterer, acquis en 1862 du Musée de Vienne. — 2. Femelle, Ypanéma, voyage de Natterer, acquise en 1862 du Musée de Vienne. — 3. Adulte, Bahia, acquis en 1879.

b. Mandibule supérieure et pieds foncés, mandibule inférieure blanchâtre. Plumes postérieures des flancs, du bas-ventre et des sous-caudales avec des bandelettes roussâtres sur un fond plus foncé.

CRYPTURUS OBSOLETUS, Wagler. — Tinamus obsoletus,

Temminck, Pig. et Gallin., Pl. col. 196. — Ynambu azulato, d'Azara. — Cryptura coerulescens, Vieillot, Dict. Déterv., tome 34, p. 101.

Taille égalant presque celle de la perdrix. Dessin des plumes postérieures des flancs, du bas-ventre et des sous-caudales rappelant celui de ces parties dans les Cr. tataupa et parvirostris, mais à teinte roussâtre. En outre facile à reconnaître au roux brunâtre intense, plus clair seulement en arrière de la poitrine. Menton et gorge, souvent jusque sur les côtés de la tête, d'un gris cendré clair. Toutes les parties supérieures d'un brun roussâtre foncé et uniforme, passant au noir fuligineux sur le dessus du cou et de la tête. Sousalaires tirant en grande partie au blanchâtre. Mandibule supérieure noirâtre, inférieure blanchâtre. Tarse couleur de feuille morte (d'Azara). Iris brun (Burmeister).

Aile cinq pouces deux lignes à six pouces deux lignes. Queue deux pouces. Tarse vingt-deux lignes. Doigt du milieu quatorze lignes. Bec neuf lignes.

D'Azara a observé cet oiseau au Paraguay vers le vingt-quatrième degré. Natterer en a rapporté des individus tués dans la Capitainerie de St. Paul. Il se trouve, suivant Tschudi, également au Pérou, et nous en avons reçu des individus de la Colombie. Le Prince Wied de Neuwied ne l'a pas rencontré lors de son voyage.

D'Azara rapporte qu'il a les mêmes habitudes que le tataupa.

1. Femelle adulte, voyage de Freireiss, Capitainerie de St. Paul, acquise du Musée de Berlin. — 2. Mâle adulte, tué en Juillet 1821, Ypanéma, voyage de Natterer, acquis en 1862 du Musée de Vienne. — 3. Femelle adulte, tuée le 23 Janvier, Itararé, voyage de Natterer, acquise en 1862 du Musée de Vienne. — 4. Adulte, Brésil méridional, acquis en 1867. — 5. Adulte, Brésil méridional, obtenu en 1859. — 6. Adulte, Brésil méridional.

Individus présentant une taille moins forte que les numéros 1 à 6. — 7. Individu tué dans les environs de Bogotà, pré-

senté par feu le Consul van Lansberge. — 8. Individu un peu moins grand que le numéro 6, et d'origine inconnue. — 9. Adulte, Nouvelle Grenade, obtenu en 1879. — 10. Femelle, Laguna (province St. Cathérine du Brésil méridional), obtenue en 1879 de M. Schlüter à Halle. — 11. Adulte, Brésil, acquis en 1870. — 12. Adulte, Brésil, acquis en 1879.

CRYPTURUS PILEATUS, G. R. Gray, Handlist, III, p. 4. — Tetrao pileatus, Boddaert, p. 51. — Tetrao sovi, Gmelin, p. 768, fondés l'un et l'autre sur le Soui de Buffon, Pl. enl. 829. — Tinamus soui, Latham. — Crypturus sovi, Lichtenstein.

Cette espèce se rattache naturellement au Crypturus obsoletus, mais elle est d'une taille considérablement moins forte, et les teintes de son plumage sont beaucoup moins uniformes et moins sombres.

Gorge blanchâtre ou roussâtre. Parties supérieures de l'oiseau et queue d'un brun olivâtre lavé de roux, mais plus foncé sur le dessus de la tête. Dessus d'un rouge ferrugineux, plus clair et tirant au blanchâtre sur l'abdomen et le milieu de la poitrine. Couvertures alaires pourvues souvent à leur bord terminal d'un fin liséré roussâtre.

Aile quatre pouces et six à huit lignes. Tarse quinze lignes. Doigt du milieu neuf lignes. Bec sept lignes.

Dans le vivant, la mandibule supérieure est d'un brun noirâtre, l'inférieure couleur de chair, tirant au blanc brunâtre; l'iris de l'oeil est d'un brun jaunâtre, le tour des paupières jaunâtre, les pieds d'un gris-brun olivâtre pâle (Wied de Neuwied).

D'Azara ne fait pas mention de cette espèce dans son énumération des oiseaux du Paraguay. Natterer en a tué des individus dans les provinces de Rio de Janeiro et de Mato-Grosso; puis près de Borbà au Rio Madeira inférieur, ainsi que le long des bords inférieurs du Rio Negro. Le Prince Wied de Neuwied l'a rencontré dans les grandes forêts entre Rio de Janeiro et Bahia, et dit qu'elle a les mêmes habitudes que le tataupa. Buffon a reçu cet oiseau de Cayenne; il habite également la

Colonie de Suriname et, suivant Schomburgk, la Guyane Anglaise. Léotaud ne parle que de cette espèce dans son ouvrage intitulé „Oiseaux de l'île de la Trinidad", p. 385. Enfin, il nous en est parvenu un individu de Medellin dans la Colombie.

1. Adulte, monté à Suriname, présenté en 1860 par la Société Royale de Zoologie d'Amsterdam. — 2. Adulte, Cayenne. — 3. Mâle adulte, tué le 28 Mars 1830, près de Borbà, voyage de Natterer, acquis en 1864 du Musée de Vienne. — 4. Femelle adulte, Rio Guaporé, voyage de Natterer, obtenue en 1864 du Musée de Vienne. — 5. Adulte, Medellin, acquis en 1879.

CRYPTURUS PILEATUS MESERYTHRUS. — Crypt. meserythrus, Sclater et Salvin, Exot. Ornith., 1869, pl. 47. — Tinamus meserythrus, Sclater, Proc. Z. S. Lond., 1859, p. 392. — Tinamus pileatus, Lawrence (nec Boddaert) Ann. Lyc. N. York, 7. p. 334.

Excessivement semblable au Crypturus pileatus, mais non pas lavé de roux sur les parties supérieures, au blanc de la gorge tirant fortement sur le gris, au devant et aux côtés du cou d'un brun olivâtre, enfin au rouge ferrugineux des autres parties inférieures plus sale et moins vif, mais se répandant également sur le milieu du ventre et de la poitrine.

J'ai vu, au Musée de Berlin, un individu de ce conspecies originaire de Panama, dont le dessous n'est pas moins rouge que dans le pileatus. Un autre individu de ce Musée y porte le nom de Crypturus modestus, Cabanis.

Aile quatre pouces et six à huit lignes. Queue dix-huit lignes. Tarse dix-sept lignes. Doigt du milieu onze lignes. Bec huit lignes.

Cet oiseau remplace le Crypt. pileatus à Panama, Costa Rica, au Guatemala et au Mexico méridional.

1. Adulte, Guatemala, voyage de Salvin, acquis en 1868. — 2. Adulte, Mexico, acquis en 1863, de feu Verreaux. — 3. Mâle adulte, au roux des parties inférieures beaucoup plus foncé que dans les numéros 1 et 2, Mexico méridional, acquis en 1863 de feu Verreaux. — 4. Adulte, intermédiaire par ses tein-

tes entre le numéro 3 et les numéros 1 et 2, Guatemala, acquis en 1859. — 5. Adulte, Coban, Vera-Paz au Guatemala, tué en Mars 1877, acquis en 1879 de M. Schneider à Bâle. — 6. Adulte, acquis en 1879. — 7. Mâle adulte, tué en Mai 1877, Jacapulas, Vera-Paz, Guatemala, acquis en 1879 de M. Schneider à Bâle. — 8. Adulte, acquis en 1879 de M. Schneider à Bâle. — 9 et 10. Adultes, Mexico méridional, acquis en 1879.

B. Teinte du fond du dos, de la queue et de la face supérieure des ailes relevée par de fines lignes transversales, vermiculées et en zig-zag, serrées et noires. Mandibule supérieure foncée, inférieure claire.

a. Gorge d'un gris cendré blanchâtre. Tête et cou d'un noir fuligineux très foncé sur les parties supérieures.

CRYPTURUS BOUCARDI, Sclater et Salvin, Exotic Ornithology, pl. 76. — Tinamus Boucardi, Sclater, Proc. Zool. Soc. London, 1859, p. 391.

Taille d'une forte perdrix. Teintes en général foncées. Celles du dessus en arrière du cou d'un brun foncé, aux fines lignes transversales quelquefois peu apparentes. Dessous en arrière du cou d'un gris roussâtre, le gris dominant sur le jabot et les flancs, le roussâtre sur la poitrine et le ventre, mais passant au roux blanchâtre sur le bas-ventre et les sous-caudales. Ces dernières sont seules variées de noir. Sousalaires d'un gris passablement foncé, mais passant au blanchâtre sur la partie centrale de la région qu'elles recouvrent. Pieds d'un brun clair.

Aile six pouces. Queue deux pouces. Tarse deux pouces. Doigt du milieu un pouce. Bec neuf lignes.

La figure postérieure de la planche 46 de Sclater et Salvin représente un oiseau d'une taille moins forte et, ce qui le distingue plus particulièrement, c'est que les ailes et la queue, au lieu d'offrir une teinte uniforme, se trouvent ornées de bande-

lettes blanchâtres. Il paraît que ce caractère exceptionel est propre au premier plumage, et qu'il existe dans l'un et l'autre sexe.

Observé au Guatemala et au Mexico méridional (Oaxaca et Vera-Paz).

1. Adulte, Guatemala, obtenu en 1859. — 2. Mâle adulte, Mexico méridional, obtenu en 1863. — 3. Mâle adulte, tué en Mai 1877, Coban, Vera-Paz, Guatemala, obtenu en 1879 de M. G. Schneider à Bâle. — 4. Mâle, au premier plumage, tué au mois de Décembre 1859, Mexico méridional; acquis de la maison Verreaux, 1874: Aile cinq pouces six lignes. Queue seize lignes. Tarse vingt lignes. Doigt du milieu douze lignes. Bec neuf lignes. Notez qu'un individu semblable fait partie du Musée de Vienne.

Les trois oiseaux suivants offrent entre eux une affinité, désespérante pour le naturaliste. Ce ne seront que les recherches sur une grande échelle, au moyen desquelles on pourra décider la question de leur validité comme espèces.

CRYPTURUS STRIGULOSUS, Wagler, Syst. avium, spec. 9. — Tinamus strigulosus, Temminck, Pig. et Gallin., tome 3, pp. 594 et 752.

Taille d'une très forte perdrix. Couleur du fond du dessus d'un brun foncé tirant au roussâtre, plus clair sur les couvertures alaires, plus foncé sur la nuque et la tête et passant au noir sur le front. Couvertures alaires ornées, par ci par là, de petites taches jaunâtres. Dessous, en arrière de la gorge, qui est blanche, d'un gris tirant sur l'olivâtre, mais remplacé, sur l'abdomen par du blanc, sur les souscaudales par du roussâtre: le tout, à l'exception du ventre qui est unicolore et des sous-caudales qui offrent de fines bandelettes et un bord blanc, vermiculé de très fines lignes transversales, en zig-zag et noires. Pieds foncés.

Aile six pouces et une ligne. Queue un pouce dix lignes.

Tarse un pouce dix lignes. Doigt du milieu un pouce. Bec un pouce.

Sieber, le voyageur naturaliste du Comte de Hoffmannsegg a découvert cet oiseau dans la province Brésilienne de Parà. L'un des individus de cette espèce envoyés par lui en Europe fut cédé à feu Temminck, mais malheureusement il a été détruit depuis. Nous en avons reçu depuis un individu de la Nouvelle Grenade. Natterer ne l'a pas seulement rencontré au Parà, mais encore au Rio Madeira inférieur et près de Ciudad, Mato-Grosso.

J'ai examiné, au Musée de Berlin, deux des individus recueillis par Sieber au Parà. Ils ont les ailes longues de six pouces. Le dos est unicolore, mais on voit des lignes ondulées blanchâtres quoique clair-semées sur le croupion et, dans l'un des individus également sur les ailes. La poitrine est grise, le ventre blanchâtre.

Le Musée de Vienne en possède quatre individus obtenus par feu Natterer; savoir deux mâles tués près de Borbà et deux femelles provenant de Parà. Les mâles ont le dos orné de bandes transversales noires; tandis que l'on voit, en outre, chez les femelles, des bandelettes d'un blanc jaunâtre traversant les ailes, le croupion et la queue; ces bandelettes étroites seraient du reste moins sensibles sans le noirâtre de la teinte du fond qu'elles traversent.

1. Adulte, Nouvelle Grenade, obtenu en 1863.

CRYPTURUS ADSPERSUS, Lichtenstein, Verzeichniss, 1822, p. 68. — Tinamus adspersus, Temminck, Pig. et Gall., tome 3, p. 585. — Pezus Japura, Spix, Aves Bras., p. 62, pl. 78. — Tinamus vermiculatus, Temminck, Pl. col. 369.

Menton blanc. Gorge grisâtre. Les autres parties du cou et de la tête d'un brun roussâtre tirant au gris sur les couvertures alaires, sur le croupion et la queue: le tout vermiculé de très fines et nombreuses lignes transversales et noires. Jabot d'un gris tirant légèrement au roussâtre. Flancs et poitrine d'un

gris-blanc roussâtre. Ventre blanc. Plumes des jambes et sous-caudales d'un blanc roussâtre, mais on voit sur ces parties ainsi que sur les plumes postérieures des flancs des bandelettes noires, lesquelles, toutefois, sont peu prononcées dans notre individu femelle. Champ sousalaire blanc au centre. Pieds d'une teinte claire.

Les individus du Musée de Berlin, au nombre de trois, offrent tous de fines ondulations noires.

Aile six pouces trois lignes. Queue deux pouces. Tarse vingt-deux lignes. Doigt mitoyen douze lignes. Bec douze lignes.

Cette espèce a été découverte par le voyageur du Comte de Hoffmannsegg, dans la province Brésilienne de Parà proprement dite. Depuis elle a été observée dans l'intérieur du Brésil, depuis le cours supérieur du Rio Paranà jusqu'au Rio Branco et au Rio Japura. Natterer en a tué des individus dans la province de Mato-Grosso, près de Borbà et sur les bords du Rio Branco; Spix s'est procuré les siens sur ceux du Japura et du Solimoëns. Tschudi rapporte, enfin, qu'il habite le Pérou.

1. Mâle adulte, tué le 6 Avril 1830, près de Borbà, voyage de Natterer, acquis en 1864 du Musée de Vienne. — 2. Femelle adulte, tuée le 23 Avril 1823, sur les bords du Paranà supérieur, voyage de Natterer, obtenue en 1864 du Musée de Vienne.

3. C'est avec doute que nous énumérons ici un individu du Brésil, d'une taille un peu moins forte, aux teintes plus foncées, dont seulement le croupion et la queue offrent des lignes noires et, par contre, passablement larges et en forme de bandelettes. Aile cinq pouces huit lignes; tarse vingt lignes; bec dix lignes. Acquis en 1879.

CRYPTURUS UNDULATUS, Gray. — Tinamus undulatus, Temminck. — Cryptura sylvicola, Vieillot. — Ynambui listado, d'Azara, tome 4, p. 153. — Tinamus bimaculatus, G. R. Gray (juv.)

En général semblable par rapport à sa taille et le coloris de

son plumage, au Crypt. adspersus; mais aux parties supérieures plus claires, et ornées, depuis l'occiput, de lignes transversales en zig-zag, noires et très prononcées, tandis que le cou est, en outre, garni de bandelettes noirâtres: caractère distinctif facile à saisir. Iris d'un roux vif (d'Azara).

Le Musée de Vienne doit à feu Natterer onze individus de cet oiseau, savoir sept mâles et quatre femelles. Tous offrent un plumage couvert d'ondulations, tantôt fines, tantôt grosses.

Aile six pouces et trois à six lignes. Queue deux pouces quatre lignes. Tarse deux pouces. Doigt du milieu un pouce. Bec un pouce.

D'Azara a observé cet oiseau au Paraguay sous le 24^{me} degré de latitude. Il se tient, suivant ce voyageur, dans les grandes forêts. La ponte est de quatre oeufs d'un violet lustré. — Natterer en a tué des individus dans la province de Mato-Grosso. Il paraît d'après ces données que l'espèce ne se répand pas vers le Nord, comme le Crypt. adspersus, tandis que celui-ci ne va pas, vers le Sud, jusqu'au Paraguay.

1. Mâle adulte, tué le 15 Novembre 1826, Mato-Grosso, voyage de Natterer, acquis en 1864 du Musée de Vienne. — 2. Femelle adulte, tuée le 9 Sept. 1828, Mato-Grosso, voyage de Natterer, acquise en 1864 du Musée de Vienne.

C. Dessus en arrière du cou ou du manteau présentant des bandes alternes bien définies, noires et d'un roux ochracé clair ou passant même au blanchâtre sur les ailes. Les mâles du Crypturus erythropus font, cependant, pour la plupart, une exception à cette règle. Pieds jaunes ou rougeâtres.

Les trois premières espèces offrent entre elles la plus grande affinité, de là qu'il importe d'étudier de rechef et leurs caractères constants et leur distribution géographique. Ce sont: Crypturus Sallaei, caractérisé par son cou tirant au gris avec de fines bandelettes noires, par le noir de la tête, borné au front, par le dessus de la tête ondulé de roussâtre et par les

côtés de la tête d'un roux interrompu par une large raie foncée traversant la région de l'ouie; puis Crypturus variegatus, caractérisé par le noir du front s'étendant jusque sur la nuque, par les côtés de la tête foncées, par son cou d'un roux jaunâtre, par les bandelettes du dos et des ailes ne tirant guère au blanc; enfin Crypturus noctivagus, distingué par une taille plus forte, par une raie claire bordant les côtés du sommet de la tête, et par le brun-roux du jabot.

CRYPTURUS SALLAEI, Sclater et Salvin, Exot. Ornith., pl. 45, p. 89. — Nothocercus Sallaei, Bonap., Compt. rendus, 1855, p. 954. — Tinamus Sallaei, Sclater, Proc. Zool. Soc. London, 1859, pp. 369 et 392.

Taille égalant environ celle de la perdrix. Dessus de la tête et du cou d'un brun roussâtre, ordinairement traversé par des bandelettes noires plus ou moins apparentes. Front noir. Côtés de la tête plus claires. Gorge d'un blanc passant quelquefois au roux. Dessous du cou d'un gris roussâtre, relevé par de fines lignes transversales, en zig-zag et noires. Manteau, scapulaires et dos ornés de bandes alternes noires et d'un brun roussâtre. Ailes et queue d'un noir ou brun noirâtre relevé par des bandelettes d'un blanc sale. Dessous en arrière du cou d'un roux jaunâtre plus clair sur la poitrine et tirant au blanchâtre sur le ventre et les sous-caudales. Plumes postérieures des flancs, du bas-ventre et sous-caudales avec des bandelettes noires. Pieds jaunâtres. Dans les vivants les pieds sont rouges, la mandibule supérieure est brunâtre, l'inférieure pâle et l'iris brun de noisette: Sumichrast, Bulletin of the United States National Museum, 1876, p. 45.

Aile cinq pouces sept lignes à six pouces. Queue vingt-deux lignes. Tarse vingt et une ligne. Doigt du milieu onze à treize lignes. Bec neuf à onze lignes.

Cette espèce a été découverte au Mexico du Sud, et dans les parties orientales de Guatemala. Des oiseaux semblables nous ont été, toutefois, adressés de St. Fé da Bogotà et de Suriname.

1. Mâle adulte, Mexico méridional, du voyage de Sallé, obtenu en 1864. — 2. Adulte, Guatemala, voyage de Salvin, obtenu en 1868. — 3. Individu rapporté de Bogotà par feu van Lansberge, obtenu en 1864. — 4. Individu envoyé en 1860 de Suriname, présenté en 1854 par la Société Royale de Zoologie d'Amsterdam. Notez qu'un individu absolument semblable se trouve dans la collection de cette société. — 5. Individu adulte, Suriname, acquis en 1869. — 6. Mâle adulte, Mexico méridional, acquis en 1879 de Mad. Verreaux. — 7. Adulte, monté à Suriname, présenté en 1879 par la Société zoologique d'Amsterdam.

CRYPTURUS VARIEGATUS, Wagler, Syst. avium, spec. I. — Tetrao variegatus, Gmelin, et Tinamus variegatus, Latham: fondés l'un et l'autre sur le Tinamou varié de Buffon, Pl. enl. 828. -- Cryptura variegata, Vieillot. — Tinamus brevirostris, Natterer, dans von Pelzeln, Verhand. Zool. Bot. Gesellschaft, Wien, 10 Oct. 1863 (jun?).

Taille rappelant celle de la perdrix. Tête en dessus et nuque noires. Côtés de la tête d'un brun foncé, interrompu au dessus de la région des ouies par une raie longitudinale roussâtre, mais peu prononcée. Gorge blanche. Cou d'un roux clair. Manteau d'un roux plus foncé. Les autres parties supérieures ornées de bandelettes alternes noires et rousses. Jabot et côtés de la poitrine d'un roux jaunâtre très vif. Les autres parties inférieures d'un roux blanchâtre passant au blanc sur le ventre. Plumes postérieures des flancs et sous-caudales avec des bandelettes noires. Pieds d'un gris jaunâtre (Wied).

L'oiseau à l'âge moyen ne se distingue guère des adultes que par sa moindre taille et son bec plus court. C'est probablement le Tinamus brevirostris de Natterer.

Aile cinq pouces neuf lignes. Queue deux pouces deux lignes. Tarse dix-neuf lignes. Doigt du milieu dix lignes. Bec onze lignes.

Buffon avait reçu de Cayenne l'individu de son Tinamus

varié. L'espèce s'y trouve en effet, comme il résulte des individus obtenus depuis de cette colonie. Elle habite, suivant Schomburgk, toute la Guyane Anglaise. Le Prince Max. de Wied l'a observée dans les grandes forêts depuis Rio de Janeiro jusqu'à Bahia. Natterer en a rapporté des individus des forêts du Rio Madeira inférieur, de celles bordant le Rio Negro et de la province de Parà. Il paraît que l'espèce ne se trouve pas au Sud des contrées que nous venons d'énumérer, et elle n'a pas été non plus observée au Paraguay.

1. Mâle adulte, tué le 11 Juin 1830 près de Borbà, voyage de Natterer, obtenu en 1864 du Musée de Vienne. — 2. Femelle adulte, tuée le 10 Juillet 1830, près de Borbà, voyage de Natterer, acquise en 1864 du Musée de Vienne. — 3. Adulte, Cayenne. — 4 et 5. Adultes, Cayenne, 1879. — 6. Adulte, Cayenne, 1880. — 7. Individu à l'âge moyen, Cayenne, 1879 (Tinamus brevirostris, Natterer): aile quatre pouces onze lignes; bec neuf lignes; tarse dix-huit lignes; doigt mitoyen sans l'ongle neuf lignes.

CRYPTURUS NOCTIVAGUS, Wagler, Syst. avium, spec. 6. — Tinamus noctivagus, Max. de Wied, p. 504. — Pezus Zabélé, Spix., Aves Bras., pl. 77.

Le Crypturus transfasciatus de Sclater et Salvin, Proc. Zool. Soc. Lond. 1878, p. 141, pl. 13, originaire de l'Écuador ne paraît s'éloigner du Cr. noctivagus que par son manteau orné de bandelettes rousses.

Très semblable au Crypturus variegatus; mais d'une taille un peu plus forte, avec une raie claire occupant les freins et se prolongeant au dessus de l'oeil jusque dans la nuque, au jabot d'un brun-roux s'étendant jusque sur le dessous du cou où l'on voit des bandelettes noires, enfin offrant toutes les teintes plus foncées et les bandelettes des ailes d'un blanc sale plus prononcé. Iris d'un brun-jaune.

Aile six pouces sept lignes. Queue vingt-deux lignes. Tarse deux pouces. Doigt du milieu un pouce. Bec un pouce.

Le Prince Max. de Wied a observé cet oiseau depuis Rio de Janeiro jusque vers Bahia, où il vit dans les mêmes forêts que le Crypt. variegatus. Schomburgk le fait venir de la Guyane Anglaise, et Tschudi du Pérou. Les quatre individus du Musée de Berlin sont originaires de Montevidéo, et ceux du Musée de Vienne de Bahia.

1. Mâle adulte, Brésil oriental, voyage du Prince de Wied. — 2. Adulte, Brésil, acquis en 1879 de M. Schneider à Bâle. — 3. Adulte, Brésil, Mad. Verreaux, 1879. — 4. Jeune individu Brésil, Mad. Verreaux, 1879.

L'espèce suivante s'éloigne de toutes les autres, en ce que le système de coloration du mâle diffère ordinairemant de celui des femelles.

CRYPTURUS ERYTHROPUS. — Tinamus erythropus, Natterer, Verhandl. der Zool. Botan. Gesellschaft zu Wien, 1863, p. 1127. — Crypturus atricapillus, Tschudi, Fauna Peruana, p. 284.

Taille de la perdrix. Pieds d'un rouge, passant au jaune après la mort.

Mâle: tête et cou d'un roux, plus foncé sur le dessus du cou, passant au noir vers le front, et remplacé quelquefois par du blanc sur la gorge. Dessus en arrière du cou d'un brun roussâtre, lavé d'olivâtre sur les couvertures alaires, le tout marqué de très fines lignes transversales, en zig-zag et noires. Jabot d'un gris clair tirant à l'olivâtre. Dessous en arrière du jabot d'un roux jaunâtre, tirant fortement au blanc sur le ventre et varié de noir sur les sous-caudales.

Notez que l'un des quatre mâles du Musée de Vienne offre des bandelettes blanches assez sensibles sur les ailes et les couvertures sous-caudales.

Aile cinq pouces neuf lignes. Queue deux pouces. Tarse vingt et une lignes. Doigt du milieu un pouce. Bec dix lignes.

La découverte de cette jolie espèce est due à feu Natterer, qui l'a observée sur les bords du Rio-Negro et du Rio-Branco.

1. Mâle adulte, tué le 6 Nov. 1832, Barra do Rio-Negro, voyage de Natterer, obtenu en 1864 du Musée de Vienne. — 2. Adulte, Amazonie, acquis en 1872.

Femelle: Le dessus en arrière du manteau est orné de bandes alternes noires et d'un roussâtre tirant fortement au blanc sur les ailes et la queue. Les plumes postérieures ainsi que celles des flancs et des jambes présentent des bandes noires.

Aile cinq pouces neuf lignes à six pouces. Tarse vingt-deux lignes. Doigt mitoyen dix lignes. Bec dix lignes.

3. Femelle, tuée au mois de Juillet près des bouches du Rio-Negro, voyage de J. Natterer, acquise en 1862. — 4. Individu parfaitement semblable au N°. 3, Amazonie, acquis en 1879.

RHYNCHOTUS.

Les Rhynchotus sont des espèces de forte taille, vivant dans les hautes herbes, et offrant le caractère facile à saisir, savoir que leurs grandes rémiges ainsi que toute la surface inférieure des ailes sont d'un roux très clair et uniforme. Elles ont la gaîne cornée de la mandibule supérieure d'une seule pièce, et cette mandibule est déprimée, sensiblement courbée vers le bas et à bords latéraux tranchants, tandis que les narines se trouvent reculées jusqu'à la fin du premier tiers du bec.

La teinte dominante du plumage est d'un roux isabelle, interrompu, sur le dessus en arrière du cou, par de larges taches transversales et noires bordées par derrière d'un liséré blanc.

RHYNCHOTUS RUFESCENS, Wagler, syst. av., spec. 1. — Tinamus rufescens, Temminck, Pig. et Gall., tome 3, pp. 552 et 748. Pl. col. 412. — Rhynchotus fasciatus, Spix, Aves Brasil., p. 60. — Ynambu guazu, d'Azara, tome 4, p. 143: Crypturа guazu, Vieillot. - Crypturus rufescens, Lichtenstein, Verzeichniss, 1823, p. 67.

Tête et cou d'un roux jaunâtre très clair et pâle, interrompu par une raie noire s'étendant depuis le front jusqu'à la nuque

ainsi que par une tache noire sur la région des ouies; gorge blanche. Dessous, en arrière du cou, d'un gris isabelle, quelquefois relevé par des bandelettes plus claires, tandis que l'on voit, sur les plumes postérieures des flancs, celles du bas-ventre et sur les sous-caudales des bandelettes étroites, éparses et noires, en outre, de bandelettes blanchâtres occupant les sous-caudales. Taches noires du dos grandes.

La livrée des petits en duvet (dont j'ai vu quatre individus au Musée de Vienne) est curieuse, et par la nature des plumes dorsales et alaires, et par son système de coloration. M. Büttikofer en a pris la note suivante. En dessous unicolore comme dans les adultes. Gorge blanche. Sommet de la tête et cou rayés longitudinalement de blanc. Cou d'un jaune de rouille unicolore. Dos et ailes revêtus de deux sortes de plumes: les unes en guise d'un simple duvet blanc; les autres, entremêlées aux premières, en soie, noires, mais bifurquées vers leur extrémité et se transformant, chacune, en deux épines rouges, longues de trois lignes. Bec presque droit et obtus.

Aile sept pouces. Queue deux pouces et demi. Tarse vingt-six lignes. Doigt du milieu seize lignes. Bec dix-huit lignes.

A juger des indications d'Azara, il paraît que cet oiseau est répandu dans tout le Paraguay. Le Musée Britannique en possède un individu provenant de Maldonado dans l'Urugay. Natterer en a tué des individus dans la Capitainerie de St. Paul. Spix dans la même province et dans celle de Minas-Geraës.

D'Azara a fourni des détails intéressants sur ses habitudes. Quand il est effrayé ou affecté, il relève les plumes de sa tête en forme de huppe. On ne le trouve que dans les pâturages gros et les herbes hautes, il se tient caché dans l'herbe, et il ne s'envole que lorsqu'on lui jette des pierres. Il va ordinairement, au clair de la lune et des crépuscules, dans les blés et les maïs nouvellement semés. Il ramasse les grains qui ne sont pas recouverts de terre, il retire même ceux qui sont enterrés. Son cri que l'on entend de fort loin est un sifflement triste et un peu tremblant, qui ne paraît pas destiné à se rappeler entre

eux, puisqu'on les entend des heures entières, sans qu'ils changent de place. Quelques personnes élèvent des Ynambus guazus; mais ils sont toujours farouches, et ils s'échappent aussi tôt qu'ils le peuvent. Leur ponte se compose de sept oeufs colorés en violet très brillant, d'une égale grosseur aux deux bouts, et dont les diamètres ont vingt-sept et vingt lignes. Il prend soin de cacher ses oeufs dans quelques touffues de paille ou d'herbes; et l'on m'a assuré qu'au moment de leur naissance les petits courent chacun de leur côté. Ce qu'il y a de certain c'est que l'on ne les rencontre jamais réunis en familles ou en troupes, et qu'ils ne sont pas plus rapprochés l'un de l'autre que de quarante pas. La chair des oiseaux de cette espèce passe pour être un peu meilleure que celle de l'Ynambui (Nothura maculosa) et la chair de toutes deux est moins bonne que celle de la perdrix d'Espagne. A Montevidéo on les chasse avec des chiens qui les font lever, les suivent et les prennent à la seconde ou à la troisième remise. On les tue aussi facilement à coups de fusil; mais il est nécessaire d'avoir un chien qui les fasse lever. Noseda en a pris plusieurs aux pièges, il les a nourris en cage; ils buvaient comme les poules bien que je ne crois pas qu'ils boivent à l'état de sauvages. Ces oiseaux captifs étaient sans cesse occupés à se becqueter mutuellement le dos, jusqu'à ne pas y laisser une plume; mais ils ne se piquaient pas la peau, et ne paraissaient pas souffrir de ce manège; du reste, leur naturel est en tout indifférence et stupidité.

A la fin de Décembre j'achetai un jeune oiseau de cette espèce, qui avait six pouces et demi de longueur totale; plusieurs lignes noires sur le sommet et les côtés de la tête; le dessus du corps d'un brun foncé et tacheté de blanc; le dessous d'un brun clair; tout le plumage tellement brouillé et hérissé, qu'au toucher il ressemblait à la peau des quadrupèdes; enfin pour toutes pennes aux ailes, celles de la partie extérieure, qui étaient rouges. Je lâchai ce jeune oiseau dans ma maison; et il commença aussitôt à me suivre, en criant, sans jamais s'éloigner de moi. Je lui présentais du maïs pilé et de

petits morceaux de pain et de viande crue; il mangeait de tout et il aimait mieux prendre sa nourriture dans ma main, que de l'amasser à terre. Il dormait derrière un coffre près de mon lit, et s'il m'entendait faire le moindre mouvement pendant la nuit, il semblait répondre par un petit cri. Quand il avait envie de manger, il me becquetait les jambes, et il en faisait autant à tous ceux qui entraient dans ma chambre, de sorte qu'il ne paraissait pas me préférer. Au bout d'un mois et demi, il mourût de convulsions, après avoir pris les deux tiers de son accroissement et des couleurs de l'oiseau adulte. J'attribuai sa mort à la grande quantité de viande qu'il mangeait, et qu'il préférait à toutes les autres nourritures.

1. Mâle adulte, Capitainerie de St. Paul, voyage de Natterer: individu figuré par Temminck, Pl. color. 412. — 2. Femelle adulte, tuée le 26 Sept. 1821, Ypanéma, voyage de Natterer, acquise en 1864 du Musée de Vienne. — 3. Adulte, Brésil méridional, acquis en 1879.

RHYNCHOTUS MACULICOLLIS, J. E. Gray, List Br. Mus., Gallinae, 1867, p. 102.

Cette espèce remplace le Rhynchotus rufescens dans la Bolivie. Elle lui porte en général assez de ressemblance; quoiqu'elle s'en distingue constamment et au premier coup d'oeil par les traits suivants.

Teintes générales tirant plus fortement sur le roussâtre. Plumes de tout le cou, à l'exception de la gorge, ornées chacune d'une tache longitudinale brunâtre. Plumes du jabot, des côtés du corps, des jambes et des sous-caudales ornées de bandes brunes avec un liséré noir par devant et par derrière, enfin par des taches noires plus nombreuses et plus serrées sur les parties supérieures.

Aile sept pouces trois lignes. Queue deux pouces huit lignes. Tarse vingt-cinq lignes. Doigt du milieu quatorze lignes. Bec seize lignes.

1. Adulte, Bolivie, voyage de d'Orbigny.

NOTHURA.

Je réunis sous ce nom, outre celles indiquées par les auteurs, plusieurs autres espèces comprises par eux dans le genre Rhynchotus. Les Nothures, qui, comme les Rhynchotes, paraissent habiter les lieux couverts d'herbes et situés en dehors des bois, se distinguent de tous les autres oiseaux de la tribu des Tinamous par les traits suivants. Leur taille n'excède pas celle de la perdrix ou est même réduite à celle de la caille. Leurs grandes rémiges sont d'un brun, relevé sur leur barbe externe par des bandes blanches ou roussâtres alternant régulièrement avec la teinte du fond, disposition qui manque cependant dans le Nothura nana. Les couvertures inférieures des ailes sont, soit grisâtres, soit d'un roux jaunâtre, mais constamment unicolores. Les plumes du dos, des épaules et les couvertures supérieures de la queue sont constamment pourvues d'un liséré latéral blanc ou blanchâtre, tandis qu'elles sont, en dedans de ces lisérés, d'une teinte foncée, diversement variée. La teinte du plumage est, en général, plus ou moins roussâtre. Les plumes du dessus de la tête ainsi que celles de la nuque et du dessus du cou sont pourvues d'une large tache longitudinale et noire. La gorge est blanche ou blanchâtre. Les pieds offrent une teinte claire. Les narines s'ouvrent, comme dans les Rhynchotus, près du front.

On ne distingue guère des pennes caudales dans la plupart des espèces.

Il paraît que les Nothures n'habitent que la partie méridionale de l'Amérique du Sud, au Nord, un peu au delà de Rio de Janeiro, jusque dans la province de Minas-Geraës, dans la Bolivie et au Chilé.

I. Dessous du cou et jabot sans taches. Couvertures sous-alaires d'un gris pâle. Bec et narines semblables à ce que l'on voit dans les Rhynchotus. Teinte générale du plumage

tirant au gris brunâtre. Le noir des plumes du dessus traversé par de fines stries d'un brun roussâtre renfermant une bandelette noire. Bandelettes de la barbe externe des grandes rémiges blanches.

NOTHURA PERDICARIA, Gray, List Brit. Museum, 1844, p. 53. — Crypturus perdicarius, Kittlitz. — Rhynchotus perdicarius, Bonaparte et Gray 1867.

Taille approchant de celle de la perdrix. Couvertures supérieures de l'aile d'un roussâtre relevé par de larges taches transversales et noires. On observe de semblables taches sur la barbe externe des rémiges secondaires, mais elles se détachent sur un fond roux, tandis que la barbe interne de ces rémiges est d'un noir brunâtre. Jabot et côtés du tronc d'un gris cendré pâle, passant au blanchâtre sur la poitrine, le ventre et les sous-caudales. Plumes postérieures des flancs ornées de bandelettes noires. Mandibule supérieure noirâtre, inférieure blanchâtre.

Le système de coloration des petits en duvet rappelle celui des poussins du Rhynchotus rufescens.

Aile six pouces à six pouces quatre lignes. Queue deux pouces et demi. Tarse seize à dix-huit lignes. Doigt du milieu onze lignes. Bec dix lignes.

Cette espèce n'a été observée qu'au Chilé. On en doit la découverte à feu von Kittlitz.

1. Adulte, Chilé, voyage de d'Orbigny. — 2. Mâle adulte, Chilé, voyage de Reed, acquis en 1874. — 3. Adulte, Chilé, acquis en 1864. — 4 et 5. Adultes, Chilé, acquis en 1879 [1]).

1) NOTHURA CINERASCENS, Burmeister, Journ. Cabanis, 1860. — Rhynchotus cinerascens, G. R. Gray, List Gallinae, p. 103.

Je ne connais de cette espèce qu'un seul individu, envoyé du Musée de Berlin Cordoba, dans la République Argentine. Il rappelle en général, par sa taille et se teintes, le Nothura perdicaria, mais il a le bec plus robuste et les ailes d'un tiers de pouce plus longues. Les tarses sont également un peu plus longs et un peu plus forts. Les plumes du jabot tirent plus fortement au bleu grisâtre et chacune d'entre elles est ornée de deux taches blanches, accouplées à leur bord supérieur par une large bande en zig-zag et noire. La teinte générale des flancs est un blanc grisâtre, et non pas un roux rougeâtre, comme dans le Nothura perdicaria.

L'individu du Musée Britannique vient de Coquimbo.

NOTHURA PUNCTULATA, Gray, Histoire du Chilé, tome 1, p. 391. — Rhynchotus punctulatus, J. E. Gray, List, Gallinae, 1867, p. 103. — Nothura Doeringii, Cabanis, Journal für Ornithologie, 1878, p. 198: établi d'après un individu conservé dans le Musée de Berlin.

En général très semblable au Nothura perdicaria, mais d'une taille moins forte, au bec plus courbé et d'une teinte rouge, à la barbe externe des rémiges secondaires d'un noirâtre uniforme au lieu de roux, aux couvertures alaires externes d'un gris-brun relevé par des taches blanches orbiculaires, très petites et nombreuses et par des gouttes semblables distribuées sur les plumes des côtés du tronc; enfin au gris du jabot tirant au violet.

Aile cinq pouces. Queue deux pouces. Tarse dix-huit lignes. Doigt mitoyen douze lignes. Bec dix lignes.

Habite le Chilé.

1. Adulte, Chilé, voyage de d'Orbigny [1]).

II. Côtés et dessous du cou, ainsi que le jabot ornés de taches longitudinales noires. Couleur du fond des deux barbes des rémiges secondaires d'un roux jaunâtre. Teinte générale du plumage tirant plus ou moins au roux. Pennes de la queue ainsi que ses couvertures inférieures se présentent sous la forme de plumes à barbes détachées et molles. Couvertures inférieures des ailes d'un jaune roussâtre clair.

Les espèces de cette subdivision se distinguent encore de cel-

---

1) NOTHURA CURVIROSTRIS. — Nothoprocta curvirostris, Sclater et Salvin, Nomencl. av. neotr., p. 156.

Cette espèce rappelle en général le Nothura perdicaria; mais elle s'éloigne de cette espèce pour se rapprocher du Nothura punctulata, par son bec courbé qui, également grêle, est toutefois un peu plus long. Elle offre, en outre, des ailes plus courtes, mais, par contre, des doigts plus longs que le Nothura perdicaria. Gorge blanche. Plumes du jabot, de la poitrine et du ventre d'un rouge couleur de rouille clair avec un liséré blanc peu sensible. Plumes du jabot ornées, chacune, d'une tache longitudinale noire, mais qui s'élargissent, vers la poitrine, pour former des bandes transversales.

Aile six pouces et demi. Bec treize lignes. Doigt du milieu treize lignes.

les de la première par la gaîne cornée de leur mandibule supérieure divisée en trois pièces, ainsi que cela a lieu dans les Tinamous proprement dits et dans les Cryptures.

A. Taches foncées, ornant les côtés et le devant du cou, ainsi que le jabot, grandes et noires. Bandelettes noires des plumes du dos irrégulièrement disposées. Teinte générale du plumage d'un roux pâle.

NOTHURA MACULOSA, J. E. Gray, List Brit. Mus., Gallinae etc., 1844, p. 53. — Ynambui, d'Azara, tome 4, p. 146. — Tinamus maculosus, Temminck, Pig. et Gallin., tome 3, p. 557 et 748. — Cryptura fasciata, Vieillot, Dict. Déterv., tome 34, p. 109. — Tinamus major, Spix, Aves Bras., tome 2, p. 64, pl. 80 (nec Gmelin). — Crypturus maculosus, Lichtenstein, Verzeichniss, 1823, p. 68. — Nothura major, Wagler, Syst. avium, sp. 2.

Taille intermédiaire entre celles de la perdrix et de la caille. Taches du jabot et du cou longitudinales, plus ou moins grandes suivant les individus. Un des individus adultes du Musée de Vienne est remarquable par le manque de bandes transversales noires, ornant ordinairement le dos. Un autre individu offre absolument le système ordinaire de coloration des adultes, quoiqu'il soit jeune, n'ayant encore acquis que la moitié de la taille à laquelle parvient l'espèce. Dans les vivants l'iris est couleur d'orange, la mandibule supérieure d'un brun de corne foncé, mais à bords couleur de chair blanchâtre, teinte qu'offre également toute la mandibule inférieure. Les pieds sont couleur de chair brunâtre (Max. de Wied).

Aile quatre pouces neuf lignes. Queue vingt lignes. Tarse dix-sept à dix-huit lignes. Doigt mitoyen dix lignes. Bec huit lignes.

D'Azara rapporte que cet oiseau se trouve depuis le Paraguay jusqu' à Buenos-Ayres et Montevidéo. Le Prince Max de Wied ne l'a observé que dans les plaines couvertes d'herbes, avoisinant les fleuves Parahyba et Barganza au Nord de Rio de Ja-

neiro. Spix ne l'a rencontré que dans les champs de la province de Minas-Geraës près des lieux appelés Tejuco et Contendas; Natterer n'a tué les individus rapportés de ses voyages que dans la province de St. Paul. Nous en avons reçu des individus indiqués comme provenant de la Patagonie.

Suivant d'Azara, cet oiseau fait entendre fréquemment, pendant toute l'année, son cri long, cadencé, mélancolique, point agréable et assez fort pour être entendu de loin. Sa ponte est de six à huit oeufs, violets et semblables à ceux du Rhynch. rufescens; leur teinte est seulement plus sombre, et ils ont de diamètre treize et dix-huit lignes. Il ne quitte pas les campagnes, ne boit pas, même en domesticité, et sa chair est médiocre. Si on élève de jeunes oiseaux de cette espèce, ils ne connaissent point leur maître, et ils s'échappent aussitôt qu'ils en trouvent l'occasion. Ces oiseaux ne se cachent pas autant que le Rhynch. rufescens, et ils évitent difficilement la serre de l'oiseau de rapine. Personne ne leur fait la chasse, ni ne les mange au Paraguay; mais comme il y a moins de plaines, ils sont aussi moins nombreux qu'à Montevidéo et à Buenos-Ayres, où j'en ai vu donner jusqu'à six pour un demi-réal quoiqu'à présent ils y valent davantage, parce qu'ayant été détruits aux environs de ces deux villes, on les y apporte de loin. La manière de les prendre est une preuve de leur naturel stupide. La voici: le chasseur a une gaule de six à neuf pieds de long, au bout de laquelle est ajusté un lacet en nœud coulant, fait avec une plume d'autruche, afin qu'il se tienne ouvert. Muni de cet instrument et d'un sac, le chasseur entre dans les campagnes, et quand il rencontre un Ynambui, il en approche en faisant quelques circuits avec son cheval; l'oiseau se tapit, et reçoit sans bouger le lacet au cou. La quantité innombrable d'Ynambuis que l'on mange à Buenos-Ayres, se prend de cette manière. On en tue quelquefois à coup de fusil ou d'épée, et on peut même les saisir à la main.

1. Femelle adulte, province de St. Paul, voyage d'Aug. de St. Hilaire. — 2. Adulte, St. Paul, acquis en 1865. — 3.

Adulte, Brésil méridional, acquis en 1870. — 4 et 5. Adultes, aux teintes un peu plus foncées que d'ordinaire, acquis en 1873, comme provenant de la Patagonie. — 6. Brésil, 1879 [1]).

NOTHURA MARMORATA, G. R. Gray, List Brit. Mus., Gallinae, 1867, p. 104.

En général semblable à la Nothura maculosa; mais d'une taille beaucoup moins forte et plus particulièrement distinguée par les taches foncées du jabot larges et presque en guise de bandes transversales, par les couvertures alaires bordées de blanc et de noir, rousses au centre et ne montrant qu'une seule bande noire, enfin par un bec plus court.

Aile quatre pouces huit lignes. Queue vingt lignes. Tarse quatorze lignes. Doigt mitoyen huit lignes. Bec six lignes.

Je ne connais, outre le nôtre, que deux individus de cette espèce, savoir celui du Musée de Vienne, et celui du Musée de Berlin où il porte l'épithète de maculosa.

Habite la Bolivie.

1. Adulte, Bolivie.

1) NOTHURA BORAQUIRA, Wagler. — Tinamus boraquira, Spix, Av. Bras., pl. 79, p. 63.

Cette espèce appartient au nombre des plus rares. Je n'en connais que les individus conservés dans les Musées de Munich et de Vienne. Ils sont tous parfaitement semblables entre eux et à la figure qu'en a donnée Spix.

Le Nothura boraquira se rattache naturellement au Nothura maculosa; mais il est d'une taille un peu plus forte, et il présente des modifications constantes dans le système de coloration.

M. Büttikofer a pris la note suivante sur les individus des Musées de Vienne et de Munich.

Aile cinq pouces et cinq lignes. Tarse seize lignes. Doigt du milieu douze lignes. Tête comme dans le Nothura maculosa. Teinte du fond occupant le cou, le jabot et toutes les parties supérieures de l'oiseau, non pas d'un jaune-roux pur comme cela se voit dans le Nothura maculosa, mais lavée de violet, notamment sur les bandelettes latérales claires qui, du reste, sont plus larges que dans le Nothura maculosa. Les bandelettes des plumes dorsales sont moins nombreuses, mais, par contre, beaucoup mieux prononcées. Les bandelettes claires des ailes tirent plus fortement au blanc. Les rémiges secondaires n'offrent des bandelettes que sur leur barbe externe tandis que de pareilles bandes existent encore sur les barbes internes de ces rémiges chez les Nothura maculosa, marmorata et media. Plumes du devant du cou avec de larges taches noires en flammèche. Plumes du jabot et des flancs assez sensiblement ornées de lignes transversales noires. Poitrine et ventre d'un blanc pur.

B. Teinte dominante du plumage d'un roux jaunâtre. Taches noires du cou et du jabot étroites et bordées de roux foncé.

NOTHURA MEDIA et **MINOR**, Wagler, Syst. avium, Nos. 3 et 4. — Tinamus medius et minor, Spix, Aves Brasil,, tome 2, p. 65, pls. 81 et 83. — Nothura maculosa, Bonap. (ex parte).

Teinte foncée des plumes du dos, des scapulaires et des sous-caudales résultant de fines bandelettes ondulées, alternes, rousses et noires.

Comparée au Nothura maculosa, on voit que cette espèce offre une taille beaucoup moins forte, que la teinte du fond de son plumage tire beaucoup plus au rouge couleur de rouille, et que cette teinte se répand également sur les plumes du dos, dont les bandelettes transversales sont beaucoup plus fines et plus nombreuses, que le sommet de la tête est encore d'un roux-rouge, au lieu de noir, enfin que les bords latéraux des plumes du dos sont beaucoup plus étroits.

Adultes. Aile quatre pouces à quatre pouces trois lignes. Queue quatorze lignes. Tarse douze à quinze lignes. Doigt du milieu sept à huit lignes. Bec huit lignes.

Le jeune oiseau a été décrit sous l'épithète de „minor". Il porte, au Musée de Berlin le nom de „Nothura nana". Notre individu offre les mesures suivantes. Aile trois pouces dix lignes. Queue vingt-deux lignes. Tarse douze lignes. Doigt du milieu six lignes. Bec huit lignes.

Les dimensions de l'individu type du Nothura minor conservé au Musée de Munich sont un peu différentes, savoir: aile quatre pouces et une ligne; tarse onze lignes; doigt du milieu cinq lignes; bec cinq lignes. Notez que l'individu type du Nothura media de Spix n'existe plus dans ce Musée.

Spix et Natterer ont observé cette espèce dans les provinces de St. Paul et de Minas-Geraës.

1, 2, 3. Adultes, Brésil méridional. — 4. Jeune individu, Brésil. (Nothura minor, Wagler) [1]).

TINAMOUS A TROIS DOIGTS. EUDROMIA.

L'on ne connaît avec certitude que deux espèces de cette seconde division principale. Elles ont été comprises sous le nom générique d'Eudromia. On les reconnaît au premier coup-d'oeil au manque total du pouce. Ce sont des oiseaux de grande taille, ayant le dessus, à partir du cou, parsemé de très nombreuses taches claires. Les rémiges sont d'un gris, plus foncé sur la barbe externe et relevé par des bandes blanches.

---

1) NOTHURA NANA, Wagler, systema avium, N°. 5. — Tinamus nanus, Temminck, pl. col. 316.

Cette espèce remarquable se rattache naturellement au Nothura media, mais elle se distingue de celui-ci, ainsi que de tous les autres Nothures, par le caractère exceptionnel du manque de bandelettes claires sur la barbe externe des rémiges, et elle s'éloigne, en outre, de toutes les espèces de la tribu entière par sa taille excessivement petite, accompagnée d'un développement très sensible des plumes sous-caudales, notamment chez le mâle adulte.

Le Tinamou nain appartient au nombre des espèces les plus rares. Je n'en connais d'autres dépouilles que celle du mâle adulte figuré par Temminck et lequel fait, avec sa femelle, partie du Musée de Paris; puis celles de trois femelles adultes et de deux jeunes mâles, tous conservés au Musée de Vienne.

Les individus du Musée de Paris ont été rapportés en 1822 par A. de St. Hilaire de Franca, dans la Capitainerie de St. Paul au Brésil. J. Natterer a obtenu les individus du Musée de Vienne dans la même province et dans celle de Minas-Geraës.

Aile: dans le mâle adulte trente-sept lignes; dans les femelles adultes trente-trois à trente-six lignes. Sous-caudales: dans le mâle vingt et une ligne; dans les femelles quinze à dix-sept lignes. Bec: cinq à six lignes. Tarse huit lignes. Doigt du milieu: six lignes.

M. J. Büttikofer a dressé la note suivante sur les individus du Musée de Vienne. Système de coloration du plumage rappellant en général celui des autres espèces de Nothures, mais offrant des teintes un peu plus foncées. On voit, en outre, que le sommet de la tête, les épaules, le dos et le croupion offrent, sur un fond couleur de rouille et moiré de noir, de larges taches de forme quadrangulaire et noires, mais traversées près de leur bord postérieur par une ligne en zig-zag, blanche ou d'un jaune roussâtre. Rémiges d'un brun-gris uniforme. Gorge, jabot, poitrine et ventre blancs; mais les plumes du jabot sont largement bordées de jaune roussâtre et ornées, chacune, d'une tache foncée. Côtés de la poitrine et tectrices supérieures des ailes ornées de bandelettes alternes noires et d'un jaune roussâtre. Pieds jaunes.

Les mandibules sont noires, les pieds d'un gris plombé. La mandibule supérieure présente, de chaque côté, une rainure partant des narines, qui sont reculées vers le front.

Ces oiseaux n'ont été observés que sur les plaines élevées du Pérou, du Chilé, de la Bolivie et de la Patagonie, où ils paraissent remplacer les outardes de l'Ancien Monde.

EUDROMIA PENTLANDII. — Tinamotis Pentlandii, Vigors, Proc. Zool. Soc. Lond., 1836, p. 79; Gray and Mitchell, Genera of Birds, tome 3, pl. 138.

Taille de la poule. Plumes de la tête et du cou d'un blanchâtre plus foncé sur le dessus et pourvues, chacune, à l'exception de celles de la gorge, d'une tache longitudinale noire. Les autres parties supérieures d'un gris lavé de bleuâtre, tirant, vers le derrière, fortement au jaunâtre et parsemé de taches très serrées en forme de bandelettes sur le manteau et les ailes, en celle de gouttes sur le dos et offrant une teinte roussâtre clair. Jabot, poitrine et côtés du corps d'un gris lavé de bleuâtre, mais garni de bandelettes serrées roussâtres sur le jabot, blanchâtres sur les côtés du corps. Ventre blanchâtre. Plumes postérieures des flancs, celles des jambes et sous-caudales d'un roux vif. Tarse couvert par devant de plusieurs rangées d'écailles presque orbiculaires et parfaitement séparées les unes des autres. Ongles gros, très courts et obtus.

Aile huit pouces six lignes. Queue trois pouces. Tarse vingt-deux lignes. Doigt mitoyen douze lignes. Bec onze lignes.

Cet oiseau se trouve, suivant Tschudi, au Pérou et dans la Bolivie jusque dans le Chilé septentrional. Il y habite la région alpine depuis une élévation de douze mille pieds au dessus du niveau de la mer. Il se tient parmi les herbes, niche à terre et la ponte est de quatre oeufs d'un beau vert, pointillés au gros bout, de brun foncé.

On ne rencontre que rarement dans les collections les dépouilles de cette espèce. Les Musées de Berlin, Dresde,

Vienne, Munich et Stoutgard n'en possèdent pas; mais j'en ai vu un individu dans le Musée de Pesth.

1. Mâle adulte, Alpes Boliviennes, voyage de d'Orbigny.

EUDROMIA ELEGANS, d'Orbigny et Is. Geoffroy, Études zoologiques 1832, Oiseaux, pl. 1.

Cette espèce se distingue de toutes les autres de la tribu des Tinamous par la présence d'une huppe occupant le vertex et composée de plumes effilées et recourbées vers le haut, semblable à ce que l'on observe dans le vanneau. Taille au dessous de celle de la poule. Dessus en arrière du cou d'un olivâtre parsemé (semblable à ce que l'on observe dans les pintades), de nombreuses taches en goutte blanchâtres et traversé par des lignes très-fines et noires. Les barbes internes des rémiges offrent des bandelettes blanches plus étroites que celles qui ornent les barbes externes. Plumes du dessous du cou et celles du jabot à baguettes noires et pourvues en outre de fines lignes transversales noires. Poitrine, plumes des côtés du corps et sous-caudales d'un blanchâtre relevé par des bandes noires. Queue allongée. Tarses revêtus par devant d'une seule rangée de plaques. Une raie blanche descend de chaque côté, depuis l'oeil le long des côtés du cou; on en voit une autre commençant derrière la bouche et se perdant sur les côtés du cou.

Aile sept pouces neuf lignes à huit pouces. Queue quatre pouces. Tarse vingt lignes. Doigt du milieu douze lignes. Bec douze lignes. Longueur de la huppe s'élève jusqu'à deux pouces six lignes.

L'Eudromia elegans se trouve dans tous les terrains sablonneux et arides qui entourent le grand bassin des Peirupas, mais non dans ce bassin lui-même. On le rencontre depuis le 38me degré de latitude jusqu'au 46me, et très-probablement aussi depuis la mer jusqu'aux Cordillières. Il ne commence à être commun que dans les déserts qui se trouvent au Sud du Rio Negro dans la Patagonie. Cet oiseau semble fuir non seulement les lieux habités, mais même les lieux habitables, la localité où

M. d'Orbigny l'a vu répandu le plus abondamment était un terrain sec, aride, presque sans végétaux, et éloigné de plus de dix lieues des points où l'on rencontre de l'eau douce. En un mot, il fuit les lieux humides, et recherche les terrains sablonneux les plus déserts et les plus arides. Dans la saison des amours, les Eudromies qui, ordinairement, vivent par petites troupes, se divisent par couples. Elles construisent, dans une touffe d'herbes ou au pied d'un buisson, un nid composé de tiges de graminées, et y déposent une douzaine d'oeufs d'un vert tendre. Les jeunes suivent la mère pendant assez longtemps. La nourriture de ces oiseaux consiste en petits fruits et surtout en graines. Ils courent avec une extrême agilité; leur vol est au contraire assez lourd et bruyant; ils ne volent jamais très loin, et il est rare qu'ils s'élèvent à plus de dix mètres au dessus du sol. Lorsqu'ils courent ou s'envolent, et aussi lorsqu'on les surprend, ils font entendre un sifflement aigu. Ils paraissent en général très craintifs et évitent toutes les autres espèces. La chair des Eudromies est très délicate, aussi leur donne-t-on la chasse. On les élève quelquefois aussi en captivité, mais, quelque apprivoisées qu'elles soient, elles s'échappent dès qu'elles le peuvent. Outre l'homme, elles ont pour ennemis les renards, divers oiseaux de proie et surtout les Çaraçoras qui en détruisent un grand nombre. L'Eudromia élégante est appelée par les Espagnols Perdiz de Copeta et aussi Martinete; par les Araucanos du Sud, Vuari, et par les Patagons Cunio. On la nomme aussi Yulmis dans quelques localités (d'Orbigny).

1. Mâle adulte, Patagonie, voyage de d'Orbigny. — 2, 3. Adultes, Chilé, acquis en 1872.

RÉSUMÉ.

		Page	Ind. montés.
Tinamus	tao, Nouvelle Grenade (Parà, Borbà, Mato-Grosso, Bolivie, Pérou).	8	1
»	solitarius, Rio de Janeiro, St. Paul (Paraguay, forêts depuis Rio de Janeiro jusqu'à Bahia).	10	3
»	robustus, Mexico méridional, Guatemala, Costa-Rica, Panama.	11	5
»	guttatus, Parà (Borbà, Rio-Negro jusqu'au Rio Ouape, Colombie.)	12	1
»	major, subcristatus et ruficeps, Suriname, Rio Negro, Borbà, Quito, Orenoko (Cayenne, Guyane Anglaise, Mato-Grosso, Ecuador).	13	11
»	nigricapillus, Colombie.	17	3
»	Julius, Colombie.	18	7
Crypturus	cinereus, Cayenne, Suriname, Borbà, Haut-Amazone, Chamicuros, (Pérou).	20	4
»	tataupa, Rio Grande do Sul, Cayenne, (Suriname, Paraguay, St. Paul, Rio Janeiro, Bahia, Rio Japura, Pérou).	21	5
»	parvirostris, St. Paul, (Bahia, Goyaz, Minas-Geraës).	22	4
»	obsoletus, St. Cathérine, St. Paul, Colombie, (Paraguay, Pérou).	22	12
»	pileatus, Mato-Grosso, Borbà, Cayenne, Suriname, Colombie (Guyane Anglaise, Rio Janeiro, Bahia, Trinidad).	24	5
»	pileatus meserythrus, Mexico méridional, Guatemala, Costa-Rica, Panama.	25	10
»	Boucardii, Mexico méridional, Guatemala.	26	4
»	strigulosus, Nouvelle Grenade (Borbà, Parà, Mato-Grosso).	27	1
	Transport		76

	Page.	Ind. montés.
Transport		76
Crypturus adspersus, Borbà, Parana supérieur, (Mato-grosso, Parà, Rio Branca, Rio Japura, Salimoëns, Pérou).	28	3
» undulatus, Mato-Grosso, (Paraguay).	29	2
» Saliaei, Mexico méridional, Bogotà, Suriname (Guatemala).	31	7
» variegatus, Borbà, Cayenne, (Guyane Anglaise, depuis Rio de Janeiro jusqu'à Bahia, Parà, Rio Negro).	32	7
» noctivagus, Brésil oriental (Guyane Anglaise, Bahia, Montevidéo, Pérou).	33	4
» erythropus, Barra do Rio Negro, Amazonie, (Rio branco).	34	4
Rhynchotus rufescens, St. Paul, (Paraguay, Urugay, Minas-Geraës).	35	3
» maculicollis, Bolivie.	38	1
Nothura perdicaria, Chilé.	40	5
» punctulata, Chilé.	41	1
» maculosa, St. Paul, Patagonie, (Paraguay, Buenos-Ayres, Montevidéo, Nord de Rio-Janeiro, Minas-Geraës).	42	6
» marmorata, Bolivie.	44	1
» media, St. Paul, Minas-Geraës.	45	4
Eudromia Pentlandi, Alpes Boliviennes, (Pérou, Chilé).	47	1
» elegans, Patagonie, Chilé.	48	3

OBTENU PENDANT L'IMPRESSION.

Tinamus major ruficeps, Ecuador, Medellin.	2
Crypturus obsoletus, juv., Ecuador.	1
» pileatus, Remedios (N. Grenade).	1
» noctivagus, juv., Ecuador.	1
Nothura assimilis, G. R. Gray, List Gallin., p. 105, Bahia [1]).	1
Total	134

1) Semblable au Nothura media par les taches du jabot très étroites, mais d'une taille considérablement plus forte, et à la teinte du fond du plumage pâle et non pas tirant au roux. Aile cinq pouces neuf lignes.

LES MÉGAPODES.

MEGAPODII.

PAR

H. SCHLEGEL.

Juin 1880.

Les Mégapodes forment, dans l'ordre des Gallinae, une tribu plus particulièrement isolée par le mode de propagation.

La plupart de ces oiseaux rappelle, par l'aspect général et la grosseur, nos poules ordinaires et ce n'est qu'un petit nombre d'entre eux qui égale, sous ce dernier rapport, nos coqs de très forte taille ou la dinde, s'éloignant, en même temps, par des modifications très sensibles dans la conformation de la queue, ou du cou, ou de la tête. Un trait distinctif et commun à tous réside, toutefois, dans la longueur des doigts, y compris le pouce, ainsi que dans leurs ongles robustes, allongés, mais seulement courbés d'une manière plus ou moins faible; enfin dans la disposition de tous les doigts dans le même plan, en sorte que la plante des pieds appuye, dans toute son étendue, sur le sol.

La tribu des Mégapodes se divise naturellement en quatre

genres, mais trois de ces genres, plus ou moins anormaux, ne se composent, chacun, que d'une seule ou de quelques espèces; tandis que toutes les autres espèces se réunissent en un seul genre, celui des Mégapodes proprement dits. Les autres genres sont ceux de Mégacephalon, Tallegallus et Leipoa.

Dans toute cette tribu, le bec est constamment de plus d'un tiers plus court que le reste de la tête, en général passablement faible, mais plus robuste dans le Mégacephalon et les Tallégalles. A l'exception du Leipoa, les côtés de la tête, la gorge et une partie du cou sont garnis de plumes lancéolées ou même rigides et, dans les adultes, souvent tellement clairsemées qu'elles font entrevoir ou sortir au jour la peau de ces parties, ordinairement colorée de rouge. Les plumes de l'occiput sont, mais seulement chez les Mégapodes proprement dits, allongées et forment une petite huppe, retroussée vers le haut à son extrémité. Les ailes sont environ d'un quart plus longues que la queue et arrondies, la cinquième des rémiges primaires dépassant en longueur les autres. La queue est en toit chez les Tallégalles, applatie chez le Leipoa, latéralement voutée chez le Maléo et les Mégapodes proprement dits. Dans ce dernier genre cet organe n'atteint pas même la moitié de la longueur des ailes; dans le Maléo et dans le Tallegallus Cuvieri, il dépasse d'un peu cette longueur; dans le Leipoa il égale deux tiers et dans le Tallegallus Lathamii trois quarts de la longueur des ailes. Il paraît qu'à l'exception des Tallégalles, ces oiseaux portent la queue pendante; aussi les Maléos vivant pendant deux ans dans le Jardin Zoologique d'Amsterdam n'ont-ils jamais fait mine d'ériger la queue. Les pieds sont très développés. Les tarses sont robustes et leur longueur offre environ un quart de celle des ailes. Les doigts, situés dans le même plan, sont également robustes et passablement longs, le doigt du milieu occupant en longueur plus de la moitié de celle du tarse, et le pouce en occupant plus que le tiers. Les ongles sont très développés, robustes et faiblement courbés.

Le système de colbration du plumage de ces oiseaux est le plus souvent assez simple, et ce ne sont que le Megapodius Wallacei, le Megacephalon maleo et le Leipoa, lesquels font exception à cette règle générale. Il n'existe pas non plus de différence sensible entre les teintes des deux sexes, et l'on peut encore appliquer cette thèse à la taille des deux sexes. Ce serait, cependant, suivant M. Gould, la femelle du Tallegallus Lathamii, qui resterait, sous ce rapport, constamment inférieure au mâle.

La propagation de ces oiseaux, encore insuffisamment étudiée, présente des variations sensibles suivant certaines espèces; cependant, un fait commun à tous, c'est que les femelles ne couvent pas elles-mêmes leurs oeufs, mais qu'elles les déposent dans le sable ou dans des débris de végétaux, abandonnant l'incubation à la fermentation ou à la chaleur humide produite par l'action du soleil. Certaines espèces, telles que le Mégapodius Duperreyi et le Tallegallus Lathamii, construisent à cet effet des tertres en forme de cone, d'une étendue et d'une hauteur très considérables; le Megapodius Wallacei dépose ses oeufs au fond d'un grand trou oblique creusé dans le sable. Les Tallegallus Lathamii se réunissent par couples pour construire un tertre qui sert en même temps à un certain nombre de femelles, contenant quelquefois plus d'une centaine d'oeufs. Quant au Maléo, l'on prétend que la même chose a lieu et de plus, que chaque femelle ne pond un oeuf que dans l'intervalle de huit à dix jours, phénomène qui rappellerait ce que nous observons chez la femelle de notre coucou commun.

Il paraît qu'il faut plusieurs mois au développement du petit dans l'oeuf. Sortis de la coque et du lieu de leur incubation, ils sont revêtus d'une espèce de duvet, mais les pennes des ailes sont déjà développées au point que ces petits êtres savent voler. Ils courent, du reste, avec une grande vitesse et se rendent aussitôt dans les forêts. Les voyageurs naturalistes ne sont pas d'accord sur la question, si les parents prennent soin de leur progéniture ou s'ils ne s'en soucient pas. Les oeufs

sont assez volumineux pour la taille de ces oiseaux et d'un blanc sale, tirant plus ou moins au roussâtre ou au brun, suivant l'influence du procès de fermentation des matières végétales où ils sont déposés. Ces oiseaux se nourrissent de fruits tombés, de baies, d'insectes et de limaçons, et les petits font ordinairement leur repas avec des fourmis. On a observé que les petits acquièrent, en un seul jour, la moitié de la taille des adultes.

La répartition géographique de ces oiseaux présente des faits assez curieux. Il paraît qu'ils sont répandus dans toute l'Australie, mais qu'ils n'ont pas été observés dans la Tasmanie. On n'en connaît pas non plus de la Nouvelle Zélande. A l'Orient de l'Australie, ils reparaissent dans la Nouvelle Calédonie (Proc. Zool. Soc. London, 1861, p. 291), dans un des sous-groupes de Tonga, dans le groupe de Samao et dans les Mariannes. Ils s'étendent, au Nord, jusque dans les Philippines. A l'Ouest, deux espèces sont jetées isolément, l'une à la côte Nord-Ouest de Bornéo, l'autre dans le groupe de Nicobar, si éloigné du centre de distribution géographique de ces oiseaux, lequel finit, à proprement parler, à l'Ouest dans les îles de Célèbes et de Lombock. A l'exception de Timor, où l'on n'a pas encore observé ces oiseaux, ils paraissent habiter toutes les localités renfermées dans les lignes de démarcation que nous venons d'indiquer. Le fait de l'existence de ces oiseaux dans le groupe de Nicobar et à la côte Nord-Ouest de Bornéo est d'autant plus frappant qu'ils ne paraissent pas habiter ni à Malacca, ni à Sumatra, Java et Bali, ni dans d'autres parties de l'île de Bornéo que celle ci-dessus indiquée.

Suivant l'assertion de la plupart des voyageurs, ces oiseaux aimeraient de préférence le séjour des îlots voisins de la côte; il s'agit, toutefois, de savoir jusqu'à quel point leur nombre a été réduit par l'intervention de l'homme, dans les terres habitées, comme cela a eu lieu, par exemple, dans l'Archipel des Mariannes.

LES MÉGAPODES PROPREMENT DITS. MEGAPODIUS.

Les Mégapodes proprement dits forment le type du groupe entier et le composeraient à eux seuls, sans le très petit nombre d'espèces, pour ainsi dire anormales, comprises dans les genres Mégacephalon, Tallegallus et Leipoa. Leur taille peut être comparée, en général, à celle de nos poules. Un de leurs traits les plus apparents est la présence d'une petite huppe retroussée, ornant l'occiput. Leurs tarses et doigts sont robustes. Leur système de coloration, assez simple et en général composé de couleur d'ardoise ou de brun olivâtre, n'est relevé par une teinte plus vive que dans certaines parties du Megapodius Wallacei. Ils ont la queue un peu latéralement voûtée et sa longueur n'égale pas même la moitié de celle des ailes.

Les uns amassent, lors de la propagation, ces tas énormes de sable ou de toute sorte de débris, destinés à recevoir les oeufs, tandis que le Megapodius Wallacei les dépose dans des trous obliques, pratiqués dans le sable.

Les Mégapodes proprement dits habitent toutes les contrées assignées au groupe en général, à cette exception près, qu'ils ne se répandent, dans l'Australie, que le long de la côte septentrionale de ce continent.

On peut séparer les Mégapodes proprement dits, suivant la couleur de leurs pieds, en deux subdivisions, les uns offrant des pieds d'une couleur jaune, orangée ou rougeâtre, les autres d'une teinte foncée, c'est-à-dire d'un brun noirâtre. Il est vrai qu'il existe, quelquefois, sous ce rapport, de légères modifications et que le desséchement produit encore, dans certaines circonstances, des altérations, mais le naturaliste expérimenté ne tardera pas d'apprécier ces phénomènes à leur juste valeur.

I. Mégapodes aux pieds clairs.

MEGAPODIUS DUPERREYI, Lesson et Garnot, dans: Férussac, Bulletin des Sciences nat., 1826, tome 8, pp. 113 et 114; Voyage de la Coquille, Zool., pl. 36; Lesson, Man. d'Orn, 1828, tome 2, p. 223: individu, n'ayant pas encore atteint la taille des adultes. — Megapodius Reinwardtii, G. R. Gray, List Gallinae, Brit. Mus., 1867, p. 20; Gray et Mitchell, Genera of Birds, tome 3, p. 508. Il est bon de faire observer que Gray n'a appliqué l'épithète de Reinwardtii qu'aux individus de Doréh, d'Arou et de Key, et qu'il l'a empruntée à Wagler. Cet ornithologiste, cependant, n'y a pas attaché une signification quelconque. Il en fait d'abord mention dans son Systema avium, 1827, Megapodius La Perousii (Nota): »Extat alia adhuc species hujus generis ex insulis Moluccis, in manuscripto meo non satis definita, quam cl. Temminck propediem sub denominatione Megapodii Reinwardtii illustrabit." Wagler reprend ce sujet dans l'Isis d'Oken, 1829, p. 736, en disant: Megapodius Reinwardtii (additamenta) adde: Less. Voy. part. zool. 2. 36 (fig. opt.) id. Man. d'Ornith. 2, p. 223. »Nota. Nomen huic speciei a me calami lapsu impositum fugiendum, hoc contra a Lesson excogitatum (Meg. Duperreyi) retinendum est." — Megapodius rubripes, Temminck, Pl. col. 411: individu rapporté par feu le Professeur Reinwardt. Ce savant voyageur ne nous ayant fait parvenir qu'un seul individu du Mégapode aux pieds rouges, et cet individu étant originaire de l'île de Lombock, comme je viens de le constater par l'étiquette originale, il est évident que la figure du Meg. rubripes de Temminck représente l'oiseau, décrit par Gray sous le nom de Meg. Gouldii, qui, du reste, ne diffère en aucune manière du Meg. Duperreyi. — On peut encore ajouter à cette synonymie le Megapodius tumulus, Gould, Proc., 1842, p. 20, figuré dans ses »Birds of Australia" (pl. 79), provenant de la côte Nord de l'Australie, et ne s'éloignant des individus des localités extra-australiennes que par sa taille, souvent, mais non pas constamment, un peu plus forte.

Il s'agit de savoir s'il ne convient pas d'ajouter encore à cette synonymie le Megapodius assimilis de Masters, originaire des îles Dungeness et Bet (Nouvelle Hollande).

On peut attribuer au Megapodius Duperreyi les caractères généraux suivants: Dessus de la tête, y compris la huppe, moitié postérieure du manteau, et face supérieure des ailes d'un brun olivâtre, plus ou moins lavé d'une teinte ferrugineuse; face inférieure des ailes, grandes rémiges et pennes de la queue d'un brun très foncé. Dos en arrière du manteau, croupion, couvertures supérieures et inférieures de la queue, bas-ventre, plumes des jambes et des flancs d'un brun tirant fortement au châtain. Côtés de la tête, menton, gorge, cou, moitié antérieure du manteau, jabot, poitrine et abdomen d'un gris d'ardoise tirant quelquefois un peu sur le brun olivâtre. Les petits sont, comme ceux des autres espèces, revêtus d'un duvet dense et un peu rigide. La teinte du fond de ce duvet est, sur les parties supérieures, d'un brun passablement foncé, sur les inférieures, d'un brun roussâtre, plus clair sur la gorge et les côtés de la tête; mais cette teinte est interrompue, sur le dos et les ailes, par des bandelettes plus claires. Les plumes ayant poussé, le gris d'ardoise de celles du cou et du dessous de l'oiseau est d'abord fortement lavé de brun roussâtre et cette nuance s'aperçoit quelquefois encore dans les individus à-peu-près adultes.

Iris en général d'un brun foncé, mais dans quelques individus elle est d'un brun rougeâtre clair; bec brun rougeâtre à bords jaunes; tarses et pieds d'un orangé vif, les plaques du devant du tarse, depuis la quatrième, vers le bas et les plaques des doigts d'un brun rougeâtre foncé (Gould, Handbook to the birds of Australia, tome 2, p. 177). Les teintes de chacune de ces parties sont les mêmes dans les individus tués dans les groupes d'Arou et de Key, ainsi qu'à Sorong et dans les environs de Doréh à la Nouvelle Guinée (Bernstein et von Rosenberg).

Il paraît que les femelles présentent ordinairement une taille

un peu moins forte que les mâles, mais cette règle générale souffre des exceptions, vu la variation individuelle de taille chez ces oiseaux. Cette taille est encore plus ou moins variable suivant les localités, phénomène que l'on observe également dans le Megapodius Freycinetii. Du reste, il sera superflu d'ajouter qu'il ne s'agit, dans nos indications, que des individus adultes, qui ont acquis leur croissance complète. Ceux-ci, pris dans leur ensemble, c'est-à-dire dans toutes les localités qu'habite l'espèce, offrent les mesures suivantes: Aile sept pouces neuf lignes à neuf pouces huit lignes; tarse deux pouces et une ligne à deux pouces sept lignes; doigt mitoyen un pouce quatre lignes à un pouce six lignes; ongle de ce doigt huit à dix lignes; doigt postérieur dix à onze lignes; ongle de ce doigt huit à dix lignes; queue trois pouces à quatre pouces six lignes; bec environ d'un pouce.

Cette espèce est répandue dans des localités assez distantes les unes des autres. Dans l'Australie elle n'a été observée que le long de la côte septentrionale, c'est-à-dire, près du port Essington et du Cap York, ainsi que sur les petites îles de Bernard situées dans le détroit de Torres au Nord du Cap York. Reinwardt et Wallace ont rapporté l'espèce de l'île de Lombock, et le dernier voyageur l'a en outre rencontré dans l'île de Flores. Nous venons d'en recevoir plusieurs individus recueillis dans l'île de Saleyer, située à deux degrés au Nord de Flores, entre cette île et Macassar. On ignore si elle, ou quelqu'autre espèce de Mégapode, se trouvent à Timor, mais un de nos voyageurs nous a fait parvenir un individu du Megapodius Duperreyi tué dans l'île de Wetter, située au Nord-Est de Timor. Ce même voyageur en a recueilli un autre tué dans le groupe isolé de Banda. Le Musée Britannique doit aux voyages de M. Wallace ses individus provenant des îles Key et Arou, ainsi que de Doréh, localité où l'espèce avait été découverte par Lesson. Nos autres voyageurs en ont recueilli des séries d'individus dans le groupe d'Arou, à Grand-Key, Petit-Key, dans la baie Lobo ou Triton et à Sorong (Côte

N. O. de la Nouvelle Guinée); puis de l'autre côté de la presqu'île des Papous, à Doréh et Andai. M. von Rosenberg nous en a fait parvenir, en outre, deux individus de l'île de Jobie, différant, toutefois, un peu de ceux des autres localités.

On doit aux communications de M M. Gilbert et Mac Gillivray des détails curieux sur les moeurs de cette espèce. En voici l'extrait succinct. Cet oiseau habite les forêts touffues. C'est là ou sur la lisière des bois qu'il construit ces tertres de dimensions extraordinaires, lesquels ont tant attiré la curiosité des Européens. Ces tertres, de forme conique, ont quelquefois plus de cent pieds de circonférence sur une hauteur de quinze pieds.

Ils consistent en un amas, soit de sable, de cailloux et de coquilles, soit de débris végétaux, et ces dernières matières occupent constamment leur centre. Les femelles y déposent leurs oeufs pendant la nuit, dans l'intervalle de plusieurs jours. La propagation a lieu depuis le mois d'Août jusqu'au mois de Mars. Les oeufs, déposés dans des trous profonds et obliques creusés dans le sable, sont d'un blanc jaunâtre sale; ceux déposés dans la terre végétale offrent un brun rougeâtre foncé. Ces oiseaux vivent solitairement ou par couples. Leur nourriture consiste en des semences, des baies et des insectes. Les petits mangent avidement des fourmis (Gould, Birds of Australia). Suivant Wallace, l'oiseau de Lombock se nourrit de fruits tombés, de lombrics, de limaçons et de centipèdes (the Malai Archipelago, tome 1, p. 244).

Individus de l'Australie. — 1. Mâle adulte, Port Essington, obtenu de M. Gould, sous le nom de Mégapodius tumulus. Aile neuf pouces et demi; tarse deux pouces sept lignes. — 2. Femelle adulte, tuée en Décembre 1848 près du Cap York, obtenue en 1860; aile neuf pouces huit lignes, tarse deux pouces cinq lignes. — 39. Mâle adulte, tué en 1879, îlot près du Cap York, acquis en 1880. Aile huit pouces et une ligne. —

3. Individu de l'île de Lombock, voyage de feu le Professeur Reinwardt, 1818. En tout point semblable aux individus

de l'Australie; mais à taille un peu moins forte. Aile huit pouces neuf lignes; tarse deux pouces trois lignes.

4, 5, 6, 7. Individus adultes, tués dans l'île de Saleyer, voyage de M. Teysman, 1877. Absolument semblables aux individus de Lombock, Wetter, Banda etc., mais les plumes du manteau, ainsi que les grandes couvertures alaires, sont en partie teintes de jaune de paille vers leur extrémité. Aile huit pouces cinq lignes.

8. Mâle, tué le 9 Mai 1866 dans l'île de Wetter, voyage de Hoedt. Aile huit pouces quatre lignes; tarse deux pouces trois lignes.

9. Mâle, tué le 16 Avril 1868, Poulo-Aï (Banda) voyage de Hoedt. Aile huit pouces quatre lignes; tarse deux pouces quatre lignes.

Individus de l'île Petit-Key. — 10. Mâle adulte, tué le 21 Août 1865, voyage de M. von Rosenberg. Aile huit pouces six lignes; tarse deux pouces six lignes. — 11. Mâle à-peu-près adulte, tué le 17 Août 1865, voyage de M. von Rosenberg.

Individus de l'île de Grand-Key. — 12. Femelle adulte, tuée le 11 Août 1865, voyage de M. von Rosenberg. Aile huit pouces; tarse deux pouces trois lignes. — 13. Femelle semi-adulte, tuée le 3 Août 1865, voyage de M. von Rosenberg.

Individus du groupe d'Arou. En tout point semblables à ceux de Banda, Lombock et Wetter. Aile sept pouces neuf lignes à huit pouces trois lignes; tarse deux pouces et une ligne à deux pouces quatre lignes. — 14. Mâle adulte, tué en Mai 1864, voyage de Hoedt. — 15. Femelle, tuée en Avril 1864, Hoedt. — 16. Mâle adulte, tué le 27 Février 1865, île Wammer, voyage de M. von Rosenberg. — 17. Femelle adulte, tuée le 17 Février 1865, île de Wammer, voyage de M. von Rosenberg. — 18. Femelle adulte, tuée le 8 Juillet 1865, île Trangan, voyage de M. von Rosenberg. — 19. Femelle adulte, tuée le 20 Juin 1865, Wonoumbai, v. Rosenberg. — 20. Mâle à-peu-près adulte, tué le 14 Juillet 1865, île Trangan, von Rosenberg.

Individus de la baie Lobo ou Triton à la côte Ouest de la Nouvelle Guinée. — 21. Femelle adulte, tuée en Juillet 1828, voyage de S. Müller. Aile huit pouces cinq lignes; tarse deux pouces cinq lignes. — 22, 23. Petits en duvet, même localité, 1828, S. Müller.

Individus de Sorong (côte N. O. de la Nouvelle Guinée, vis-à-vis de Salawattie). Aile huit pouces six lignes à huit pouces neuf lignes; tarse deux pouces six lignes. — 24. Mâle adulte, tué le 7 Janvier 1865, voyage de Bernstein. — 25. Femelle adulte, tuée le 19 Sept. 1864, Bernstein. — 26. Femelle adulte, tuée le 27 Nov. 1864, Bernstein.

Individus des côtes septentrionale et orientale de la presqu'île des Papous. — 27. Mâle adulte, tué en Avril 1877, Amberbaki. Aile huit pouces huit lignes. — 28. Femelle adulte, tuée au mois de Février 1877, Has. Aile huit pouces six lignes. — 29. Mâle adulte, tué le 3 Juin 1869, Doréh, voyage de M. von Rosenberg. Aile huit pouces quatre lignes. — 30. Jeune individu, Doréh, acquis en 1865. — 31. Mâle adulte, tué le 7 Mars 1870, Andai, voyage de M. von Rosenberg. Aile huit pouces dix lignes. — 32. Jeune femelle, tuée le 2 Avril 1870, Andai, von Rosenberg. — 33, 34, 35. Adultes, Andai, 1875, obtenus du missionnaire Woelders à Andai. Aile huit pouces cinq lignes à huit pouces neuf lignes. — 36. Petit en duvet, Andai, 1875; Woelders.

Individus de l'île de Jobie. M. von Rosenberg a recueilli dans cette île deux individus de l'espèce dont nous traitons. Ils s'éloignent de ceux que nous venons d'énumérer par le brun olivâtre des parties supérieures plus foncé, tandis que le gris d'ardoise des parties inférieures est lavé de brun ferrugineux, ainsi que cela se voit quelquefois dans un petit nombre d'individus d'autres localités, étant alors le reste des premières teintes du jeune âge. Les pieds offrent également une teinte moins claire et moins pure. — 37. Mâle adulte, tué le 2 Avril 1869. Aile huit pouces. — 38. Femelle, tuée le 2 Mai 1869.

MEGAPODIUS GEELVINKIANUS, Meyer, Acad. Berlin, Sitzungsberichte, Févr. 1874.

Cette espèce habite les îles de Soëk, (Schouten) de Mefoor ou Nufoor et de Meosnoum, toutes situées dans la grande baie de Geelvink et j'ai même du ajouter à ces individus un autre, envoyé par M. von Rosenberg du hâvre Doréh, le comprenant également sous l'épithète de Geelvinkianus. Tous ces oiseaux se distinguent, au premier coup d'oeil, du Megapodius Duperreyi par une taille moins forte ainsi que par les teintes beaucoup plus foncées de leur plumage: les parties supérieures étant d'un brun noirâtre, les inférieures d'un brun un peu plus clair, tirant rarement au gris d'ardoise. Aile six pouces dix lignes à sept pouces sept lignes. Tarse deux pouces une ligne à deux pouces quatre lignes.

1. Mâle adulte, tué le 10 Mai 1869, Meosnoum, von Rosenberg. — 2. Femelle adulte, tuée le 4 Février 1869, Meosnoum, von Rosenberg. — 3, 4. Femelles adultes, tuées le 4 Février 1869, Mefoor, von Rosenberg. — 5. Mâle adulte, tué le 15 Mars 1869, Soëk, von Rosenberg. — 6. Mâle adulte, tué le 12 Janvier 1869, Doréh, von Rosenberg.

MEGAPODIUS BERNSTEINI, Schlegel, Observations zoologiques II, dans: Nederlandsch Tijdschrift voor de Dierkunde, tome 3, 1866, p. 261.

Cette espèce, découverte par feu Bernstein dans le groupe de Sula, se distingue, au premier coup d'oeil, de ses congénères à pieds orangés, par son plumage presque uniformément teint de brun-gris olivâtre, passant, cependant, au roux-brun sur les ailes, et tirant fortement au noirâtre sur la queue et au gris sur la gorge. Elle rappelle, en conséquence, par son système de coloration, le Megapodius nicobaricus qui offre, par contre, des pieds noirs, et auquel elle est inférieure par la taille.

Aile six pouces neuf lignes à sept pouces et demi. Tarse deux pouces deux lignes. Doigt du milieu seize lignes.

1. Mâle adulte, tué le 16 Novembre 1864, Soula-bessie,

voyage de Hoedt. — 2. Mâle adulte, tué le 5 Décembre 1864, Soula-Mangola, voyage de Hoedt. — 3. Femelle à-peu-près adulte, Soula-Mangola, voyage de Bernstein, 1863. — 4. Individu à-peu-près adulte, Soula-bessie, voyage de M. Teysman, 1876.

MEGAPODIUS PRITCHARDI, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1864, p. 41, pl. 6.

Espèce très facile à reconnaître à ses couvertures caudales supérieures offrant un blanc parfait, qui se détache vivement de la teinte d'un brun olivâtre foncé occupant la queue, le dos et la face supérieure des ailes. Il existe, en outre, deux autres traits, propres à l'espèce, savoir que les plumes des cuisses, du ventre ainsi que les couvertures inférieures de la queue tirent fortement au blanc, puis que les côtés de la tête, la gorge, et la nuque présentent un gris blanchâtre clair. Dessus de la tête d'un gris d'ardoise lavé de brun. Manteau, cou, jabot, poitrine, flancs et face inférieure des ailes, gris d'ardoise, teinte qui se perd insensiblement dans le blanchâtre du ventre.

Cette espèce fut découverte dans l'île de Nina-fou, située entre les groupes de Tonga, Fidji et Samao. Malgré la probabilité, que l'espèce se trouve répandue dans tous ces groupes si voisins l'un de l'autre, on est allé jusqu'à établir plusieurs espèces et cela seulement sur les oeufs, sans connaître les oiseaux mêmes auxquels ils appartiennent. C'est ainsi que G. R. Gray a conféré le nom de Megapodius Barnabyi à un oeuf, provenant des îles Hapaces, formant le centre du groupe de Tonga (voir Proceed. Zool. Soc. London, 1864, p. 42); mais plus tard il cite ce nom comme synonyme du Megap. Pritchardii (voir Handlist, tome 2, 1870, p. 355). Un oeuf, rapporté du groupe de Samao, a donné lieu à l'établissement du Megapodius Stairi, Finsch et Hartlaub, Beiträge zur Fauna Polynesiens, 1867, p. 155. — On dit, du reste, que l'espèce ne se trouve dans tout le groupe de Tonga que dans les îles Hapaces et Nina-Fou.

1. Adulte, Nina-Fou, expédition Godefroy, obtenu en 1870.

Aile six pouces quatre lignes. Tarse deux pouces et une ligne. Doigt mitoyen quatorze lignes. Doigt postérieur dix lignes. Queue deux pouces.

MEGAPODIUS SENEX. Hartlaub, Proc. Zool. Soc. London, 1867, p. 830.

Espèce reconnaissable, au premier coup d'oeil, à sa tête et son cou gris de perle, tandis que tout le reste du plumage est teint de brun-noir.

Originaire des îles Pelew ou Palaou.

1. Adulte, Palaou, expédit. Godeffroy, 1874. Aile six pouces cinq lignes. Tarse deux pouces. Doigt mitoyen quatorze lignes. Doigt postérieur dix lignes. Queue deux pouces.

Je me borne ici à énumérer, à la suite des espèces précédentes, d'autres Mégapodes aux pieds clairs, introduits dans la science. Ce sont les suivants. 1) Megapodius La Peyrousii, Quoy et Gaimard, Uranie, pl. 33, des îles Mariannes. — 2) Megapodius Brenchleyi, G. R. Gray, Cruise Curacoa, pl. 20; (du groupe de Banks? ou de celui de Salomon?). — 3) Megapodius Mac-Gillivrayi, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1861, p. 289, du groupe de la Louisiade. — 4) Megapodius Layardi, Tristram, des Nouvelles Hébrides: au plumage d'un noir uniforme, aux pieds et au bec jaunes.

Je fais enfin mention du Mégapode, observé dans les groupes de l'Exchequer et de l'Amirauté, situés au Nord de la partie orientale de la Nouvelle Guinée, ainsi que dans l'île du Duc de York, faisant partie du groupe de la Nouvelle Irlande et située à environ six degrés à l'Est de celui de l'Amirauté. Il a été décrit sous trois épithètes différentes. C'est Megapodius eremita, Hartlaub. Proc. Zool. Soc. London, 1867, p. 830, du groupe de l'Exchequer; Megapodius rubrifons, Sclater, Proc. Zool. Soc. London, 1877, p. 556, du groupe de l'Amirauté, individu au front dénué de plumes; enfin Megapodius Haskeri, Cabanis et v. Reichenow, de l'île du Duc de York. Cet oiseau a les pieds, dans le vivant, couleur de corne, mais qui change,

par le desséchement au noirâtre ou même au noir. La teinte du plumage du dos est un peu plus foncée que dans le Megapodius Forstenii. L'aile porte en longueur huit pouces et demi.

II. Mégapodes aux pieds foncés.

MEGAPODIUS FREYCINETII, Quoy et Gaimard, Uranie, pl. 32. Temminck, Pl. col. 220. — Megapodius Quoyi, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1861, p. 289, pl. 32 (pull.).

Cette espèce se distingue de toutes les autres par le système de coloration uniforme de tout son plumage, qui offre une couleur d'ardoise très foncée, c'est-à-dire tirant fortement au noir. Elle est, toutefois, faiblement lavée de brun sur le ventre et plus particulièrement à la face inférieure des ailes. Les petits en duvet se distinguent de ceux du Megapodius Duperreyi par leur dos orné de bandelettes d'un jaune d'ocre foncé et sale.

La taille de cet oiseau est variable suivant les individus et encore quelquefois suivant les localités.

Aile sept pouces six lignes à huit pouces dix lignes. Tarse deux pouces trois lignes à deux pouces huit lignes. Doigt du milieu dix-sept à dix-neuf lignes; ongle de ce doigt neuf à onze lignes. Doigt postérieur dix à douze lignes; ongle de ce doigt dix à onze lignes. Queue deux pouces huit lignes à trois pouces.

La répartition géographique de cette espèce présente une ligne de démarcation assez inégale Elle habite tout le groupe de Halmahéra et ses dépendances, y compris le sous-groupe d'Obi. Elle a été observée dans les îles de Guebéh, Gagie, Waighéou, Salawatty et Mysol; enfin à Sorong, c'est-à-dire à la partie de la Nouvelle Guinée, située vis-à-vis de Salawatty, mais on ne l'a pas rencontrée dans les autres parties de la Nouvelle Guinée, où se trouve le Megapodius Duperreyi, ni à Céram, Amboine et Bourou, où elle est remplacée par le Megapodius Forstenii.

Individus de l'île de Morotaï, située au Nord de Halmahéra. Aile huit pouces à huit pouces quatre lignes; tarse deux pou-

ces trois lignes. — 1. Femelle adulte, tuée le 18 Sept. 1861, voyage de Bernstein. — 2. Femelle adulte, tuée le 19 Sept. 1861, Bernstein. — 3. Petit en duvet, pris le 23 Sept. 1861, Bernstein.

Individus de la petite île de Raou, voisine de Morotaï et de Halmahéra. Aile huit pouces deux lignes à huit pouces quatre lignes; tarse deux pouces sept lignes. — 4. Femelle adulte, tuée le 20 Août 1861, voyage de Bernstein. — 5. Mâle adulte, tué le 4 Oct. 1861, Bernstein.

Individus de l'île de Halmahéra. Aile huit pouces et une ligne à huit pouces huit lignes; tarse deux pouces cinq lignes à deux pouces huit lignes. — 6. Mâle adulte, tué le 13 Août 1861, Galéla, à la côte Nord de Halmahéra, voyage de Bernstein. — 7. Femelle adulte, tuée le 23 Juillet 1861, Galéla, Bernstein. — 8. Femelle adulte, tuée le 29 Novembre 1861, Kaou, côte Nord-Est de Halmahéra, Bernstein. — 9. Mâle adulte, tué le 21 Nov. 1861, Kaou, Bernstein. — 10. Femelle adulte, tuée le 16 Février 1875, Sidangoli, côte Ouest au Sud de Gilolo, présentée en 1878 par M. v. Musschenbroek. — 11. Femelle adulte, tuée le 9 Juillet 1863, Talangami à la côte Sud de Halmahéra, Bernstein; notez que ce serait, suivant Gray, le Megap. Quoyi de Gray, quoiqu'il ne diffère pas le moins du monde des individus tués dans d'autres localités de l'île de Halmahéra. — 12. Petit en duvet, femelle, Galéla, Bernstein, 1861. — 13. Petit en duvet, Gilolo, voyage de Forsten. — 14. Petit en duvet, Dodingo, Bernstein, 1862. — 15. Petit en duvet, Dodingo, voyage de M. von Rosenberg, 1863.

Individus de l'île de Batjan. Aile sept pouces dix lignes à huit pouces dix lignes: tarse deux pouces six lignes à deux pouces sept lignes. — 16. Femelle adulte, tuée au mois de Janvier 1861, voyage de Bernstein. — 17. Femelle adulte, tuée en Mars 1861, Bernstein. — 18. Mâle adulte, tué le 11 Janvier 1861, Bernstein. — 19. Mâle adulte, tué en Décembre 1860, Bernstein. — 20. Individu, n'ayant atteint que deux tiers de la taille des adultes, présenté en 1867 par M. Jung-

michel. — 21. Individu, n'ayant atteint que la moitié de la taille des adultes, présenté en 1867 par M. Jungmichel. — 22. Jeune mâle, taille du N°. 21, Bernstein. — 23. Mâle de la taille des N^os^. 21 et 22, tué le 22 Juin 1862, Bernstein.

Individus tués dans l'île de Ternate. Aile huit pouces six lignes à huit pouces dix lignes; tarse deux pouces six lignes à deux pouces sept lignes. — 24, 25. Mâle et femelle adultes, 1840, voyage de Forsten. — 26. Mâle adulte, tué le 17 Mai 1861, voyage de Bernstein. — 27. Mâle adulte, tué le 12 Mai 1861, Bernstein. — 28. Mâle adulte, présenté en 1878 par M. van Musschenbroek. — 70, 71. Petits en duvet, Rosenberg, 1872. — 72. Petit en duvet, femelle, pris en Janvier 1875, présenté par M. v. Musschenbroek.

Individus de l'île de Maréh. Aile huit pouces à huit pouces quatre lignes; tarse deux pouces sept lignes. — 29, 30. Mâles adultes, tués le 17 Mars 1863, voyage de Bernstein. —

31. Femelle, tuée dans l'île de Tidore, voyage de M. von Rosenberg, 1864: aile sept pouces huit lignes; tarse deux pouces quatre lignes.

Individus du groupe d'Obi. Aile huit pouces à huit pouces trois lignes; tarse deux pouces six lignes à deux pouces sept lignes. — 32. Femelle adulte, tuée le 27 Juillet 1862, Obi-major, voyage de Bernstein. — 33. Femelle adulte, tuée le 17 Août 1862, Obi-major. Bernstein. — 34. Femelle adulte, tuée le 7 Août 1862, Obi-major, Bernstein. — 35. Mâle adulte, tué le 11 Août 1862, Obi-major, Bernstein. — 36. Mâle à-peu-près adulte, tué le 21 Août 1862, Obi-major, Bernstein. — 37. Petit en duvet, femelle, pris le 24 Juillet 1862, Obi-major, Bernstein. — 38. Petit en duvet, mâle, pris le 19 Août 1862, Obi-lattou, Bernstein.

Individus de l'île de Guebéh. Aile huit pouces deux lignes; tarse deux pouces six lignes à deux pouces trois lignes. — 39. Femelle adulte, tuée le 29 Juillet 1863, voyage de Hoedt. — 40. Mâle adulte, tué le 3 Février 1863, voyage de Bernstein. — 41. Mâle adulte, tué le 7 Février 1863, Bernstein. —

42. Mâle adulte, tué le 18 Février 1863, Bernstein. — 43. Mâle à-peu-près adulte, tué le 21 Février 1863, Bernstein.

Individu de l'île de Gagie. — 44. Mâle adulte, tué le 5 Mars 1863, Bernstein: Aile huit pouces quatre lignes; tarse deux pouces six lignes.

Individus de l'île de Waighéou. Aile huit pouces et une ligne à huit pouces trois lignes; tarse trois pouces six lignes. — 45. Femelle adulte, tuée le 17 Mars 1863, voyage de Bernstein. — 46. Mâle adulte, tué le 18 Mars 1863, Bernstein. — 47. Mâle adulte, tué le 29 Mars 1863, Bernstein.

Individus de l'île de Salawatty. — 48. Femelle à-peu-près adulte, tuée le 1 Mars 1865, Sailolo, voyage de Bernstein. — 49. Mâle à-peu-près adulte, tué en Janvier 1877.

Individus de Sorong, Nouvelle Guinée en face de Salawatty. Aile huit pouces à huit pouces quatre lignes; tarse deux pouces trois lignes à deux pouces quatre lignes. — 50. Mâle adulte, tué le 28 Novembre 1864, voyage de Bernstein. — 51, 52. Femelles adultes, tuées le 11 Septembre 1864, Bernstein. — 53. Mâle adulte, tué le 11 Sept. 1864, Bernstein. — 54. Femelle adulte, tuée le 12 Décembre 1864, Bernstein.

Individus de l'île de Mysool. Aile sept pouces six lignes à huit pouces et une ligne; tarse deux pouces quatre lignes à deux pouces six lignes. — 55. Femelle adulte, tuée le 6 Mai 1867, Waaigama, voyage de Hoedt. — 56. Mâle adulte, tué le 15 Mai 1867, Waaigama, Hoedt. — 57. Femelle adulte, tuée le 6 Juin 1867, Waaigama, Hoedt. — 58. Femelle adulte, tuée le 30 Juillet 1867, Waaigama, Hoedt. — 59. Femelle adulte, tuée le 31 Juillet 1867, Waaigama, Hoedt. — 60, 61, 62. Adultes, voyage de Teysman, 1876. — 63. Mâle adulte, tué le 6 Juin 1867, Kasim, voyage de Hoedt. — 64. Mâle adulte, tué le 3 Mai 1867, Adoa, Hoedt. — 65. Petit en duvet, mâle, pris le 13 Mai 1867, Waaigama, Hoedt. — 66. Petit en duvet, mâle, pris le 9 Juillet 1867, Waaigama, Hoedt. — 67. Petit en duvet, femelle, pris le 16 Mai 1867, Waaigama, Hoedt. — 68. Petit en duvet, 1876, voyage de

Teysman. — 69. Petit en duvet, femelle, pris le 5 Juin 1867, Kasim, voyage de Hoedt.

On a pu voir, par les détails ci-dessus, que cette espèce présente un phénomène inverse à celui que l'on observe dans le Megapodius Duperreyi, savoir que ce sont, dans ce dernier oiseau, les individus du continent de l'Australie, qui dépassent ordinairement par leur taille, ceux de toutes les autres îles habitées par l'espèce, tandis que le Megapodius Freycinetii acquiert son plus grand développement dans la petite île de Ternate.

MEGAPODIUS FORSTENII, Temminck, in Museo Neerlandico; Gray and Mitchell, Genera of Birds, pl. 124.

Semblable par son aspect général au Mégapodius Freycinetii, mais s'en éloignant par le noir d'ardoise borné sur le cou, le jabot et le manteau, par cette teinte lavée de brun sur le dessous en arrière du jabot, par le gorge et les côtés de la tête d'un gris d'ardoise, par le dessus de la tête, la nuque et la face supérieure des ailes d'un brun olivâtre, enfin par le dos et la queue en dessus d'un brun roussâtre très foncé.

Quant à la taille de l'espèce, elle est en général un peu inférieure à celle du Mégapodius Freycinetii, et elle varie en outre suivant certaines localités, les individus de l'île de Bourou surpassant sous ce rapport tous les autres.

Aile sept pouces six lignes à huit pouces trois lignes. Tarse deux pouces deux lignes à deux pouces six lignes. Doigt mitoyen seize à dix-neuf lignes. Doigt postérieur neuf à dix lignes. Queue deux pouces et demi à trois pouces.

Cette espèce remplace le Megapodius Freycinetii dans les îles de Bourou, d'Amboine et de Céram.

Individus de l'île de Bourou. Aile huit pouces à huit pouces trois lignes; tarse deux pouces quatre lignes à deux pouces cinq lignes. — 1. Mâle adulte, tué le 18 Août 1864, voyage de Hoedt. — 2. Femelle adulte, tuée le 12 Novembre 1864, Hoedt. — 3. Mâle adulte, tué le 28 Nov. 1864, Hoedt. — 4. Femelle adulte, tuée le 18 Août 1864, Hoedt.

Individus de l'île d'Amboine. Aile sept pouces six lignes à sept pouces neuf lignes; tarse deux pouces deux lignes à deux pouces quatre lignes. — 5. Femelle adulte, tuée le 3 Février 1863, voyage de Hoedt. — 6. Femelle adulte, tuée le 29 Mars 1863, Hoedt. — 7. Femelle adulte, tuée le 8 Octobre 1863, Hoedt. — 8. Femelle adulte, tuée le 15 Juin 1864, Hoedt. — 9. Mâle adulte, 1863, Hoedt. — 10, 11, 12, 13 et 14. Adultes, voyage de Teysman, 1876. — 15. Femelle, n'offrant que les trois quarts de la taille des adultes, tuée le 2 Décembre 1865, Hoedt. — 16. Femelle, n'offrant que la moitié de la taille des adultes, tuée le 14 Août 1866, Hoedt. — 17. Petit en duvet, femelle, pris le 10 Décembre 1865, Hoedt.

18. Mâle adulte, tué le 9 Décembre 1863, Harouko, dans l'île d'Oma, située près de la côte Est d'Amboine. Aile sept pouces huit lignes; tarse deux pouces six lignes.

Individus de l'île de Céram. Aile sept pouces six lignes; tarse deux pouces quatre lignes à deux pouces six lignes. — 19. Femelle adulte, voyage de Forsten, 1840. — 20. Mâle adulte, tué le 9 Avril 1863, voyage de Hoedt. — 21. Femelle adulte, tuée le 19 Octobre 1873, présentée par M. v. Musschenbroek. — 22. Petit en duvet, femelle, pris le 20 Septembre 1873, présenté par M. v. Musschenbroek.

MEGAPODIUS LOWEI, Sharpe, Proc. Zool. Soc. London, 1875, p. 111. — Megapodius Cumingii, Dillwyne, Proc. Zool. Soc. London, 1851, p. 119, pl. 39. Motl. et Dyllwyn, Nat. hist. of Labuan, p. 32, pl. 7. Salvadori, Annali Mus. Civ. Genova, tome 5, 1874, p. 302.

Ce Mégapode, excessivement voisin du Megapodius Forsteni, se trouve dans une localité très éloignée de celle qu'habite celui-ci; c'est-à-dire, dans l'île de Labouan, (y compris les îlots voisins) qui est située à la côte occidentale de la grande île de Bornéo, à la distance d'environ un degré et demi de sa pointe septentrionale [1]).

1) Le Mégapode des Philippines, quoique semblable à celui de Labuan, s'en dis-

A vrai dire, le Megapodius Lowei ne se distingue du Meg. Forsteni que par son manteau teint de brun olivâtre, et non pas de noir d'ardoise et parce que la teinte brune des ailes tire un peu moins sur l'olivâtre.

Aile sept pouces neuf lignes à huit pouces et une ligne. Tarse deux pouces trois lignes à deux pouces quatre lignes.

On dit que le Mégapode de Lowe est plus particulièrement confiné aux petites îles de la côte, et qu'il habite de préférence celles qui offrent des plages sablonneuses. Quoique ces oiseaux ne soient pas rares à Labouan, on ne les voit qu'accidentellement, vu qu'ils sont très farouches et qu'ils fréquentent les clairières touffues des forêts. Leur nourriture consiste principalement en semences et insectes. Ces oiseaux se livrent souvent des combats furieux. Les oeufs sont d'une belle couleur de crême foncée. La ponte de chaque femelle est de huit à dix oeufs. Elles les déposent dans un trou, profond d'environ un pied et demi, qu'elles creusent dans le sable près de la lisière de la forêt. La ponte terminée, la femelle recouvre l'endroit où se trouvent les oeufs, d'un grand tas de coquillages et de toute sorte de débris. Les indigènes prétendent que le développement de l'oiseau dans l'oeuf demande un espace de trois à quatre mois; mais une fois sortis de l'oeuf, les petits acquièrent dans un seul jour la moitié de la taille des adultes. Ils suffissent à eux seuls pour la recherche de leur nourriture (Dillwyn, Proc. Zool. Soc. London, 1851, p. 118).

1, 2, 3, 4. Adultes, Labouan, acquis en 1874.

---

tingue, suivant M. Sharpe, par une taille plus forte, ses ailes portant en longueur neuf pouces et demi. M. Sharpe a, par conséquent, réservé le nom de MEGAPODIUS CUMINGII à l'oiseau des Philippines, que je n'ai pas vu en nature, mais dont le Musée Britannique possède, suivant Gray, quatre individus, dont trois ont été recueillis par Cuming, le quatrième par E. Verreaux.

L'île de Zébu (Philippines) produirait, suivant le Marquis de Tweeddale, une espèce semblable. mais de très petite taille, attendu que ses ailes ne portent que six pouces en longueur; c'est son Megapodius pusillus, Proc. Zool. Soc. London, 1877, p 765, pl. 78. — Avant d'adopter cet oiseau comme espèce, il s'agit de savoir s'il est établi sur des individus adultes.

MEGAPODIUS GILBERTII, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1861, p. 289. — Megapodius of small size, Wallace, Ibis, 1860, p. 142.

Cette espèce offre absolument le même système de coloration que le Megapodius Lowei, mais toutes les teintes sont un peu moins foncées, le brun olivâtre tire un peu au ferrugineux, et la couleur d'ardoise au gris. Il s'en distingue, par contre, ainsi que de toutes les autres espèces aux pieds foncés, par sa petite taille. Les petits en duvet ressemblent à ceux du Meg. Forstenii, mais la teinte qui sépare les bandelettes claires des ailes est plus foncée.

Aile sept pouces à sept pouces trois lignes. Tarse deux pouces deux lignes à deux pouces trois lignes. Doigt du milieu quinze lignes. Ongles de ce doigt huit lignes. Doigt postérieur huit à neuf lignes. Ongle de ce doigt huit lignes. Queue deux pouces trois lignes.

Bec d'un brun sale. Iris et pieds d'un brun foncé. Peau autour du bec et au dessus de l'oeil, rouge carmin. (Observations faites sur le vivant par M. von Rosenberg).

1. Adulte, Menado à Célèbes, acquis en 1864. — 2. Adulte, Menado, présenté en 1878 par M. van Musschenbroek. — 3. Mâle adulte, tué le 23 Juillet 1864, Pagouat, Célèbes, voyage de M. von Rosenberg. — 4. Femelle adulte, tuée le 29 Avril 1864, Toula-bello à Célèbes, v. Rosenberg. — 5. Mâle adulte, tué le 17 Nov. 1863, Boné à Célèbes, von Rosenberg. — 6. Petit en duvet, mâle, pris le 22 Sept. 1863, Negri-lama à Célèbes, von Rosenberg. — 7. Petit en duvet, mâle, pris le 23 Avril 1864, Toula-bello à Célèbes, von Rosenberg. — 8. Très jeune individu, présenté par M. van Musschenbroek, 1878, Minahassa.

MEGAPODIUS SANGHIRENSIS, Schlegel, Notes from the Leyden Museum, vol. 2, Note XVI, p. 91.

Nos voyageurs ont observé dans les îles de Siao et Sanghir, faisant partie du groupe de Sanghir, situé entre Célèbes et

Mindanao, un Mégapode différent de ceux des deux dernières îles, et que j'ai introduit dans la science sous l'épithète de sanghirensis.

Cet oiseau, inférieur par sa taille au Megapodius Cumingii, mais plus grand que les Megapodius Lowei et Gilbertii, surpasse même, sous ce rapport, un peu le Megapodius Forstenii, et se distingue de tous les trois par le gris d'ardoise du cou et du dessous du corps lavé de brun foncé, et par le dessus de l'oiseau en arrière du manteau, ainsi que le dessus de la tête, tirant au roussâtre et non pas à l'olivâtre.

Aile huit pouces à huit pouces cinq lignes. Tarse deux pouces quatre lignes à deux pouces six lignes. Doigt mitoyen dix-sept à dix-huit lignes. Ongle de ce doigt neuf lignes. Doigt postérieur douze lignes. Ongle de ce doigt neuf lignes. Queue deux pouces six lignes à deux pouces neuf lignes.

1. Individu adulte, Siao-outong, présenté en 1866, par M. Duyvenbode. — 2. Femelle adulte, Siao-outong, présentée en 1866, par M. Duyvenbode. — 3. Mâle adulte, Siao, présenté en 1866, par M. Duyvenbode. — 4. Mâle adulte, tué le 23 Janvier 1866, Sanghir, voyage de Hoedt. — 5. Femelle à-peu-près adulte, tuée le 29 Novembre 1865, Sanghir, Hoedt. — 6. Individu à-peu-près adulte, Siao, présenté en 1866, par M. Duyvenbode.

MEGAPODIUS NICOBARIENSIS, Blyth, Journ. Asiat. Soc. Bengal., tome 15, (1846) pp. 52 et 372; Reise Novara, Vögel, p. 110 et pl. 4, pl. 6, fig. 12 (oeuf).

Très reconnaissable, parmi toutes les espèces du genre, à la teinte de son plumage d'un brun roussâtre, passablement clair et tirant légèrement à l'olivâtre, plus clair encore sur la partie externe de la face supérieure des ailes, lavé de gris sur la poitrine, le ventre et le dessous du cou, passant au gris blanchâtre sur la gorge, le devant du cou et la nuque.

Iris d'un brun foncé. Bec d'un brun jaunâtre. Peau nue de la tête d'un rouge clair. Pieds d'un jaune brunâtre, lavé

de rouge à la jointure du talon. Ongles bruns (von Pelzeln, Novara). Notez que tous nos individus offrent des pieds foncés.

Aile sept pouces dix lignes à huit pouces trois lignes. Tarse deux pouces cinq lignes à deux pouces sept lignes. Doigt du milieu dix-sept à dix-huit lignes. Ongle de ce doigt dix lignes. Doigt postérieur douze lignes. Ongle de ce doigt neuf à dix lignes. Queue deux pouces six lignes à deux pouces neuf lignes.

Cette espèce n'a été observée que dans le groupe de Nicobar.

1. Femelle adulte, tuée le 17 Février 1874, île Juidat. — 2. Femelle adulte, tuée le 9 Février 1874, île Ketchell. — 3. Adulte, tué le 11 Février 1874, île Camati. — 4. Femelle adulte, tuée le 4 Avril 1874, île Ouanpami.

MEGAPODIUS WALLACEI, G. R. Gray, Proc. Zool. Soc. London, 1860, p. 362, pl. 171.

C'est la plus belle espèce du genre, reconnaissable, parmi toutes les autres, aux larges bandes d'un marron rouge traversant une partie du manteau et des ailes, ainsi qu'à son bas-ventre blanc.

Sa taille n'excède guère celle du Megapodius Gilbertii, et elle a les tarses un peu plus courts que toutes les autres espèces. Les parties inférieures du plumage, à partir de la gorge, sont teintes de bleu d'ardoise, remplacé sur le milieu du bas-ventre par du blanc pur. Gorge et côtés de la tête d'un gris clair tirant au brunâtre. Front olivâtre, teinte qui passe, sur le dessus de la tête et du cou, au brun marron. Teinte du fond du manteau et de la face supérieure des ailes, à l'exception des grandes rémiges, d'un vert olivâtre; mais cette teinte est relevée par de très larges bandes transversales d'un rouge marron, et occupant la moitié postérieure du manteau, les scapulaires, les grandes et moyennes couvertures alaires, tandis que la barbe externe des rémiges tertiaires offre une bande semblable, mais longitudinale. Les bandelettes étroites qui séparent ces bandes l'une de l'autre sont d'un gris-bleu clair. Dos et

croupion d'un gris-bleu foncé. Queue et grandes rémiges d'un brun marron, mais on voit, à la barbe externe des quatre premières rémiges un liséré blanc, plus ou moins interrompu. Les petits en duvet ressemblent à ceux du Megap. Forstenii, mais l'intervalle des bandelettes claires est teint de noir terne.

Aile sept pouces et une ligne à sept pouces cinq lignes. Tarse un pouce dix lignes à deux pouces. Doigt mitoyen quinze à seize lignes. Ongle de ce doigt dix à onze lignes. Doigt postérieur dix à onze lignes. Ongle de ce doigt dix à onze lignes. Queue deux pouces sept lignes.

Le Megapodius Wallacei a été observé dans les îles de Halmahéra et de Ternate, où il vit à côté du Megapodius Freycinetii, puis dans celles de Bourou, Amboine et Céram, où il existe conjointement avec le Mégapodius Forstenii, mais on ne le rencontre dans toutes ces localités qu'en très petit nombre. Il mérite, en conséquence, le titre de rare.

Le Mégapode de Wallace habite les forêts de l'intérieur; mais il se rend, lors de l'époque de la propagation, sur les plages sablonneuses de la mer. C'est dans ces lieux que la femelle creuse dans le sable un trou de trois pieds de profondeur; mais ce trou est pratiqué dans une direction oblique, et c'est au fond duquel que la femelle dépose ses oeufs pendant la nuit, recouvrant en suite légèrement l'entrée du trou. Les oeufs offrent une teinte d'un roux-rouge (Wallace, the Malay Archipelago, tome 2, p. 147 et suivantes).

1. Mâle adulte, tué le 7 Novembre 1861, Dodingo à Halmahéra, voyage de Bernstein. — 2. Petit en duvet, mâle, pris le 14 Août 1861, Galéla, côte Nord de Halmahéra, Bernstein. — 3. Petit en duvet, mâle, pris le 14 Août 1861, Galéla (Halmahéra), Bernstein. — 4 et 5. Petits en duvet, Halmahéra, voyage de von Rosenberg, 1870. — 6 et 7. Adultes, Ternate, von Rosenberg, 1872. — 8. Femelle adulte, tuée le 28 Mai 1862, Ternate, Bernstein. — 9. Femelle adulte, tuée le 2 Janvier 1875, Ternate, présenté par M. v. Musschenbroek. — 10. Mâle adulte, tué le 10 Avril 1863, Céram,

voyage de Hoedt. — 11. Petit en duvet, pris en Avril 1828, Amboine, voyage de S. Müller.

LE MALEO. MEGACEPHALON.

On ne connaît qu'une seule espèce de ce genre. Elle s'éloigne de tous les autres oiseaux de la tribu par des traits faciles à saisir et plus particulièrement par sa tête parfaitement nue et à occiput saillant, en forme d'une protubérance volumineuse, enfin par son système de coloration. Sa queue est un peu en toit.

MEGACEPHALON MALEO, Temminck, in Mus. Neerl., Leiden; Gray and Mitchell, Genera of Birds, tome 3, pl. 123.

Taille d'un coq robuste. Tête revêtue d'une peau nue, et s'élargissant, sur l'occiput, en une protubérance globulaire de la grandeur d'une noix. Peau de la gorge et des deux premiers tiers du cou seulement revêtue de petites plumes très clair-semées. Queue un peu en toit et égalant en longueur à-peu-près celle de la moitié des ailes. Ongles beaucoup plus courts que dans les Mégapodes, et les premières phalanges des trois doigts antérieurs réunies par des membranes. Bec plus robuste et plus haut que dans les Mégapodes. Tiers postérieur du cou, jabot, plumes des jambes, ailes, queue avec ses couvertures, et tout le dessus de l'oiseau d'un noir brunâtre à reflets métalliques. Poitrine et ventre couleur de rose assez claire, teinte évanouissant plus ou moins après la mort.

Dans le vivant, le bec est d'un blanchâtre, passant, vers le haut, au rouge clair et par derrière à l'orangé. Base des mandibules, dessus de la tête et sa protubérance d'un noir bleuâtre. Le large tour de l'oeil d'un jaune de soufre passant vers le haut à l'orangé. Peau nue du cou d'un blanc jaunâtre. Iris d'un rouge orangé. Pieds noirâtres. Ongles jaunâtres. (von Rosenberg.)

Les petits en duvet ne présentent nulle trace de la protu-

bérance occipitale, et toute la tête ainsi que le cou sont emplumés. Dessus de la tête en arrière du front, dessus du cou, manteau, dos et jabot d'un brun olivâtre. Aile et queue noirâtres. Toutes les autres parties jaune de paille.

Aile dix pouces neuf lignes. Tarse trois pouces deux lignes. Doigt du milieu vingt-deux lignes; ongle de ce doigt huit lignes. Doigt postérieur neuf à dix lignes; ongle de ce doigt huit lignes. Queue six pouces.

Cet oiseau vient de la partie septentrionale de l'île de Célèbes. Il y habite les grandes forêts. C'est de là qu'il se rend en couples nombreux, durant les mois d'Août et de Septembre, sur certaines plages sablonneuses des bords de la mer. La femelle y creuse un trou de la profondeur de trois à quatre pieds, dans lequel elle dépose un seul oeuf, qu'elle couvre d'une couche de sable, haute d'un pied; puis elle retourne dans la forêt. Elle ne retourne pour y déposer un autre oeuf, qu'au bout de dix à douze jours, et l'on croit que chaque femelle pond, pendant la saison, six à huit oeufs. Le mâle, en société de sa femelle, assiste sa compagne à creuser le trou destiné à recevoir les oeufs. Le même trou sert à plusieurs femelles, attendu que l'on y trouve souvent une douzaine d'oeufs. L'oeuf étant d'une grandeur démésurée pour la taille de l'oiseau, il faut l'espace de plus d'une semaine pour leur développement complet, aussi trouve-t-on, en disséquant une femelle au moment de pondre, qu'à part de l'oeuf développé, le reste des oeufs, au nombre de huit ou neuf seulement, n'excèdent pas en grosseur un haricot. Les petits se rendent, immédiatement après être sortis de l'oeuf, dans la forêt voisine, et ils savent voler dès ce moment. L'on assure que les mères n'ont aucuns soins pour leur progéniture. Les habitants recherchent les oeufs avec avidité, puisqu'ils offrent un mets agréable et qu'un seul suffit au repas d'un homme. Le Maléo se nourrit de fruits. (Wallace, the Malai Archipelago, tome 1, p. 415 sqq.)

1, 2. Mâle et femelle adultes, Boujat, voyage de Forsten, 1840. — 3. Femelle adulte, tuée le 26 Juin 1863, Saoussou,

voyage de M. von Rosenberg. — 4, 5. Mâle et femelle adultes, tués le 5 Août 1863, Pagouat, von Rosenberg. — 6. Adulte, Menado, tué en Février 1861. — 7, 8. Adultes, Menado, présentés en 1878 par M. v. Musschenbroek. — 9. Petit en duvet, mâle, pris le 20 Août 1864, Kéma, voyage de M. von Rosenberg. — 10. Petit en duvet, Menado, 1840, voyage de Forsten.

TALLEGALLUS.

Queue en toit comme dans les poules, d'un quart ou d'un tiers plus courte que les ailes. Tête et les trois premiers quarts du cou à peau revêtue de petites plumes en forme de crins et plus ou moins clair-semées. Plumage noirâtre ou noir brunâtre. Point de membrane entre les doigts mitoyen et interne. Grandeur d'une forte poule ordinaire ou de la Dinde. Patrie: la partie orientale de l'Australie, la Nouvelle Guinée, ainsi que les îles de Jobie, Salawatty, Mysol et le groupe d'Arou.

On ne connaît qu'un petit nombre d'espèces de ce genre.

TALLEGALLUS LATHAMII, (Lesson), Gould, Birds of Australia; tome 5, pl. 77.

Taille égalant presque celle de la Dinde. Queue fortement en toit et égalant en longueur trois quarts de celle des ailes.

Tête et les trois premiers quarts du cou revêtus d'une peau se divisant vers le bas du cou en plusieurs caroncules et hérissée de toute part de petites plumes en crins, très clair-semées. Teinte générale du plumage d'un brun noirâtre, mais remplacée, sur les bords des plumes de la poitrine et du ventre, par du blanc.

Peau de la tête et du cou d'un rouge d'oeillet foncé, passant au jaune vif sur les caroncules. Bec noir. Iris et pieds bruns. (Gould).

Aile onze pouces et demi à douze pouces et demi. Queue neuf à dix pouces. Tarse trois pouces quatre lignes. Doigt du

milieu vingt-trois lignes; ongle de ce doigt douze lignes. Doigt postérieur onze lignes; ongle de ce doigt dix lignes.

Le Tallégalle de Latham a été observé dans la Nouvelle Galle du Sud, depuis le Cap Howe (direction Sud) jusqu'à la baie Moreton (direction Nord), dans l'intérieur jusque sur les bords du Namei. Ces oiseaux fréquentent les broussailles épaisses. Ils courent avec une vitesse extrême. Poursuivis, ils recherchent les branches basses d'un arbre et y montent jusqu'à sa cime, sautillant de branche en branche. C'est encore là qu'ils passent les heures des fortes chaleurs, afin de se reposer et qu'ils deviennent une proie facile pour le chasseur. Leur chair est tendre et offre un mets délicat. A l'époque de la propagation, plusieurs couples se réunissent, afin d'accumuler, durant deux à trois semaines, un grand amas de feuilles mortes en forme de pyramide. Les femelles y pondent au centre leurs oeufs, les plaçant à une distance de neuf pouces ou d'un pied les uns des autres. Leur nombre va jusqu'à une centaine. Après avoir quitté le lieu de leur naissance, les petits, réunis à leurs mères, sont conduits par celles-ci. Ces oiseaux aiment pour leur propagation les vallées ombrageuses. Les oeufs sont d'un blanc parfait. Leur estomac est très charnu; il contient des baies, des semences et quelques restes d'insectes. Amenés dans les poulailliers, ces oiseaux s'y comportent comme nos poules, mais ils ne laissent pas à ramasser des amas de débris végétaux.

1, 2. Mâle et femelle adultes, Nouvelle Galle du Sud, voyage de Gould. — 3. Mâle à-peu-près adulte, échangé en 1865 du Musée de Sidney.

TALLEGALLUS CUVIERI, Voyage de la Coquille, Oiseaux, pl. 38.

Cette espèce a été démembrée en plusieurs autres par M. Salvadori, Museo Civico di Genova, tome 9, p. 327 et suivantes. J'en ai fait l'analyse dans ma Note sur le Tallegallus pyrrhopygius, ce qui me dispense de revenir ici sur ce sujet.

Taille d'une forte poule ordinaire. Queue en toit, occupant presque deux tiers de la longueur des ailes. Tour de l'oeil largement nu. Peau des côtés et du dessous des deux premiers tiers du cou, garnie de plumes linéaires, rigides et très clair-semées. Des plumes semblables, mais plus serrées, occupent le dessus de la tête et le derrière du cou. Tout le plumage de l'oiseau est d'un noir uniforme, à faible reflet bronzé.

Bec jaune, dans les individus imparfaits brunâtre. Pieds d'un jaune clair. Iris noir.

Les petits sont revêtus de toute part d'un duvet dense et un peu rigide, en dessus brun-noir. Les autres parties d'un jaune roussâtre ou brunâtre, ondulé de brun-noir à partir de la gorge.

Aile neuf pouces dix lignes à dix pouces quatre lignes. Queue cinq pouces dix lignes. Tarse trois pouces deux lignes. Doigt du milieu vingt-trois lignes; ongle de ce doigt huit lignes. Doigt postérieur dix lignes; ongle de ce doigt sept lignes. Longueur de la partie cornée de la mandibule supérieure treize à quatorze lignes; hauteur des deux mandibules dix lignes.

Le Tallegallus Cuvieri à été observé des deux côtés de la presqu'île des Papous; à Has, Doréh, Andaï et Sorong, puis dans les îles Papous de Salawatty et Mysol, enfin dans le groupe d'Arou.

1. Femelle adulte, tuée en Février 1877, environs de Has. — 2. Femelle adulte, tuée le 22 Février 1870, Andaï, voyage de M. von Rosenberg. — 3. Femelle adulte, tuée le 3 Mars 1870, Andaï, von Rosenberg. — 4. Femelle adulte, tuée le 27 Février 1870, Andaï, von Rosenberg. — 5. Mâle adulte, tué le 23 Novembre 1864, Sorong, voyage de Bernstein. — 6. Mâle adulte, tué le 19 Décembre 1864, Sorong, Bernstein. — 7. Femelle adulte, tuée le 22 Janvier 1865, Sorong, Bernstein. — 8. Petit en duvet, mâle, pris le 13 Décembre 1864, Sorong, Bernstein. — 9. Femelle adulte, tuée le 5 Mars 1865, Salawatty, Bernstein. — 10. Femelle adulte, tuée le 6 Juin 1867, Kasim à Mysool, voyage de Hoedt. — 11. Mâle adulte, tué le 6 Juin 1867, Kasim à Mysool, Hoedt. — 12. Femelle

adulte, tuée le 16 Mai 1865, Wonoumbai (Arou), von Rosenberg. — 13. Mâle à-peu-près adulte, tué le 9 Juillet 1865, île Trangan (Arou), von Rosenberg. — 14. Individu, n'ayant encore atteint que la moitié de la grandeur des adultes, Arou, acquis en 1872. — 15. Petit en duvet, mâle, pris le 15 Février 1865, île Wammer du groupe d'Arou, von Rosenberg. — 16. Petit en duvet, pris le 16 Mai 1865, Wonoumbai (Arou), von Rosenberg.

TALLEGALLUS CUVIERI JOBIENSIS. — Tallegallus jobiensis, Meyer, Sitzungsbericht Acad. Berlin, 1874, p. 87.

Cet oiseau remplace le Tallegallus Cuvieri dans l'île Ansous, séparé de l'île principale de Jobie par un canal étroit.

Il ne diffère de l'espèce principale que par les plumes du sommet de la tête un peu plus larges et un peu plus allongées, ainsi que par la teinte des pieds tirant au rouge.

1. Femelle adulte, tuée en Avril 1873, Ansous (Jobie), voyage de M. Meyer, acquis en 1879: aile neuf pouces et demi [1]).

TALLEGALLUS PYRRHOPYGIUS, Schlegel, Notes from the Royal Zoological Museum of the Netherlands at Leyden, vol. 1, Note XXXIX.

Cette espèce, quoique offrant la même coloration du plumage que le Tallegallus Cuvieri, en diffère, au premier coup d'oeil

---

1) Consulter les observations suivantes de M. Ouastalet, reçues au moment de mettre sous presse. Elles sont contenues dans les Comptes rendus, 1880, N°. 16, p. 906. En examinant une collection envoyée récemment par M. Bruyn, j'ai vu que le Tallegallus jobiensis se trouve aussi sur le continent de la Nouv. Guin., que le Tallegallus pyrrhopygius possède, à l'âge adulte, une caroncule sur le devant du cou, et qu'il a toujours les narines arrondies, le bec et les pattes beaucoup plus robustes que le Tallegallus Cuvieri. Des caractères analogues, mais encore plus accentués, peuvent être observés chez une espèce nouvelle de l'île de Waigiou, espèce que je proposerai d'appeler Tallegallus Bruynii. Ce Tallégalle de Waigiou porte non seulement une caroncule sur le devant de la gorge, mais, sur le milieu du crâne, une véritable crête, qui se continue en arrière par une sorte de camail à double pendeloque. Il mérite d'être classé, avec le Tallegallus pyrrhopygius, dans une nouvelle subdivision du genre Tallégalle, le sous-genre Aepypodius. { αἴπυς — élevé. πόδιον — support, pied. }

par sa taille un peu moins forte, par son bec plus court, plus courbé et couleur de corne d'un gris brunâtre, par les pieds couleur de corne brune, par les plumes de la nuque et du dessus du cou plus développées et plus serrées; enfin, et principalement, par la belle teinte marronne du croupion et des sous-caudales.

Aile huit pouces dix lignes. Queue cinq pouces cinq lignes. Tarse trois pouces. Doigt du milieu vingt-deux lignes. Doigt postérieur neuf lignes. Bec onze lignes.

Le seul individu connu de cette espèce nous a été transmis par un des missionnaires néerlandais, résidant à la côte Nord-Est de la presqu'île des Papous.

1. Adulte, individu type de l'espèce, Papouasie; acquis en 1879.

LEIPOA.

Ce genre ne repose que sur une seule espèce, également remarquable par son système de coloration que par sa queue parfaitement applatie, par ses tarses plus courts que dans toutes les autres espèces de la tribu, enfin parce que la tête et le cou sont revêtus de plumes serrées. Le bec et les doigts sont également plus courts que d'ordinaire.

LEIPOA OCELLATA, Gould, Birds of Australia, pl. 78.

Cet oiseau égale en grandeur un coq de forte taille. Dessus de la tête, dessus et côtés du cou, petites couvertures alaires et côtés du jabot d'un gris assez pur, interrompu, sur le milieu du dessus de la tête et de la nuque, par une large raie brune. Plumes du menton et de la gorge blanchâtres à bords d'un roux jaunâtre. Devant du cou et milieu du jabot d'un blanc relevé par de larges flammèches noires. Poitrine, abdomen, plumes des jambes et sous-caudales d'un blanc uniforme; celles des flancs également blanches, mais ornées de bandes transversales noires. Plumes du manteau et de la face supérieure des ailes, chacune, grise à sa partie basale, d'un brun

ferrugineux à sa partie terminale; ces deux teintes, séparées par une bande blanche, sont relevées par des bandes noires, et chaque plume est, en outre, bordée de blanc. Dos, croupion et sous-caudales d'un gris traversé par des bandes noires. Pennes caudales noires, mais largement terminées de blanc.

Bec noir. Pieds d'un brun noirâtre.

Observé dans le Sud-Ouest de l'Australie et le long du fleuve Murray, dans l'Australie méridionale.

On rencontre cet oiseau dans les broussailles, mais il fréquente, dans l'intérieur des terres, des plaines sablonneuses. Il se tient à terre; mais poursuivi, il se perche sur un arbre, lorsqu'il s'en trouve. Il se nourrit de semences et de baies. Sa voix plaintive et mélancolique rappelle celle des pigeons. Pour préparer la ponte, les deux sexes accumulent dans des clairières, un tertre de sable jusqu'à la hauteur de trois pieds, au centre duquel la femelle dépose une douzaine d'oeufs, ensevelis dans des couches d'herbes et de feuilles tombées. Les oeufs sont d'un blanc légèrement teint de rouge. Les oeufs dérobés, la femelle fait une deuxième et même une troisième ponte; elle fait du reste, régulièrement, deux pontes dans chaque saison. Au sortir du nid, la mère va chercher ses petits, les conduisant à l'instar de nos poules, et en faisant continuellement entendre sa voix. Ces oiseaux peuvent longtemps exister sans boire, et s'altèrent assez souvent, en engorgeant les gouttes de pluie tombantes.

1. Mâle adulte, Adelaide, voyage de Gould. Aile onze pouces dix lignes. Queue huit pouces. Tarse deux pouces six lignes. Doigt mitoyen dix-huit lignes; ongle de ce doigt huit lignes. Doigt postérieur neuf lignes; ongle de ce doigt sept lignes.

RÉSUMÉ.

		Page	Ind. montés.
Megapodius	Duperreyi, Port Essington et Cap York à la côte Nord de l'Australie, (quelques îlots du détroit de Torres), Lombock, île de Flores (Wallace), île Salyer, au Sud de Célèbes, île de Wetter, Banda, Petit-Key, Grand-Key, Arou, Baie Lobo ou Triton et Sorong à la côte occidentale de la Nouvelle Guinée, côtes Nord et Nord-Est de la presqu'île des Papous, île de Jobie.	57	39
»	Geelvinkianus, îles Méosnoum, Mefoor, Soëk, Doréh.	63	
»	Bernsteini, groupe de Soula.	63	4
»	Pritchardi, île de Nina-fou, dans l'Archipel de Tonga.	64	1
»	senex, île Pelew ou Palaou	65	1
»	Freycinetii, groupe de Halmahéra, y compris les sous-groupes d'Obi et de Morotai, île de Guebéh, Gagie, Waighéou, Salawatty, Mysol, Sorong à la côte Ouest de la presqu'île des Papous.	66	72
»	Forstenii, Amboine, Bourou, Céram, (Wallace).	70	22
»	Lowei, Labouan à la côte Nord-Ouest de Bornéo.	71	4
»	Gilbertii, Nord de Célèbes.	73	8
»	sanghirensis, groupe de Sanghir.	73	6
»	nicobariensis, groupe de Nicobar.	74	4
»	Wallacei, Halmahéra, Ternate, Amboine, Céram, Bourou, (Wallace).	75	11
Megacephalon	maleo, Nord de Célèbes.	77	10
	Transport		188

	Page.	Ind. montés.
Transport		188
Tallegallus Lathamii, Parties orientales de l'Australie.	79	3
» Cuvieri, Presqu'île des Papous, Salawatty, Mysol, groupe d'Arou.	80	16
» Cuvieri jobiensis, île de Jobie.	82	1
» pyrrhopygius, Papouasie.	82	1
Leipoa ocellata, Sud et Sud-Ouest de l'Australie.	83	1
Total		210

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE

DES

PAYS-BAS

PAR

H. SCHLEGEL.

TABLE ALPHABÉTIQUE.

(VOLUMES I—VIII)

PAR

Dr. F. A. JENTINK.

LEIDE, E. J. BRILL.
1881.

TABLE ALPHABÉTIQUE

DES GROUPES ET DES ESPÈCES, DÉCRITS ET CITÉS DANS L'OUVRAGE INTITULÉ;

TOMES I—VI, VIII.

AVES.

LISTE DES ABRÉVIATIONS.

I Buc. = Tome I. Buceros.
I Bucc. = Tome I. Buccones.
I Cuc. = Tome I. Cuculi.
I Cor. = Tome I. Coraces.
II Oti. = Tome II. Oti.
II Str. = Tome II. Striges.
II Fal. = Tome II. Falcones.
II Cir. = Tome II. Circi.
II Ass. = Tome II. Astures.
II Ase. = Tome II. Asturinae.
II But. = Tome II. Buteones.
II Aq. = Tome II. Aquilae.
II Mil. = Tome II. Milvi.
II Per. = Tome II. Pernes.
II Pol. = Tome II. Polybori.
II Vul. = Tome II. Vultures.
II Noc. = Tome II. Oiseaux de proie (Revue), Aves noctuae.
II Acc. = Tome II. Oiseaux de proie (Revue), Aves accipitres.
III P. = Tome III. Psittaci.
III P. R. = Tome III. Psittaci (Revue).
III Me. = Tome III. Merops.
III Mo. = Tome III. Momotus.
III Al. = Tome III. Alcedines.
III Al. R. = Tome III. Alcedines (Revue).
III Pit. = Tome III. Pitta.
III Pit. R. = Tome III. Pitta (Revue).
IV Col. = Tome IV. Columbae.
IV St. = Tome IV. Struthiones.
IV Cur. = Tome IV. Cursores.
V Sc. = Tome V. Scolopaces.
V Ra. = Tome V. Ralli.
V Cic. = Tome V. Ciconiae.
V Ar. = Tome V. Ardeae.
V I. = Tome V. Ibis.
VI A. = Tome VI. Anseres.
VI Proc. = Tome VI. Procellariae.
VI L. = Tome VI. Lari.
VI Ster. = Tome VI. Sternae.
VI Pe. = Tome VI. Pelecani.
VI U. = Tome VI. Urinatores.
VIII Tin. = Tome VIII. Tinami.

A.

Abbagumba I Buc. 19.
abbreviatus (Buteo) II But. 11.
" (Falco) II But. 11.
Abdimia sphenorhyncha V Cic. 5.
abdimii (Ciconia) V Cic. 5.
abyssinica (Columba) IV Col. 48.
" (Coracias) I Cor. 134.
" (Otis) IV Cur. 8.
" (Phalacotreron) IV Col. 48.
" (Phytotoma) I Bucc. 5.
" (Rallina) V Ra. 16.
" (Treron) IV Col. 48.
" (Vinago) IV Col. 48.
abyssinicus (Bubo) II Oti. 15.
" (Buceroscarunculatus) I Buc. 19.
" (Bucorax) I Buc. 20.
" (Otus) II Oti. 5.
" (Pogonorhynchus) I Bucc. 5.
" (Rallus) V Ra. 16.
" (Rougetius) V Ra. 16.
" (Tragopan) I Buc. 19.
acadia (Strix) II Noc 18.
acadica (Strix) II Str. 41.
" (Ulula) II Str. 8; 2 Noc. 18.
Accipiter aequatorialis II Acc. 80.
" approximans II Acc. 79.
" bicolor II Acc. 72.
" brachydactylus II Acc. 94.
" chilensis II Acc. 72.
" chionogaster II Acc. 72.
" erythrauchen II Acc. 78.
" erythrocnemia II Ass. 31.
" erythrocnemius II Acc. 70.
" erythrorhynchus II Ass. 48.
" francessii II Acc. 94.
" (Fringillarius) II Ass. 28.
" fringilloides II Acc. 69.
" griseogularis II Ass. 41; II Acc. 80.
" haplochrous II Acc. 91.
" lantzii II Acc. 72.
" madagascariensis II Acc. 72.
" mexicanus II Acc. 73.
" minor II Ass. 28.
" mülleri II Acc. 80.
" poliocephalus II Acc. 88.
" rubricollis II Acc. 78.
" ruficaudus II But. 8.
" rufitorques II Acc. 80.
" rufiventris II Ass. 30.
" stevensonii II Acc. 74.
" sylvestris II Acc. 91.
Accipiter tinus II Ass. 33.
" torquatus II Ass. 38.
" ventralis II Acc. 70.
Accipitres II Acc. 32.
accipitrina (Amazona) III P. 67; III P.R 30.
accipitrinus (Derotypus) III P. 67.
" (Psittacus) III P. 66.
Acentetus I Cuc. 56.
Aceros nipalensis I Buc. 10.
acis (Tanysiptera) III Al. R. 36.
acoli (Circus) II Cir. 5.
acrorhynchus (Oriolus) I Cor. 104.
Actitis V Sc. 78.
Actitis bartramius V Sc. 78.
" empusa " " 80.
" hypoleucos " " 80.
" macularius " " 83.
" notatus " " 83.
" rufescens " " 79.
" schlegelii " " 80.
" wiedii " " 83.
Actiturus bartramius V Sc. 78.
" rufescens " " 79.
Actodromas bairdii V Sc. 39.
" bonapartei V Sc. 42.
" cooperi V Sc. 39.
Actodromus albescens V Sc. 43.
" australis " " 43.
" fuscicollis " " 48.
" minutilla " " 48.
" minutus " " 43.
" minutus brevirostris V Sc. 49.
" temminckii V Sc. 47.
" wilsoni " " 48.
acuflavida (Sterna) VI Ster. 5.
acuminata (Tringa) V Sc. 38.
acuminatus (Totanus) V Sc. 38.
acuta americana (Dafila) VI A. 37.
" (Anas) VI A. 37.
" (Dafila) VI A. 37.
acuticauda (Sterna) VI Ster. 21.
acuticaudata (Sittace) III P. 11.
acuticaudatus (Conurus) III P 11; III P.R.3.
" (Psittacus) III P. 11.
acutirostris (Aratinga) III P. 14.
Adamastor typus VI Proc. 23.
" (Procellaria) VI Proc. 23.
adelaidae (Platycercus) III P.97; III P.R.40.
Adelarus heermanni VI L. 9.
" hemprichii VI L. 32.
" leucophthalmus VI L. 32.
adelia (Catarrhactes) VI U. 4.
" (Dasyrhamphus) VI U. 4.
adeliae (Spheniscus) VI U. 4.

adspersa (Limosa) V Sc. 23.
adspersus (Crypturus) VIII Ti. 28.
" (Tinamus) VIII Ti. 28.
adunca (Anas) VI A. 41.
adusta (Diomedea) VI Proc. 31.
advena (Corvus) I Cor. 6.
Aegialeus semipalmatus IV Cur. 30.
Aegialites IV Cur. 23.
" cinereicollis IV Cur. 24.
Aegialitis nivosa IV Cur. 32.
aegocephala (Limosa) V Sc. 19.
" (Scolopax) V Sc. 19.
aegypius (Falco) II Acc. 126.
" (Milvus) II Acc. 126.
" niger II Vul. 9.
" (Vultur) II Vul. 9.
aegyptiaca (Anas) VI A. 94.
aegyptiacus (Anser) VI A. 94.
" (Chenalopex) VI A. 94.
" (Porphyrio) V Ra. 54.
aegyptius (Centropus) I Cuc. 72.
" (Charadrius) IV Cur. 14.
" (Cursorius) IV Cur. 14.
" (Falco) II Mil. 3.
" (Merops) III Me. 2, 6.
" (Milvus) II Mil. 3.
" (Pluvianus) IV Cur. 14.
aemiliae (Ptilinopus) IV Col. 14.
aemodium (Conostoma) I Cor. 71.
aenea (Carpophaga) IV Col. 85.
" (Columba) IV Col. 85.
" (Parra) V Ra. 67.
aeneus (Zanclostomus) I Cuc. 50.
aephanet (Lanier) II Fal. 15.
Aepypodius VIII Ti. 82.
aequatorialis (Accipiter) II Acc. 80.
" (Cacatua) III P. 140.
" (Gallinago) V Sc. 10.
" (Psittacus) III P. 137, 140.
" (Scolopax) V Sc. 10.
aequinoctialis(Buteo)II But.17,18;IIAcc.110.
" (Falco) II But. 18.
" (Majequeus) VI Proc. 19.
" (Procellaria) " " 19.
aëreus (Cuculus) I Cuc. 50.
" (Phoenicophaës) I Cuc. 50.
aeruginosus (Circus) II Cir. 10; II Acc. 50.
" (Falco) II Cir. 10.
" (Psittacus) III P. 21.
Aesalon II Fal. 19.
aesalon (Falco) II Fal. 19; II Acc. 37.
aestiva (Amazona) III P. 54; III P. R. 27.
" (Anas) VI A. 71.
aestivalis (Chrysotis) III P. 51.
aestivus (Psittacus) III P. 53, 54.
Aestrelata desolata VI Proc. 13.
" diabolica " " 11, 13.
" rostrata " " 10.
aethereus (Phaëton) VI Pe. 43.
aethiopica (Threskiornis) V I. 12.
aetiops (Rallus) V Ra. 34.
aetolius (Milvus) II Mil. 2; II Acc. 126.
afer (Coccystes) I Cuc. 44.
afer (Cuculus) I Cuc. 36, 44.
" (Eurystomus) I Cor. 142.
" (Oxylophus) I Cuc. 44.
affinis (Alcyone) III Al. 17; III Al. R. 9.
" (Centropus) I Cuc. 68.
" (Coracias) I Cor. 136.
" (Corvus) " " 31; I Bucc. 88.
" (Cyanocorax) I Cor. 53.
" (Dendrocygna) VI A. 76.
" (Eclectus) III P. 48; III P. R. 25.
" (Fuligula) VI A. 28.
" (Geococcyx) I Cuc. 41.
" (Marila) VI A. 28.
" (Milvus) II Mil. 3; II Acc. 126.
" (Mimeta) I Cor. 110.
" (Oedicnemus) IV Cur. 21.
" (Oriolus) I Cor. 110.
" (Palaeornis) III P. R. 36.
" (Rhynchophilus) IV Sc. 71.
" (Sterna) VI Ster. 6, 34.
" (Tanygnathus) III P. 48.
" (Thalasseus) VI Ster. 6.
" (Totanus) V Sc. 71.
afra (Afrotis) IV Cur. 6.
" (Chalcopelia) IV Col. 144.
" (Colaris) I Cor. 142.
" (Columba) IV Col. 144.
" (Coracias) I Cor. 142.
" (Otis) IV Cur. 6.
" (Peristera) IV Col. 144.
africana (Anas) VI A. 30.
" (Musophaga) I Cuc. 79.
" (Nyroca) VI A. 30.
" (Parra) V Ra. 69.
" (Sarkidiornis) VI A. 74.
" (Strix) II Oti. 14; II Noc. 15.
africanus (Bubo) II Oti. 14.
" (Graculus) VI Pe. 15.
" (Haematopus niger) IV Cur. 76.
" (Haliaeus) VI Pe. 15.
" (Metopidius) V Ra. 69.
" (Pelecanus) VI Pe. 15.
" (Phasianus) I Cuc. 79.
" (Sarkidiornis) VI A. 74.
" (Scops zorca)II Oti.20; IINoc.14.
" (Spizaetus) II Acc. 59.
Afrotis afra IV Cur. 6.
" leucoptera IV Cur. 6.
agami (Ardea) V Ar. 11.
Agamia picta V Ar. 11.
" sibilatrix V Ar. 36.
Agapornis xanthops III P. R. 31.
agilis (Psittacus) III P. 53.
Aguia II Aq. 1.
aguia (Buteo) II Ase 6.
" (Cuncuma) " " 6.
" (Falco) " " 5.
" (Haliaëtus) " " 5.
" (Heteroaëtus) " " 6.
Aigle de Batjan II Aq. 11.
Aigrettes V Ar. 11
Ailuroedes smithii I Cor. 117.
Aix galericulata VI A. 70.

Aix sponsa VI A. 71.
ajaja (Platalea) V Cic. 24.
„ rosea „ „ 24.
alaï (Fulica) V Ra. 61, 63.
alba (Ardea) V Ar. 16, 17.
„ (Ciconia) V Cic. 2.
„ (Columba) IV Col. 98.
„ (Egretta) V Ar. 16.
„ (Fulica) V Ra. 52.
„ (Ibis) V I. 5.
„ (Notornis) V Ra. 52.
„ (Paradisea) I Cor. 95.
„ (Sterna) VI Ster. 35.
„ (Sula) VI Pe. 37.
albatus (Anser) VI A. 107.
albellus (Mergellus) VI A. 6.
„ (Mergus) VI A. 6.
albeola (Anas) VI A. 22.
„ (Bucephala) VI A. 22.
„ (Clangula) „ „ 22.
„ (Fuligula) „ „ 22.
albescens (Actodromus) V Sc. 43.
„ (Bubo) II Oti. 7.
„ (Falco) II Ass. 3.
„ (Strix) II Oti. 7.
„ (Tringa) V Sc. 43.
albicans (Aquila) II Aq. 5.
albicapilla (Pica) I Cor. 51.
albicapillus (Psilorhinus) I Cor. 69.
„ (Vanellus) IV Cur. 68.
albiceps (Charadius) „ „ 62.
albicollis (Ardea) V Ar. 23.
„ (Asturina) II Ase. 9; II Acc. 103.
„ (Buteo) II Ase. 9.
„ (Corvultur) I Cor. 3.
„ (Corvus) I Cor. 3.
„ (Falco) II Ase. 9.
„ (Himantopus) V Sc. 105.
„ (Leucopternis) II Ase. 9.
„ (Merops) III Me. 5.
„ (Mustelirallus) V Ra. 34.
„ (Podiceps) VI U. 42.
„ (Porzana) V Ra. 34.
„ (Rallus) V Ra. 34.
„ (Rhynchops) VI Ster. 40.
„ (Tantalus) V I. 7.
„ (Theristicus) V I. 7.
albicilla (Alcedo) III Al. 42.
„ (Aquila) II Aq. 11.
„ (Dacelo) III Al. 42; III Al. R. 32.
„ (Halcyon) III Al. 42.
„ (Haliaëtus) II Aq. 11; II Acc. 117.
„ (Vultur) II Aq. 11.
albicristata (Musophaga) I Cuc. 77.
albidus (Falco) II But. 25.
albifacies (Geotrygon) IV Col 164.
„ (Starnoenas) „ „ 164.
albifrons (Amazona) III P. 59; III P.R. 28.
„ (Anas) VI A. 110.
„ (Anser) „ „ 110.
„ (Asturina) II But. 10.
„ (Bucco) I Bucc. 89.
„ (Buteo) II But. 10; II Acc. 109.
albifrons (Charadrius) IV Cur. 32.
„ (Coracias) I Cor. 134.
„ (Falco) II But. 10.
„ (Gallinula) V Ra. 35.
„ (Henicophaps) IV Col. 156.
„ (Laterirallus) V Ra. 35.
„ (Leptopila) IV Col. 160.
„ (Psittacus) III P. 59.
„ (Sterna) VI Ster. 24.
„ (Strix) II Noc. 18.
„ (Vanellus) IV Cur. 68.
albigena (Hydrochelidon) VI Ster. 20.
„ (Sterna) VI Ster. 20.
albigularis (Columba) IV Col. 75.
„ (Janthoenas) IV Col. 75
„ (Milvago) II Pol. 4.
„ (Syrnium) II Str. 16.
„ (Ulula) II Str. 16; II Noc. 20.
albilinea (Chloroenas) IV Col. 67.
„ (Columba) IV Col. 67.
albilineata (Ardea) V Ar. 27.
albimarginata (Strix) II Str. 17.
albinucha (Metopidius) V Ra. 70.
„ (Parra) V Ra. 70.
albipennis (Anas) VI A. 32.
„ (Chelidoptera) I Bucc. 91.
„ (Larus) VI L. 42.
„ (Nettapus) VI A. 77.
albirostris (Aquila) II Aq. 10.
„ (Buceros) I Buc. 6.
„ (Dendrocitta) I Cor. 75.
„ (Indicator) I Cuc. 2.
„ (Rhynchops) VI Ster. 40.
„ (Tanygnathus) III P. R. 25.
albitorques (Columba) IV Col. 73.
„ (Stictoenas) „ „ 73.
albiventer (Bidens) II Fal. 35.
„ (Pica) I Cor. 39.
albiventris (Alcedo) III Al. 31.
„ (Dacelo) III. Al 31; III Al.R.21.
„ (Laimodon) I Bucc. 6.
„ (Turtur) IV Col. 124.
albivertex (Cuculus) I Cuc. 16.
„ (Simotes) „ „ 16.
albivitta (Chamaepelia) IV Col. 135.
„ (Procelsterna) VI Ster. 38.
albocinctus (Ptilinopus) IV Col. 34.
albocristatus (Buceros) I Buc. 9.
„ (Turacus) I Cuc. 77.
albolineata (Herodias) V Ar. 27.
alboniger (Nisaëtus) II Ass. 6.
„ (Spizaëtus) II Acc. 52.
albopunctatus (Cuculus) I Cuc. 28.
albostriata (Sterna) VI Ster. 33.
albostrigatus (Cuculus) I Cuc. 26.
albotarse (Syrnium) II Str. 13.
albus (Anastomus) V Cic. 15.
„ (Epimachus) I Cor. 95.
„ (Eudocimus) V I. 5.
„ (Falco) II Ass. 20.
Alca VI U. 12.
„ alce „ „ 20.
„ alle „ „ 20.

Alca antiqua VI U. 21.
„ arctica „ „ 23.
„ arra „ „ 16.
„ balthica „ „ 13.
„ candida „ „ 20.
„ carbo „ „ 17.
„ cirrhata „ „ 27.
„ grylle „ „ 17.
„ impennis „ „ 13.
„ kamtschatica „ „ 25.
„ labradora „ „ 26.
„ labradorica „ „ 23.
„ lomvia „ „ 15.
„ major „ „ 13.
„ monocerata „ „ 26.
„ pica „ „ 13.
„ psittacula „ „ 24.
„ pygmaea „ „ 23.
„ temminckii „ „ 22.
„ torda „ „ 13.
„ unisulcata „ „ 13.
alce (Alca) „ „ 20.
Alcedines III Al. 1; III Al. R. 1.
Alcedo „ „ „ „ 1.
„ albicilla III Al. 42.
„ albiventris „ „ 31.
„ alcyon „ „ 4; III Al. R. 2.
„ amauroptera „ „ 8.
„ amazona III Al. 5; „ „ 2.
„ americana „ „ 5; „ „ 2.
„ asiatica III Al. R. 5.
„ atricapilla III Al. 27.
„ australasia „ „ 35.
„ australasiae III Al. R. 30.
„ azurea III Al. 17; „ „ 9.
„ bengalensis „ „ 7; „ „ 3.
„ „ minor III Al. 7.
„ beryllina III Al. 11; III Al. R. 6.
„ bicolor. „ „ 5.
„ biru „ „ 11.
„ cabanisii „ „ 5; III Al. R. 2.
„ capensis „ „ 13.
„ chelicuti „ „ 32.
„ chloris „ „ 32.
„ chlorocephala III Al. 32.
„ cinereifrons „ „ 29.
„ coeruleocephala III Al. 12; III Al. R. 6.
„ collaris „ „ 32.
„ coromanda „ „ 25.
„ coromandeliana „ „ 25.
„ cristata „ „ 11; III Al. R. 6.
„ cyanipectus „ „ 17; „ „ 11.
„ cyaniventris „ „ 18.
„ cyanostigma „ „ 11; „ „ 6.
„ dea „ „ 43.
„ diemensis „ „ 17.
„ diophthalmorufo-ventro III Al. 41.
„ diops „ „ 41.
„ erythrogaster III Al. 29; III Al. R. 19.
„ euryzona „ „ 10; „ „ 5.
„ fusca „ „ 28.
„ gaudichaudii „ „ 20.
„ gigas „ „ 19.
Alcedo gularis III Al. 28; III Al. R. 19.
„ guttata „ „ 1; „ „ 1.
„ ispida „ „ 6; „ „ 2.
„ lazuli „ „ 10, 42.
„ lecontei „ „ 16; III Al. R. 9.
„ leucocephala „ „ 13; „ „ 7.
„ leucogaster „ „ 15; „ „ 8.
„ lugubris „ „ 2; „ „ 1.
„ maculata 1 Bucc. 84.
„ malimbica III Al. 30.
„ maxima „ „ 3; III Al. R. 1.
„ melanoptera „ „ 27.
„ melanorhyncha III Al. 15; III Al. R. 8.
„ meninting „ „ 9; „ „ 5.
„ minor „ „ 7; „ „ 3.
„ „ moluccensis „ „ 8; „ „ 3.
„ moluccensis „ „ 8.
„ natalensis III Al. R. 8.
„ omnicolor III Al. 27; „ „ 18.
„ picta „ „ 16; „ „ 8.
„ picturata „ „ 16; „ „ 8.
„ pileata „ „ 27.
„ pulchra „ „ 17.
„ purpurea „ „ 49.
„ pusilla III Al. 17; III Al. R. 10.
„ quadribrachys „ „ 9; „ „ 5.
„ rubra „ „ 49.
„ rudis „ „ 2; III Al. R. 1.
„ rufiventer „ „ 29.
„ sacra „ „ 38.
„ semicoerulea „ „ 29.
„ semitorquata „ „ 10; III Al. R. 5.
„ senegalensis „ „ 29, 30.
„ smyrnensis „ „ 28.
„ solitaria „ „ 17; III Al. R. 9.
„ striolata „ „ 31.
„ superciliosa „ „ 6; III Al. R. 2.
„ torquata „ „ 4; „ „ 1.
„ tribrachys „ „ 17.
„ tutu „ „ 38.
„ vintsioides „ „ 12; III Al. R. 6.
„ viridis „ „ 5.
„ viridirufa „ „ 5; III Al. R. 2.
alcinus (Macheirhamphus) II Per. 7; II Acc. 136.
alcyon (Alcedo) III Al. 4; III Al. R. 2.
„ (Ceryle) „ „ 4.
„ affinis „ „ 17; III Al. R. 9.
Alcyone azurea „ „ 17.
„ cyanipectus „ „ 18; III Al R. 11.
„ diemensis „ „ 9.
„ lessonii III Al. 17; „ „ 9.
„ pulchra „ „ 9.
„ pusilla III Al. 18.
„ solitaria „ „ 17.
aldrovandi (Falco) II Fal. 23.
Alecthelia lineata V Ra. 27.
alecto (Ara) III P. 151.
„ (Microglossum) III P. 151; III P. R. 67.
aleutica (Uria) VI U. 26.
aleuticus (Ptychorhamphus) VI U. 26.
aleuticus (Simorhynchus) VI U. 26.

alexandri (Palaeornis) III P. 76; IIIP.R.35.
alexandri (Psittacus) III P. 76.
alexandrinus (Charadrius) IV Cur. 32.
algeriensis (Haliaeus pygmaeus) VI Pe. 13.
alle (Alca) VI U. 20.
" (Mergulus) VI U. 20
" (Uria) VI U. 20.
alleni (Caesarornis) V Ra. 38.
" (Gallinula) " " 38.
" (Porphyrio) " " 38.
alopex (Falco) II Acc. 45.
alpina (Tringa) V Sc. 32.
altumii (Cygnus) VI A. 82.
aluco (Strix) II Str. 12.
" (Syrnium) II Str. 12.
" (Ulula) II Str. 12; II Noc. 19.
amabilis (Loriculus) III P. 131; III P.R.61.
" (Zenaida) IV Col. 140.
amarantha (Columba) IV Col. 39.
amauroptera (Alcedo) III Al. R. 8.
" (Dacelo) III Al 14.
" (Halcyon) III Al. R. 8.
Amaurornis femoralis V Ra. 50.
" olivacea V Ra. 43.
amaurotis (Strix) II Noc. 16.
amazilia (Chamaepelia) IV Col. 135.
Amazona III P. 49; III P. R. 26.
" accipitrina III P. 67; III P.R.30.
" aestiva " " 54; " " 27.
" albifrons " " 59; " " 28.
" (Alcedo) III Al. 5; III Al. R. 2
" amazonica III P 53; III P.R. 27.
" amanonina III P. R. 30.
" augusta " " 26.
" augustus III P. 50.
" auripalliata III P. 52; IIIP.R.27.
" autumnalis " " 51; " " 26.
" barrabandi " " 65; " " 30.
" brachyura " " 66; " " 30.
" brasiliensis " " 57; " " 28.
" (Ceryle) III Al.5.
" chalcoptera III P.62; IIIP.R.29.
" cyanogaster " " 66; " " 30.
" cyanorhyncha " " 50; " " 26.
" diadema III P. R. 26, 27.
" dufresniana III P. 52; IIIP.R.27.
" farinosa " " 52; " " 27.
" festiva " " 57; " " 28.
" gerontodes " " 29.
" guatemalae " " 27.
" guildingi III P. 49; IIIP.R.26.
" haematötis " " 65; " " 29.
" histrio " " 64; " " 29.
" leucocephala " " 59; " " 28.
" leucogaster " " 63; " " 29.
" maximiliani " " 61; " " 29
" melanocephala " 64; " " 29.
" melanotis " " 67; " " 30.
" menstrua " " 60; " " 28.
" mercenaria " " 28.
" prêtei III P. 59; " " 28.
" sallaei " " 58; " " 28.
" senilis " " 62; " " 29.
Amazona sordida III P. 61; III P. R. 28.
" vinacea " " 50; " " 26.
" violacea " " 63; " " 29.
" vittata " " 58; " " 28.
" vulturina " " 66; " " 30.
" xantholora " " 59; " " 28.
" xanthops " " 57; " " 27.
Amazones III P. 49.
amazonica (Amazona) III P. 53; III P. R.27.
amazonicus (Capito) I Bucc. 57.
" (Micropogon) I Bucc. 57.
" (Psittacus) III P. 53, 54.
" pullus (Psittacus) III P. 57.
amazonina (Amazona) III P. R. 30.
amazoninus (Psittacus) " " 30.
ambiguus (Psittacus) III P. 5.
Amblycorax violaceus I Cor. 31.
amboinensis (Macropygia) IV Col. 113.
" (Platycercus) III P.90; IIIP.R.37.
" (Psittacus) III P. 90.
" (Turtur) IV Col. 110, 113.
americana (Alcedo) III Al. 5; III Al. R. 2.
" (Anas) VI A. 45.
" (Ardea) V Ra. 4, 17.
" (Aythyia) VI A. 24.
" (Bucephala) VI A. 20.
" (Calidris) V Sc. 55.
" (Ceryle) III Al. 5.
" (Chaulelasmus) VI A. 48.
" (Ciconia) V Cic. 8.
" (Dafila acuta) VI A. 37.
" (Fulica) V Ra. 63.
" (Fuligula) VI A. 19.
" (Grus) V Ra. 4.
" (Limosa) V Sc. 23.
" (Mareca) VI A. 45.
" (Microptera) V Sc. 3.
" (Mycteria) V Cic. 11.
" (Oidemia) VI A. 19.
" (Recurvirostra) V Sc. 104.
" (Rhea) IV St. 6.
" (Strix) II Str. 5.
" (Strix flammea) II Str. 4; II Noc. 16.
" (Sula) VI Pe. 37.
" (Tringa) V Sc. 33.
americanus (Coccygus) I Cuc. 37.
" (Corvus) I Cor. 24.
" (Cuculus) I Cuc. 37.
" (Cygnus) VI A. 82.
" (Falco) II Pol. 9.
" (Graculus) VI Pe. 8.
" (Haematopus niger) IV Cur. 76.
" (Ibicter) II Pol. 9; II Acc. 138.
" (Mergus) VI A. 2.
" (Nycticorax) V Ar. 56.
" (Oedicnemus) IV Cur. 19.
" (Olor) VI A. 82.
" (Otus) II Oti. 2.
" (Otus vulgaris) II Oti. 2.
" (Pandion) II Aq. 22.
" (Pluvialis fulvus) IV Cur. 53.
" (Podiceps) VI U. 42.

amethystina (Chloroenas) IV Col. 80.
" (Lampromorpha) I Cuc. 32.
" (Phapitreron) IV Col. 80.
amicta (Nyctiornis) III Me. 13.
amictus (Merops) " " 13.
Amitori VI Pe. 17.
Ammoptila charadroides VI Ster. 41.
amphileusis (Erodia) " " 41.
amurensis (Erythropus) II Acc. 46.
" (Falco vespertinus) " " 46.
Anabopton antiquus VI U. 22.
Anadaenes rufescens I Cuc. 52.
" ruficauda " " 52.
Anadorhynchus maximiliani III P. 2.
anais (Gallirex) I Cuc. 75.
" (Gracula) I Cor. 98.
" (Metriopelia) IV Col. 153.
" (Sericulus) I Cor. 98.
anaphonensis (Barita) I Cor. 123.
" (Cracticus) I Cor. 123.
" (Gymnorhina) I Cor. 123.
Anas VI A. 33.
" acuta " " 37.
" adunca " " 41.
" aegyptiaca " " 94.
" aestiva " " 71.
" africana " " 30.
" albeola " " 22.
" albifrons " " 110.
" albipennis " " 32.
" americana " " 45.
" angustirostris " " 63.
" anser " " 109.
" antarctica " " 98.
" arborea " " 84.
" arctica VI U. 28.
" arcuata VI A. 89.
" assimilis " " 59.
" atra " " 18.
" atrata " " 80.
" atricapilla " " 32.
" atricilla " " 29.
" aurita " " 75.
" autumnalis " " 92.
" awsuree " " 89.
" azarae " " 59.
" bahamensis " " 55.
" bicolor " " 76, 87.
" bimaculata " " 54.
" boschas " " 40.
" brachyptera " " 13.
" brasiliensis " " 61.
" brevipennis " " 8.
" bucephala " " 22.
" caesio-scapulata " " 35.
" cana " " 67.
" canadensis " " 105.
" canagica " " 115.
" capensis " " 31.
" carolinensis " " 53.
" carunculata " " 7, 74.
" caryophyllacea " " 62.
" casarca " " 66, 110.
Anas castanea VI A. 59.
" caudacuta " " 37.
" chalcoptera " " 46.
" cheneros " " 65.
" chiloënsis " " 46.
" cinerea " " 13.
" circia " " 49.
" clangula " " 20.
" clypeata " " 33.
" coerulata " " 51.
" coerulescens " " 108.
" collaris " " 26, 87.
" colymbis " " 28.
" cornuta " " 67.
" coromandeliana " " 76.
" coscoroba " " 83.
" crecca " " 52.
" creccoides " " 59.
" cristata " " 28, 39.
" cuprea " " 62.
" cyanoptera " " 51, 62.
" cygnoides " " 106.
" cygnus " " 78, 81.
" discors " " 50.
" dispar " " 15.
" dominica " " 9.
" erythrocephala " " 62.
" erythropus " " 104, 110.
" erythorhyncha " " 56, 61.
" falcaria " " 72.
" falcata " " 72.
" fasciata " " 36.
" ferina " " 23.
" ferruginea " " 30.
" fimbriata " " 55.
" fistularis " " 44.
" flavirostris " " 44, 59.
" formosa " " 54.
" frenata " " 26.
" fretensis " " 57.
" fuliginosa " " 16.
" fuligula " " 28.
" fulva " " 87.
" fusca " " 16.
" galericulata " " 70.
" gambensis " " 93.
" gibberifrons " " 58.
" girra " " 76.
" glacialis " " 23.
" glaucion " " 20, 30.
" glocitans " " 54.
" grandis " " 114.
" guttata " " 49, 85.
" hina " " 52.
" histrionica " " 22.
" hottentota " " 60.
" humeralis " " 49.
" hybrida " " 98.
" hyemalis " " 20, 23.
" hyperborea " " 107.
" indica " " 114.
" inornatus " " 101.
" iodotis " " 36.

Anas ipecutiri VI A. 61.
" islandica " " 21.
" javana " " 72.
" jubata " " 95, 97.
" kogolka " " 44.
" labradoria " " 19.
" latirostris " " 28
" larvata " " 60.
" leucocephala " " 11.
" leucomelas " " 69.
" leucophrys " " 42.
" leucophthalmos " " 30.
" leucoptera " " 99.
" leucostigma " " 49.
" lobata " " 7.
" lophyra " " 39.
" luzonica " " 42.
" maculirostris " " 57.
" madagascariensis " " 75.
" magellanica " " 98, 99.
" malacorhyncha " " 36.
" manillensis " " 77.
" marila " " 26.
" marmorata " " 63.
" maxima " " 73.
" melanocephala " " 32, 79.
" melanocorypha " " 79.
" melanoleuca " " 92.
" melanota " " 74.
" melanura " " 44.
" membranacea " " 36.
" mersa " " 12.
" metopias " " 32.
" mexicana " " 33, 35.
" mollissima " " 14.
" montana " " 67.
" moschata " " 73, 74.
" mülleri " " 42.
" multicolor " " 77.
" muralis " " 57.
" muta " " 58.
" naevosa " " 63.
" nigra " " 18, 19,
" nigriceps " " 32.
" nigricollis " " 79.
" nivalis " " 107.
" notata " " 28, 61.
" novae hispaniae " " 52.
" novae zeelandiae " " 29.
" nyroca " " 30.
" obscura " " 41.
" olor " " 78.
" oxyptera " " 59.
" oxyura " " 38.
" paludosus " " 112.
" paturi " " 61.
" pelenope " " 44.
" peposaca " " 31.
" personata " " 90.
" perspicillata " " 16.
" picta " " 54, 99.
" platalea " " 35.
" plutonia " " 80.
Anas poëcilorhyncha VI A. 43.
" pollicaris " " 95.
" pteneres " " 13.
" punctata " " 47, 59.
" purpureo-viridis " " 73.
" pyrrhogaster " " 39.
" pyrrhorhyncha " " 56.
" querquedula " " 49.
" radjah " " 69.
" rafflesii " " 51.
" regia " " 73, 74.
" rhodoptera " " 61.
" rhynchotis " " 35.
" rubens " " 52.
" rubida " " 11.
" rubidoptera " " 61.
" rubrirostris " " 55
" rufa " " 23.
" ruficollis " " 23.
" rufina " " 25.
" rufitorques " " 26.
" rustica " " 22.
" rutila " " 66.
" scandiaca " " 28.
" scutulata " " 64.
" segetum " " 112.
" smipalmata " " 92.
" sibilatrix " " 46.
" sinuata " " 87.
" sparsa " " 49.
" spectabilis " " 13.
" specularis " " 46.
" specularoides " " 39.
" spinicauda " " 38.
" spinosa " " 9, 93.
" sponsa " " 71.
" St. Cuthberti " " 14.
" stelleri " " 15.
" strepera " " 48.
" superciliosa " " 42.
" superciliosa sandwichensis VI A. 42.
" tadorna VI A. 67.
" tadornoides " " 65.
" torquata " " 54, 61, 102, 103.
" tricolor " " 74.
" undulata " " 114.
" urophasianus " " 55.
" valisneriana " " 25.
" variegata " " 65.
" versicolor " " 57.
" viduata " " 90.
" virgata " " 87.
" viridi-aurea " " 73.
" xanthorhyncha " " 43, 59.
Anastomus V Cic. 15.
" albus V Cic. 15.
" cinereus " " 15.
" lamelligerus " " 15.
" oscitans " " 15.
" pondicerianus " " 15.
" typus " " 15.
anatoides (Cygnus) VI A. 83.
Ancylocheilus subarquata V Sc. 31.

andalusiae (Cuculus) I Cuc. 44.
andamanensis (Spizaëtus) II Acc. 52.
andersoni (Larus) VI L. 28.
Andurinha do mato I Bucc. 92.
anglica (Sterna) VI Ster. 34.
anglorum (Procellaria) VI Proc. 28.
" (Puffinus) " " 28.
angolensis (Coracias) I Cor. 135.
" (Falco) II Aq. 18.
" (Gypaëtos) " " 18.
" (Haliaetus) " " 18; II Acc. 119.
" (Pitta) III Pit. 12; III Pit. R. 15.
" (Vultur) II Aq. 18.
angulata (Gallinula) V Ra. 49.
angustirostris (Anas) VI A. 63.
" (Marmaronetta) VI A. 63.
" (Phalaropus) V Sc. 58.
" (Querquedula) VI A. 59.
anhinga (Plotus) VI Pe. 25.
ani (Crotophaga) I Cuc. 47.
anna (Platycercus) III P. 88; III P. R. 36.
annuligerus (Charadrius) IV Cur. 36.
Anous cinereus VI Ster. 38.
" gracilis " " 38.
" inca " " 39.
" leucocapillus " " 37.
" melanogenys " " 37.
" melanops " " 37.
" minor " " 37.
" parvulus " " 38.
" pileatus " " 36.
" plumbeus " " 38.
" rousseaui " " 36.
" stolidus " " 36.
" tephrodes " " 38.
" unicolor " " 36.
Anser VI A. 93.
Anser aegyptiacus VI A. 94.
" albatus " " 107
" albifrons " " 110.
" (Anas) " " 109.
" antarcticus " " 98.
" anticola " " 100.
" arvensis " " 112.
" bernicla " " 103, 104.
" brachyrhynchos " " 112.
" brenta " " 103.
" brevirostris " " 111, 112.
" bruchii " " 109.
" canadensis " " 105.
" canagensis " " 106.
" canagicus " " 115.
" candidus " " 98.
" chinensis " " 106.
" cinerascens " " 111.
" cinereus " " 109.
" coerulescens " " 108.
" cookii " " 106.
" cyanopterus " " 96.
" cygnoides " " 106.
" erythropus " " 110, 111.
" ferus " " 109.
" frontalis " " 110.
Anser gambelli VI A. 110.
" gambensis " " 93.
" grandis " " 114.
" hawaaïensis " " 106.
" hutchinsii " " 105.
" hyperboreus " " 107, 108.
" indicus " " 114.
" intermedius " " 110.
" jubatus " " 97.
" lanuginosus " " 14.
" leucopareius " " 105.
" leucopsis " " 104.
" leucopterus " " 101.
" magellanicus " " 99; VI U. 10.
" medius " " 110.
" melanopterus " " 100.
" minutus " " 111.
" montanus " " 100.
" nigricans " " 103.
" obscurus " " 112.
" pallipes " " 110.
" phoenicopus " " 112.
" pictus " " 115.
" poliocephalus " " 101.
" polycomos " " 95.
" pygmaeus " " 111.
" roseipes " " 110.
" rossii " " 108.
" rubidiceps " " 102.
" ruficollis " " 102.
" sandwichensis " " 106.
" segetum " " 112.
" sylvestris " " 109, 112.
" temminckii " " 111.
" torquatus " " 103.
" vulgaris " " 109.
Anseranas melanoleuca VI A. 92.
Anseres " " 1.
antarctica (Anas) " " 98.
" (Columba) IV Col. 74.
" (Eudyptes) VI U. 5.
" (Procellaria) VI Proc. 15.
" (Pygoscelis) VI U. 5.
" (Sterna) VI Ster. 21, 26.
" (Stictoenas) IV Col. 74.
" (Thalassoica) VI Proc. 15.
antarcticus (Anser) VI A. 98.
" (Aptenodytes) VI U. 5.
" (Lestris) VI L. 46.
" (Lopholaimus) IV Col. 74.
" (Podiceps) VI U. 47.
" (Spheniscus) VI U. 5.
" (Stercorarius) VI L. 46.
" (Sylbeocyclus) VI U. 47.
anthopeplus (Palaeornis) III P. 99.
anthracina (Asturina) II Ase. 8; II Acc. 103.
anthracinus (Buceros) I Buc. 7.
" (Falco) II Ase. 8.
" (Hypomorphnus) II Ase. 8.
Anthropoides paradiseus V Ra. 6.
" stanleyanus V Ra. 6.
" virgo " " 6.
anticola (Anser) VI A. 100.

antigone (Ardea) V Ra. 3.
" carunculata V Ra. 5.
" (Grus) " " 3.
" torquata " " 3.
antipoda (Eudyptes) VI U. 9.
" (Pygoscelis) " " 9.
antipodes (Catarrhactes) VI U. 9.
" (Spheniscus) " " 9.
antipodum (Dominicanus) VI L. 13.
antiqua (Alca) VI U. 21.
" (Uria) " " 22.
antiquorum (Phoenicopterus) VI A. 116.
" (Porphyrio) V Ra. 52.
antiquus (Anabopton) VI U 22.
" (Synthliborhamphus) VI U. 22.
Aphanapteryx imperialis IV St. 4.
Aphriza borealis IV Cur. 45.
" townsendi " " 45.
" virgata " " 45.
apiaster (Merops) III Me. 4.
apicalis (Ptilopus) IV Col. 6.
apicauda (Sphenura) IV Col. 62.
" (Treron) " " 62.
apicaudus (Sphenocercus) IV Col. 62.
apivorus (Falco) II Per. 1.
" (Pernis) " " 1; II Acc. 131; II But. 5.
Aplopelia bronzina IV Col. 161.
" larvata " " 161.
apoda (Paradisea) I Cor. 79.
apoxypterus (Astur) II Ass. 15.
" (Falco) " " 15.
approximans (Accipiter) II Acc. 79.
" (Astur) II Ass. 42; II Acc. 79.
" (Circus) " " 51.
" (Nisus) II Ass. 42; " " 79.
" (Urospiza) II Ass. 42.
apricarius (Charadrius) IV Cur. 49.
" (Pluvialis) " " 49.
Aptenodytes VI U. 1.
" antarcticus VI U. 5.
" brasiliensis " " 11.
" catarractes " " 8.
" catarrhactes " " 7.
" chilensis " " 10.
" chiloensis " " 10.
" chrysocome " " 6, 7, 8.
" flavilarvata " " 9.
" forsteri " " 3.
" fusci ostris " " 10.
" imperator " " 3.
" longicaudata " " 4.
" longirostris " " 3.
" magellanicus " " 10.
" minor " " 10.
" molinae " " 10.
" palpebrata " " 11.
" papua " " 5.
" patachonica " " 3.
" patagonica " " 3.
" pennantii " " 3.
" platyrhynchos VI U. 10.
" rex " " 3.
Aptenodytes taeniata VI U. 5.
" torquata " " 10.
" undina " " 10.
Apterornis coerulescens V Ra. 52.
Apteryx IV St. 5, 7.
Apteryx australis IV St. 7.
" mantellii " " 7.
" owenii " " 8.
aquaticus minor (Rallus) V Ra. 29.
" (Rallus) " " 10.
Aquila albicans II Aq. 5.
" albicilla " " 11.
" albirostris " " 10.
" audax " " 10; II Acc. 116.
" bifasciata " " 3, 6.
" bonnellii " " 9; II Acc. 116.
" braccata II But. 12.
" brachydactyla II But. 23.
" buson " " 17.
" clanga II Aq. 3; II Acc. 115.
" des Mursii " " 115.
" (Fregata) VI Pe. 2.
" fucosa II Aq. 10.
" fulva " " 1; II Acc. 115.
" fulvescens " " 115.
" gurneyi II Aq. 11; II Ass. 14; II Acc. 60.
" haliaëtus II Aq. 22.
" hastata " " 7.
" heliaca " " 2.
" imperialis " " 2; II Acc. 115.
" leucocephala " " 12.
" leucoprymna " " 9.
" leucorypha " " 15.
" leucostigma II Ass. 12.
" malayensis II Aq. 11; II Acc. 116.
" megalopterus II Pol. 4.
" milvoides II But. 17.
" minuta II Aq. 8.
" mogilnik II Aq. 2.
" mogilnik bifasciata II Aq. 3; II Acc. 115.
" morphnoides II Aq. 8.
" naevia " " 6; II Acc. 116.
" naevioides " " 3; " " 115.
" nipalensis " " 9.
" pennata " " 8; II Acc. 116.
" pezoporos II Pol. 6.
" rubriventer II Aq. 9.
" verreauxii " " 9.
" vindhiana " " 7.
" vocifera " " 16.
" vulturina " " 9; II Acc. 116.
" zonata II Ass. 12.
Aquilae II Aq. 1; II Acc. 115.
aquilinus (Falco) II Pol. 9.
aquilus (Attagen) VI Pe. 2.
" (Pelecanus) " " 2.
" (Tachypetes) " " 2.
Ara alecto III P. 151.
" aracanga III P. 3.
" auricollis " " 7.
" auritorques III P. 7.
" brasiliensis " " 3.

Ara castaneifrons III P. 6.
„ chloropterus „ „ 3.
„ chrysotorquos „ „ 7.
„ glauca „ „ 2.
„ hyacinthina „ „ 2.
„ jamaicensis „ „ 3.
„ macao „ „ 3.
„ manilata „ „ 7.
„ pachyrhyncha „ „ 11.
„ rubrigenys „ „ 5.
arabs (Charadrius) IV Cur. 26.
„ (Choriotis) „ „ 8.
„ (Otis) „ „ 8.
aracanga (Ara) III P. 3.
„ (Psittacus) III P. 3.
aracauna (Columba) IV Col. 67.
Aramides V Ra. 13.
Aramides gigas V Ra. 14.
„ maximus V Ra. 14.
„ plumbeus „ „ 15.
„ ruficollis „ „ 15.
„ ypecaha „ „ 14.
Aramus V Ra. 7.
„ carua V Ra. 7.
„ scolopaceus V Ra. 7.
aranea (Sterna) VI Ster. 34.
Arara III P. 1; III P. R. 1.
„ ararauna III P. 4; III P. R. 2.
„ auricollis „ „ 7; „ „ 2.
„ aymara „ „ 16.
„ chloroptera „ „ 3; III P. R. 2.
„ glauca „ „ 2; „ „ 1.
„ hahnii „ „ 8; „ „ 3.
„ hyacinthina „ „ 2; „ „ 1.
„ macao „ „ 3; „ „ 2.
„ macrognathus „ 8.
„ manilata „ „ 7; III P. R. 2.
„ maracana „ „ 6; „ „ 2.
„ militaris „ „ 5; „ „ 2.
„ nobilis „ „ 8; „ „ 3.
„ pupureodorsalis III P. 7.
„ rubrigena III P. 5; III P. R. 2.
„ severa „ „ 6; „ „ 2.
„ tricolor „ „ 4; „ „ 2.
ararauna (Arara) „ „ 4; „ „ 2.
„ (Psittacus) III P. 4.
Aratinga acutirostris „ „ 14.
„ aurifrons „ „ 18.
„ carolinae augustae III P. 17.
„ chrysocephalus „ „ 18.
„ cyanogularis „ „ 23.
„ flaviventris „ „ 21.
„ haemorrhous „ „ 11.
„ ninus „ „ 24.
arborea (Anas) VI A. 84.
„ (Dendrocygna) VI A. 84.
arcadicus (Falco) II Fal. 25.
Archibuteo II But. 1.
„ strophiatus II But. 3.
archipelagicus (Indicator) I Cuc. 2.
arctica (Alca) VI U. 28.
„ (Anas) „ „ 28.
„ (Lunda) „ „ 28.
arctica (Mormon) VI U. 28.
„ (Sterna) VI Ster. 15.
arcticus (Colymbus) VI U. 31.
„ (Haematopus) IV Cur. 74.
„ (Heliaptex) II Oti. 10.
„ (Larus) VI L. 4.
„ (Leucus) VI L. 4.
„ (Podiceps) VI U. 36.
arcuata (Anas) VI A. 89.
„ (Dendrocygna) VI A. 88, 89.
„ gouldii (Dendrocygna) VI A. 88.
„ vagans (Dendrocygna) „ „ 88.
Ardea V Ar. 1.
„ agami V Ar. 11.
„ alba „ „ 16, 17.
„ albicollis V Ar. 23.
„ albilineata V Ar. 27.
„ americana „ „ 17; V Ra. 4.
„ antigone V Ra. 3.
„ ardesiaca V Ar. 10.
„ argala V Cic. 12, 13.
„ asha V Ar. 25.
„ atra „ „ 25.
„ atricapilla V Ar. 42.
„ atricollis „ „ 6.
„ bilineata „ „ 45.
„ brag „ „ 5.
„ brasiliensis „ „ 49, 52.
„ bubulcus „ „ 31.
„ bullaragang „ „ 7.
„ cabanisii „ „ 51.
„ caledonica „ „ 59, 60.
„ canadensis V Ra 2.
„ candidissima V Ar. 15.
„ carunculata V Ra. 5.
„ cayennensis V Ar. 61.
„ chloriceps „ „ 43.
„ ciconia V Cic 2.
„ cinerea V Ar. 5.
„ cinnamomea V Ar. 40.
„ çoçoi „ „ 6.
„ coerulea „ „ 22.
„ coerulescens „ „ 9.
„ comata „ „ 32.
„ coromanda „ „ 30.
„ coromandeliana V Cic. 15.
„ crumenifera „ „ 12.
„ cucullata V Ar. 60.
„ dubia V Cic. 13.
„ egretta V Ar. 16, 17.
„ egrettoides V Ar. 16, 19.
„ eulophotes „ „ 29.
„ exilis „ „ 39.
„ fasciata „ „ 53.
„ flava „ „ 52.
„ flavicollis „ „ 45, 46.
„ flavicollis australis V Ar. 46.
„ flavirostris V Ar. 17.
„ freti hudsonis V Ar. 49.
„ gardeni V Ar. 56.
„ garzetta V Ar. 12.
„ gigantea V Ra. 5.
„ gigantodes V Ar. 3.

Ardea goisagi V Ar. 54
" goliath " " 3.
" grayi V Ar. 35
" griseus V Ar. 56.
" grus V Ra. 1.
" gularis V Ar. 23.
" gutturalis V Ar. 45.
" helias V Ra. 73.
" heliosylos V Ar. 51.
" herodias V Ar. 4.
" ibis V Ar. 31.
" indica V Cic. 7.
" intermedia V Ar. 19.
" javanica V Ar. 43.
" jugularis V Ar. 25.
" lentiginosa V Ar. 49.
" lepida V Ar. 40.
" leuce V Ar. 17.
" leucocephala V Cic. 9.
" leucogaster V Ar. 9.
" leucolopha V Ar. 50.
" leuconotus " " 60.
" leucophaea " " 5.
" leucoprymna V Ar. 9.
" leucops V Ar. 28.
" leucoptera V Ar. 32.
" leucoptera grayi V Ar. 35.
" leucoptera speciosa V Ar. 34.
" limnicola V Ar. 55.
" limnophylax V Ar. 55.
" lineata V Ar. 52, 53.
" macrorhyncha V Ar. 44.
" maguari V Cic. 8.
" malaccensis V Ar. 33.
" manillensis V Ar. 60.
" melanocephala V Ar. 6.
" melanopus V Ar. 19.
" melanorhyncha V Ar. 16.
" minor V Ar. 49.
" minuta " " 37.
" " australis V Ar. 39.
" modesta V Ar. 17.
" mokoho " " 49.
" nigripes " " 12.
" nigrirostris V Ar. 12.
" nivea V Ar. 12.
" nobilis V Ar. 3.
" novae guineae V Ar. 25.
" novae hollandiae V Ar. 28.
" nycticorax V Ar. 56.
" obscura V Ar. 58.
" ohula V Ar. 15.
" orientalis V Ar. 12.
" pacifica V Ar. 7.
" pardisea V Ra. 6.
" patruelis V Ar. 43.
" pavonina V Ra. 7.
" pharaonica V Ar. 8.
" philippensis V Ar. 56.
" picata V Ar. 10.
" pileata V Ar. 36.
" pinnata V Ar. 49.
" poecilоptila V Ar. 48.
Ardea pondiceriana V Cic. 15.
" prasinoscelis V Ar. 33.
" purpurea V Ar. 8.
" pusilla V Ar. 39.
" ralloides V Ar. 32.
" rectirostris V Ar. 3.
" robusta V Ar. 3.
" rufa V Ar. 21.
" rufescens V Ar. 21.
" russata V Ar. 30, 31.
" sacra V Ar. 25.
" scapularis V Ar. 42, 44.
" schistacea V Ar. 23.
" scolopacea V Ra. 7.
" semirufa V Ar. 35.
" sibilatrix V Ar. 36.
" sinensis V Ar. 40.
" speciosa V Ar. 34.
" stellaris V Ar. 47.
" " capensis V Ar. 48.
" sturmii V Ar. 45.
" sumatrana V Ar. 3.
" tigrina V Ar. 52.
" typhon V Ar. 3.
" undulata V Ar. 56.
" veranyi V Ar. 31.
" violacea V Ar. 61.
" virescens V Ar. 41.
" xanthodactyla V Ar. 12.
Ardeae V Ar. 1.
Ardeiralla gutturalis V Ar. 45.
ardens (Oriolus) I Cor. 115.
" (Psarolophus) I Cor. 115.
ardeoides (Rallus) V Ra. 7.
Ardeola cinnamomea V Ar. 40.
" dromas VI Ster. 41.
" erythromelas V Ar. 39.
" exilis V Ar. 39.
" leucoptera V Ar. 35.
" minuta V Ar. 37.
" podiceps V Ar. 39.
" pusilla V Ar. 39.
" sinensis V Ar. 40.
Ardeomega goliath V Ar. 3.
" nobilis " " 3.
ardesiaca (Ardea) V Ar. 10.
" (Fulica) V Ra. 63.
" (Herodias) V Ar. 10.
" (Lophocitta) I Cor. 66.
" (Lysea) V Ra. 63.
ardesiacus (Hypomorphnus) II Asc. 9.
Ardetta australis V Ar. 46.
" bilineata " " 46.
" flavicollis " " 46.
" gouldi V. Ar. 46.
" gutturalis V Ar. 45.
" macrorhyncha V Ar. 44.
" stagnatilis V Ar. 43.
" sturmii V Ar. 45.
ardosiaca (Gallinula) V Ra. 48.
ardosiacus (Falco) II Fal. 21, 25; II Acc. 38.
arenaria (Calidris) V Sc. 55.
" grisea V. Sc. 55.

arenaria (Tringa) V Sc. 55.
" vulgaris " " 55.
Argala V Cic. 13.
" (Ardea) V Cic. 12, 13.
" (Ciconia) " " 12.
" crumenifera V Cic. 12.
" dubia " " 13.
" javanica " " 13.
" (Leptopilos) " " 13.
" (Mycteria) " " 13.
argentaceus (Larus) VI L. 16.
argentata (Sterna) VI Ster. 15.
argentatoides (Larus) VI L. 16.
argentatus (Larus) VI L. 15, 16.
argentea (Sterna) VI Ster. 23.
argentina (Ephialtes) II Oti. 21.
arguta (Strepera) I Cor. 123.
argutus (Cracticus) I Cor. 123.
ariel (Attagen) VI Pe. 3.
" (Prion) VI Proc. 18.
" (Procellaria) VI Proc. 18.
Aristonetta valisneriana VI A. 25.
armata (Biziura) VI A. 12.
" (Merganetta) VI A. 12.
" (Pluvialis senegalensis) IV Cur. 61.
armatus (Charadrius) " " 62.
armiger (Falco) II Ass. 5.
armillaris (Bucco) I Bucc. 21, 22.
" (Columba) IV Col. 163.
" (Megalaima) I Bucc. 22.
armillata (Fulica) V Ra. 63
armillatus (Cyanocorax) I Cor. 48.
aromatica (Columba) IV Col. 52, 53, 57.
" (Treron) IV Col. 52.
Arquata V Sc. 86.
arquata (Numenius) V Sc. 85.
" (Scolopax) " " 85.
Arquatella maritima " " 30.
" (Tringa) " " 30.
arquatricula (Stictoenas) IV Col. 72.
arquatrix (Columba) " " 72.
" (Stictoenas) " " 72.
arra (Alca) VI U. 16.
" (Cephus) VI U. 16.
" (Uria) " " 16.
aruensis (Eclectus personatus) III P. 43; III P. R. 18.
" (Noctua) II Noc. 31.
" (Psittacula diophthalma) III P. R. 33.
" (Psittacus) III P. 43.
arvensis (Anser) VI A. 112.
ascalaphus (Bubo) II Oti. 8; II Noc. 4.
" (Otus) " " 8.
" (Strix) " " 8.
ashæ (Ardea) V Ar. 25.
asiatica (Alcedo) III Al. R. 5.
" (Cyanops) I Bucc. 17.
" (Megalaima) I Bucc. 16.
asiaticus (Buteo) II Acc. 107.
" (Charadrius) IV Cur. 38, 39.
" (Cursorius) " " 13.
" (Ilians) V Cic. 15.
asiaticus (Psittacus) III P. 132.
" (Scops zorca) II Oti. 20; II Noc. 14.
" (Trogon) I Bucc. 16.
Asio brasiliensis II Oti. 21.
" (Scops) " " 26; II Noc. 9.
" (Strix) " " 26.
assimilis (Anas) VI A. 59.
" (Carpophaga) IV Col. 38.
" (Circus) II Cir. 9; II Acc. 50, 51.
" (Cuculus) I Cuc. 23.
" (Megaloprepia) IV Col. 38.
" (Megapodius) VIII Ti. 58.
" (Nothura) " " 20.
" (Ptilopus) IV Col. 38.
" (Puffinus) VI Proc. 31.
Astrapia gularis I Cor. 94.
" nigra " " 94.
Astur II Ass. 15; II Acc. 61.
Astur apoxypterus II Ass. 15.
" approximans II Acc. 79; II Ass. 42.
" atricapillus II Ass. 17; II Acc 61.
" cachinnans " " 26; " " 68.
" cooperi " " 18, 31, 35.
" cruentus " " 40; II Acc. 80, 91.
" fasciatus " " 79.
" griseiceps II Ass. 23; " " 66.
" griseogularis " " 80.
" guianensis II Ass. 25; " " 67.
" gundlachii " " 73.
" harpyia II Ass. 25; " " 67.
" henicogrammus " " 80.
" henstii " " 62.
" hypoxanthus II Ass. 16.
" longicauda II Acc. 132.
" macrocelides II Ass. 47.
" macrourus II Ass. 25; II Acc. 67.
" melanoleucos II Ass. 37.
" melanoleucus " " 15; II Acc. 74.
" mirandollei " " 27; " " 68.
" monogrammicus " " 24; " " 67.
" musicus " " 20; " " 65.
" novae hollandiae " " 20; " " 63.
" palumbarius " " 16; " " 61.
" pectoralis " " 18; " " 63.
" polyzonus " " 21; " " 65.
" radiatus " " 15, 42; " " 61, 79.
" secretarius " " 28; " " 68.
" sexfasciatus " " 35.
" smithii " " 15.
" spectabilis " " 27; II Acc. 68.
" torquatus " " 38.
" trinotatus " " 45.
" trivirgatus II Ass. 22, 23; II Acc. 65.
" " indicus II Ass. 22; II Acc. 65.
" unicinctus II Ase. 2.
Astures II Ass. 1; II Acc. 51.
Asturina albicollis II Ase. 9; II Acc. 103.
" albifrons II But. 10.
" anthracina II Ase. 8; II Acc. 103.
" cinerea II Acc. 100.
" coronata II Ase. 12; II Acc. 104.
" coronatus " " 12.
" ghiesbrechtii II Ase. 11; II Acc. 104.

Asturina gularis II Asc. 4; II Acc. 101.
" kuhli " " 12; " " 104.
" leucorrhoa " " 5; " " 102.
" magnirostris " " 3; " " 100.
" melanoleuca " " 5; " " 102.
" melanonota " " 10; " " 103.
" melanops " " 10; " " 104.
" meridionalis II But. 17.
" nattereri II Acc. 100.
" nitida II Asc. 1; II Acc. 100.
" plagiata " " 1; " " 100.
" pucherani " " 101.
" ruficauda " " 100.
" schistacea II Asc. 8; " " 103.
" scotoptera " " 11; " " 104.
" superciliaris " 12; " " 104.
" unicincta " " 2; " " 102.
" urubitinga " " 6; " " 103.
Asturinae II Asc. 1; II Asc. R. 100.
Atelornis pittoides I Cor. 138.
" squamigera I Cor. 138.
ater (Chalybaeus) " " 121.
" (Circus) II Cir. 3, 7.
" (Corvus) I Cor. 77.
" (Cuculus) I Bucc. 88.
" (Daptrius) II Pol. 7.
" (Epimachus) I Cor. 96.
" (Falco) II Mil. 2.
" (Haematopus) IV Cur. 76.
" (Ibicter) II Pol. 7; II Acc. 137.
" (Lorius) III P. 129; III P. R. 59.
" (Psittacus) III P. 129.
aterrima (Fulica) V Ra. 60.
" (Glaucopis) I Cor. 72.
" (Procellaria) VI Proc. 9.
" (Pterodroma) " " 9.
aterrimum (Microglossum) III P. 147; III P. R. 67.
aterrimus (Falco) II Pol. 7.
" (Ischnoscelis) II Ass. 53.
" (Psittacus) III P. 149, 151.
Athene boobook II Str. 38.
" borneoensis " " 25.
" brama " " 29.
" castanoptera " " 34.
" castanotus " " 34.
" connivens " " 39.
" cuculoides " " 33.
" cunicularia " " 30; II Noc. 27.
" dominicensis " " 30; " " 27.
" ferruginea " " 30.
" florensis II Noc. 23.
" fortis II Str. 39.
" frontalis " " 8.
" fusca II Noc. 27.
" guteruhi II Str. 26.
" havanensis " " 32.
" hirsuta " " 25.
" hypugaea " " 30; II Noc. 27.
" hypogramma II Noc. 25.
" infuscata II Str. 31.
" japonica " " 25.
" licua " " 36.
Athene maculata II Str. 39.
" minutissima " " 32.
" nana " " 31.
" noctua " " 28.
" novaezeelandiae " 38.
" passerina " " 41.
" punctulata " " 29.
" radiata " " 34.
" rufa " " 40.
" rufostrigata II Noc. 31.
" scutellata II Str. 25.
" squamipila " " 27.
" strenua " " 40.
" sylvatica " " 36
" woodfordtii " " 12.
atheniensis (Bubo) II Oti 7.
athertoni (Merops) III Me. 12.
" (Nyctiornis) " " 12.
athertonii (Bucia) " " 12.
atlantica (Procellaria) VI Proc. 8.
" (Pterodroma) " " 8.
" (Symphemia) V Sc. 76.
atra (Anas) VI A. 18.
" (Ardea) V Ar. 25.
" (Fulica) V Ra. 60, 63.
" (Monasa) I Bucc. 88.
" (Paradisea) I Cor. 96.
" (Phonygama) I Cor. 121.
atrata (Anas) VI A. 80.
" (Chenopis) VI A. 80.
" (Parra) V Ra. 67.
atratus brasiliensis (Cathartes) II Vul. 3; II Acc. 139.
" (Buceros) I Buc. 18.
" (Cathartes) II Vul. 2; II Acc. 139.
" (Cygnus) VI A. 80.
" (Vultur) II Vul. 2.
atricapilla (Alcedo) III Al. 27.
" (Anas) VI A. 32.
" (Ardea) V Ar. 42.
" (Butorides) V Ar. 42.
" (Domicella) III P. 120.
" (Macropygia) IV Col. 111.
" moluccensis (Merula viridis) III Pit. 3.
" (Pitta) III Pit. 2, 3, 4; III Pit. R. 5.
" (Rhynchaea) V Sc. 18.
" sanghirana (Pitta) III Pit. R. 5.
" (Strix) II Oti. 21.
" (Tringa) V Sc. 18.
atricapillus (Astur) II Ass. 17; II Acc. 61.
" (Brachyurus) III Pit 2.
" (Corvus) I Cor. 59.
" (Crypturus) VIII Ti. 34.
" (Falco) II Ass. 14, 17.
" (Garrulus) I Cor. 59.
" (Numenius) V Sc. 93.
" (Spizaetus) II Ass. 14.
" (Spizastur) " " 14.
atricilla (Anas) VI A. 29.
" catesbyi VI L. 44.
" (Larus) " " 44.

Atricilla macroptera VI L. 44.
" megaloptera " " 44.
" microptera " " 44.
" minor " " 44.
atricollis (Ardea) V Ar. 6.
" (Parra) V Ra. 70.
atrigularis (Charadrius) IV Cur. 68.
" (Colius) I Cuc. 81.
atroflava (Megalaima) I Bucc. 42.
atroflavus (Bucco) " " 42.
atropterus (Himantopus) V Sc. 105.
Attagen aquilus VI Pe. 2.
" ariel " " 3.
aucklandicus (Platycercus) III P. 105.
audax (Aquila) II Aq. 10; II Acc. 116.
" (Vultur) " " 10.
audouini (Gavina) VI L. 22.
" (Larus) " " 22.
auduboni (Fulmarus) VI Proc. 21.
" (Hemipalama) V Sc. 54.
" (Tringa) " " 54.
augur (Buteo) II But. 16; II Acc. 110.
" (Falco) " " 16.
augusta (Chalcophaps) IV Col. 145.
" (Amazona) III P. R. 26.
augustae (Aratinga carolinae) III P. 17.
augustus (Amazona) " " 50.
" (Psittacus) " " 50.
aura (Cathartes) II Vul. 2; II Acc. 139.
" (Vultur) " " 3.
aurantia (Euphema) III P. 104.
" (Sterna) VI Ster. 15.
auranticollis (Ptilinopus) IV Col. 18.
" (Ptilopus) " " 18.
" (Capito) I Bucc. 60.
" (Eubucco) " " 60.
aurantiifrons (Loriculus) III P. R. 62.
aurantiiventris (Ptilopus) IV Col. 11.
aurantius (Falco) II Fal. 24; II Acc. 40.
" (Psittacus) III P. 51.
auratus (Bucco) I Bucc. 55.
" (Capito) " " 55.
" (Charadrius) IV Cur. 49.
" (Cuculus) I Cuc. 31.
" orientalis (Charadrius) IV Cur. 50.
" (Oriolus) I Cor. 101.
aurea (Anas viridi-) VI A. 73.
" (Paradisea) I Cor. 92, 98.
" (Pluvialis) IV Cur. 49.
aureus (Conurus) III P. 19; III P. R. 5.
" (Micropogon) I Bucc. 55.
" (Oriolus) I Cor. 101.
" (Psittacus) III P. 19
" (Sericulus) I Cor. 98.
auricapillus (Conurus) III P. 18.
auriceps (Conurus) " " 106.
" (Euphema) " " 106; IIIP.R.42.
" (Platycercus) " " 106.
" (Psittacus) " " 106.
auricollis (Ara) " " 7.
" (Arara) " " 7; III P.R. 2.
auriculata (Zenaida) IV Col. 141.
auricularis (Columba) " " 65.
auricularis (Otogyps) II Vul. 9.
" (Vultur) " " 9; IIAcc.141.
aurifrons (Aratinga) III P. 18.
" (Brotogeris) " " 28.
" (Bucco) I Bucc. 23.
" (Capito) " " 55.
" (Conurus) III P.15,29; IIIP.R.4.
" (Myiopsitta) III P. 15.
auripalliata (Amazona) " " 52; III P. R. 27.
aurita (Anas) VI A. 75.
" (Comatotis) IV Cur. 10.
" (Otis) " " 10.
" (Zenaida) IV Col. 140.
auritorques (Ara) III P. 7.
auritus (Colymbus) VI U. 36, 40.
" (Nettapus) VI A. 75.
" (Otodytes) VI U 40.
" (Podiceps) " " 40.
" (Proctopus) " " 40.
" (Turtur) IV Col. 116.
aurora (Psittacus) III P. 55.
aurovirens (Bucco) I Bucc. 58.
" (Capito) " " 58.
australasia (Alcedo) III Al. 35.
australasiae (Alcedo) III Al. R. 30.
australasiana (Grus) V Ra. 3.
" (Laomedontia) V Ra. 3.
" (Otis) IV Cur. 9.
australasianus (Haematopus) " " 73.
" (Haematopus niger) " " 75.
australis (Actodromus) V Sc. 43.
" (Apteryx) IV St. 7.
" (Ardea flavicollis) V Ar. 46.
" (Ardea minuta) " " 39.
" (Ardetta) " " 46.
" (Biziura) VI A. 11.
" (Botaurus) V Ar. 48.
" (Bucco) I Bucc. 28, 29.
" (Choriotis) IV Cur. 9.
" (Casuarius) IV St. 9.
" (Ciconia) V Cic. 6.
" (Columba) IV Col. 48.
" (Corcorax) I Cor. 56.
" (Corvus) I Cor. 18; I Bucc. 88.
" (Erismatura) VI A. 11.
" (Eudynamis) I Cuc. 20.
" (Eudromias) VI Cur. 47.
" (Falco) II Fal. 35; II Pol. 3.
" (Fulica) V Ra. 62.
" (Fuligula) VI A. 30.
" (Gallinago) V Sc. 10.
" (Glareola) IV Cur. 18.
" (Limosa) V Sc. 22.
" (Megalaima) I Bucc. 29.
" (Milvago) II Pol. 3.
" (Morinellus) IV Cur. 47.
" (Mycteria) V Cic. 6.
" (Nanodes) III P. 114; III P.R.53.
" (Numenius) V Sc. 90.
" (Nyroca) VI A. 30.
" (Ocydromus) V Ra. 73.
" (Otis) IV Cur. 9.

australis (Oxyura) VI A. 11.
" (Phalaropus) V Sc. 58.
" (Podiceps) VI U. 34.
" (Polyborus) II Pol. 3; II Acc. 137.
" (Psittacus) III P. 114, 156.
" (Rallus) V Ra. 73.
" (Rhynchaea) V Sc. 17
" (Schoeniclus) " " 38.
" (Scolopax) " " 10.
" (Sphecotheres) I Cor. 115.
" (Squatarola) IV Cur. 54.
" (Sternula) VI Ster. 21.
" (Sula) VI Pe. 38.
" (Treron) IV. Col. 48.
" (Vinago) " " 47, 48.
" (Xenorhynchus) V Cic. 6.
austriaca (Glareola) IV Cur. 15.
autumnalis (Amazona) III P. 51; III P. R. 26.
" (Anas) VI A. 92.
" (Dendrocygna) VI A. 92.
" (Psittacus) III P. 51.
Aves columbae IV Col. 1.
" struthiones IV St. 1.
Avicida buteoides II Per. 6.
" cuculoides " " 6.
" sumatrensis " " 5; II Acc. 135.
" verreauxii " " 6.
Avis hornotina I Cor. 133.
avocetta (Recurvirostra) V Sc. 103.
Awsuree VI A. 89.
" (Anas) " " 89.
axillaris (Elanus) II Mil. 7, 8; II Acc. 130.
" (Falco) " " 8.
" (Monasa) I Bucc. 89.
" (Osmotreron) IV Col. 52, 53.
" (Treron) " " 52.
aymara (Arara) III P. 16.
" (Conurus) " " 16; III P. R. 4.
" (Metriopelia) IV Col. 153.
Aythyia americana VI A. 24.
" capensis " " 31.
" ferina " " 23.
" valisneriana " " 25.
azarae (Anas) " " 59.
" (Charadrius) IV Cur. 37.
" (Dominicanus) VI L. 13.
aztec (Conurus) III P 21; III P. R. 6.
azulato (Ynambu) VIII Ti. 23.
azurea (Alcedo) III Al. 17; III Al. R. 9.
" (Alcyone) " " 17.
" (Halcyone) " " 17.
azureus (Corvus) I Cor. 46.
" (Cyanocorax) " " 46.
" (Eurystomus) " " 141.
" (Lathamus) III P. 103.
" (Psittacus) " " 73.

B.

babylonicus (Falco) II Fal. 15; II Acc. 35.
bacha (Circaëtus) II But. 26; " " 113.
" celebensis (Circaëtus) II But. 27; II Acc. 114.
acha (Falco) II But. 26.
bachmannii (Haematopus) IV Cur. 76.
bachus (Buphus) V Ar. 33.
bactriana (Pica) I Cor. 39.
badia (Carpophaga) IV Col. 96.
" (Dacelo) III Al. 28; III Al. R. 19.
" (Strix) II Str. 23; II Noc. 17.
" (Ulula) " " 23; " " 17.
badiceps (Psittacus) III P. 63.
badius (Coccyzus) I Cuc. 52.
" (Falco) II Ass 48.
" (Halcyon) III Al. 28.
" (Merops) III Me. 3.
" (Micronisus) II Ass. 48.
" (Nisus) " " 48; 2 Acc. 92.
" (Phodilus) II Str. 23.
bahamensis (Anas) VI A. 55.
" (Dafila) " " 55.
" (Momotus) III Mo. 3.
" (Poëcilonetta) VI A. 55.
" (Prionites) III Mo. 3.
bailloni (Gallinula) V Ra. 30.
" (Puffinus nugax) VI Proc. 30.
bairdii (Actodromas) V Sc. 39.
" (Buteo) II Acc. 107.
bakkamuna (Strix) II Noc. 16.
balearica (Grus) V Ra. 7.
" pavonina " " 7.
balthica (Alca) VI U. 13.
" (Uria) " " 18.
balthicus (Haematopus) IV Cur. 70.
balticus (Colymbus) VI U. 31.
bangkana (Pitta) III Pit. 3; III Pit. R. 5.
banksi (Prion) VI Proc. 17.
banksianus fulgidus (Psittacus) III P. 157.
banksii (Calyptorhynchus) III P. 153; III P. R. 69.
" (Procellaria) VI Proc. 17.
" (Psittacus) III P. 152, 153.
Barbacou à bec rouge I Bucc. 88.
" à croupion blanc I Bucc. 91.
" écaudé " " 91.
barbarus (Falco) II Fal. 5; II Acc. 34.
barbata (Strix) II Str. 9.
barbatula (Bucco) I Bucc. 40.
" duchaillui " " 39.
" flavimentum " " 44.
" flavisquamata " " 47.
" formosa " " 39.
" fuliginosa " " 41.
" leucolaima " " 46.
" minuta " " 40.
" subsulfurea " " 44.
barbatulus (Psittacus) III P. 84.
barbatus (Buteo) II Acc. 111.
" (Conurus coeruleo-) III P. 94.
" (Gypaëtus) II Vul 10; II Acc. 141.
" meridionalis (Gypaëtus) II Vul. 10; II Acc. 141.
" (Psittacus) III P. 85.
" (Vultur) II Vul. 10.
barbet (Buff-faced) I Bucc. 74.
" (Red-crowned) " " 26.
" (Wax-billed) " " 88.

barbet (White-breasted) I Bucc. 85.
„ (Yellow-checked) „ „ 34.
Barbican „ „ 1.
Barbican à gorge noire „ „ 7.
„ unibec „ „ 3.
barbichon (Barbu) „ „ 26.
barbiculus (Bucco) „ „ 26, 27.
Barbion „ „ 40.
Barbu à centuron rouge „ „ 24.
„ à collier de Cayenne „ „ 76.
„ à collier rouge „ „ 24.
„ à dos rouge „ „ 42.
„ à front d'or „ „ 23.
„ à gorge bleue „ „ 16.
„ à gros bec de Cayenne „ „ 76.
„ à plastron noir „ „ 4, 17.
„ à plastron rouge „ „ 24.
„ à poitrine noire de Cayenne I Bucc. 78.
„ à ventre tacheté de Cayenne „ „ 79.
„ barbichon „ „ 26.
„ de l'île de Luçon „ „ 7.
„ de Cayenne „ „ 53.
„ de Guyane „ „ 53.
„ de la Guyane I Bucc. 53, 55.
„ de la Chine (Grand) I Bucc. 13.
„ de Mahé „ „ 32.
„ de Maynas „ „ 63.
„ de St. Domingue „ „ 53.
„ des Philippines „ „ 24.
„ élégant „ „ 63.
„ kotorea I Bucc. 19, 34.
„ orangé de Pérou „ „ 55.
„ oranvert „ „ 58.
„ (Petit) „ „ 24.
„ rose gorge „ „ 27.
„ rubicon „ „ 6.
Barita anaphonensis I Cor. 123.
„ gymnocephala „ „ 130.
„ personata „ „ 127.
„ quoyi „ „ 124.
„ tibicen „ „ 125.
„ varia „ „ 127.
barnabyi (Megapodius) VIII Ti. 64.
barnardi (Platycercus) III P. 94; III P.R. 39.
baroli (Puffinus) VI Proc. 28.
barrabandi (Amazona) III P. 65; III P.R. 30.
„ (Palaeornis) III P. 98.
„ (Psittacus) „ „ 65, 98.
barroti (Phoenicophaeus) I Cuc. 51.
barrowii (Clangula) VI A. 21.
„ (Otis) IV Cur. 5.
bartlettii (Paradisea) I Cor. 82.
bartramia (Euliga) V Sc. 79.
„ longicauda V Sc. 79.
„ (Tringa) „ „ 78, 79.
bartramius (Actitis) „ „ 78.
„ (Actiturus) „ „ 78.
„ (Totanus) „ „ 78.
„ (Tringoides) „ „ 59.
baruffii (Oriolus) I Cor. 109.
Baryphonus cyanogaster III Mo. 6.
„ ruficapillus „ „ 5.
basalis (Cuculus) I Cuc. 33.
basilica (Carpophaga) IV Col. 96.
basilis (Columba) „ „ 96.
„ (Ducula) „ „ 96.
bassana (Sula) VI Pe. 37.
bassanus (Dysporus) VI Pe. 37.
„ (Pelecanus) „ „ 37.
batavica (Psittacus) III P. 69.
Bateleur II But. 28; II Aq. 1.
bathyrhynchus (Larus) VI L. 8.
batilda (Omeotreron) IV Col. 35.
baueri (Platycercus) III P. 94.
„ (Psittacus) „ „ 94.
baudii (Pitta) III Pit. 5; III Pit. R. 9.
baudini (Calyptorhynchus) III P. 155; III P. R. 70.
Baza II Per. 3; II Acc. 133.
Baza celebensis „ „ 133, 135.
„ crassirostris „ „ 135.
„ cuculoides II Per. 6; II Acc. 133.
„ lophotes „ „ 4; „ „ 133.
„ madagascariensis „ „ 136.
„ magnirostris II Per. 5; II Acc. 133, 135.
„ reinwardtii „ „ 5; „ „ 133, 135.
„ rufa „ „ 133.
„ stenozoma II Per. 5; „ „ 133.
„ subcristata „ „ 4; „ „ 135.
beaudouini (Circaëtus) II But. 25; II Acc. 112.
Bécassine des Savannes V Sc. 8.
beachii (Cyanocitta) I Cor. 44.
beecheyi (Cyanocorax) „ „ 44.
„ (Pica) „ „ 44.
belcheri (Larus) VI L. 9.
„ (Leucophaeus) VI L. 9.
belgica (Scolopax) V Sc. 19.
bellicosus (Falco) II Ass. 5.
„ (Spizaetus) II Ass. 5; II Acc. 59.
bellonii (Tadorna) VI A. 67.
bellus (Cyanocorax) I Cor. 50.
„ (Porphyrio) V Ra. 58.
Belonopterus cayennensis IV Cur. 57.
bengalensis (Alcedo) III Al. 7; III Al. R. 3.
„ (Brachyurus) III Pit. 12.
„ (Bubo) II Oti. 8; II Noc. 4.
„ (Centrococcyx) I Cuc. 68.
„ (Coracias) I Cor. 135.
„ (Corvus) III Pit. 12.
„ (Falcinellus) V I. 3.
„ (Falco) II Fal. 33; II Acc. 47.
„ (Falco coerulescens) II Fal. 33; II Acc. 47.
„ (Ispida) III Al. 7.
„ minor (Alcedo) III Al. 7.
„ minor (Ispida) „ „ 7.
„ (Oriolus) I Cor. 106.
„ (Otis) IV Cur. 10.
„ (Otus) II Oti. 8.
„ (Palaeornis) III P. 81.
„ (Pitta) III Pit. 12; III Pit. R. 15.
„ (Rallus) V Sc. 16.
„ (Sterna) VI Ster. 6.
„ (Syphestis) IV Cur. 10.
„ (Vultur) II Vul. 8; II Acc. 140.
bennettii (Casuarius) IV St. 11.

berardi (Halodroma) VI Proc. 37, 38.
" (Pelecanoides) " " 38.
Berenicornis comatus I Buc. 8.
bergii (Pelecanopus) VI Ster. 7, 11.
" (Sterna) VI Ster. 5, 11.
berigora (Falco) II Fal. 36; II Acc. 47.
" (Ieracidea) II Fal. 36.
" occidentalis (Falco) II Fal. 36; II Acc. 47.
Bernaches VI A. 96.
bernicla (Anser) VI A. 103, 104.
" brenta " " 103.
" canadensis " " 105.
" chiloënsis " " 101.
" cyanoptera " " 96.
" dispar " " 99.
" hutchinsii " " 105.
" inornata " " 101, 102.
" leucopsis " " 104.
" melanoptera " " 100.
" nigricans " " 103.
" ruficollis " " 102.
" sandwichensis " " 106.
bernieri (Querquedula) " " 60.
" (Rougetius) V Ra. 13.
bernsteini (Eos) III P. 124.
" (Megapodius) VIII Ti. 63.
" (Psittacus) III P. 124.
bernsteinii (Carpophaga) IV Col. 40.
" (Ptilopus)] " " 40.
" (Sterna) VI Ster. 9.
beryllina (Alcedo) III Al. 11; III Al. R. 6.
beskii (Falco) II Ass. 19, 30.
bewickii (Cygnus) VI A. 82.
biarmicus (Falco) II Fal. 16; II Acc. 36.
bicarunculatus (Casuarius) IV St. 10.
bicincta (Hiaticula) IV Cur. 37.
" (Ispida) III Al. 2.
" (Osmotreron) IV Col. 51.
" (Tamatia) I Bucc. 81.
" (Treron) IV Col. 51.
" (Trygon) " " 51.
" (Vinago) " " 51.
bicinctus (Bucco) I Bucc. 81.
" (Charadrius) IV Cur. 37.
" (Cursorius) " " 11.
" (Rhinoptilus) " " 11.
biclavata (Ciconia) V Cic. 9.
" (Scolopax) V Sc. 13.
bicolor (Accipiter) II Acc. 72.
" (Alcedo) III Al. 5.
" (Anas) VI A. 76, 87.
" (Carpophaga) IV Col. 98.
" (Centropus) I Cuc. 73.
" (Columba) IV Col. 98.
" (Corydonix) I Cuc. 64.
" (Ichthyaëtus) II Aq. 17.
" (Merops) III Me. 7.
" (Nisus) II Acc. 71.
" (Oriolus) I Cor. 101.
" (Pyrrhocentor) I Cuc. 73.
" (Rallus) V Ra. 8.
" (Tympanistria) IV Col. 143.
bicornis (Buceros) I Buc. 3.
" (Podiceps) VI U. 38.
bicristatus (Carbo) VI Pe. 17.
" (Urile) " " 17.
bicuspis (Sterna) VI Ster. 19.
Bidens albiventer II Fal. 35.
" cinerascens " " 34.
" femoralis " " 34.
" rufiventer " " 35.
bidentatus (Bucco) I Bucc. 3.
" (Falco) II Fal. 35; II Acc. 47.
" (Pogonorhynchus) I Bucc. 3.
bido (Falco) II But. 26.
Biensis madagascariensis V Ra. 10.
" typicus " " 10.
bifasciata (Aquila) II Aq. 3, 6.
" (Aquila mogilnik) II Aq. 3; II Acc. 115.
bifrenatus (Pogonias) I Bucc. 10.
Bihoreaux V Ar. 56.
bilineata (Ardea) V Ar. 45.
" (Ardetta) " " 46.
" (Megalaema) I Bucc. 43.
" (Megalaima) " " 43.
biloba (Lobipluvia) IV Cur. 64.
bilobus (Charadrius) " " 64.
" (Lobivanellus) " " 64.
" (Sarciophorus) " " 64.
bilophus (Graculus) VI Pe. 22.
bimaculata (Anas) VI A. 54.
" (Eunetta) " " 54.
" (Oidemia) " " 17.
" (Pelionetta) " " 17.
bimaculatus (Tinamus) VIII Ti. 29.
binotatus (Falco) II Ass. 34.
biru (Alcedo) III Al. 11.
bisetis (Nymphicus) III P. 95.
bispecularis (Garrulus) I Cor. 60.
bistriatus (Burhinus) IV Cur. 18.
" (Oedicnemus) " " 19.
bitorquata (Columba) IV Col. 121.
" (Ispida) III Al. 2.
" (Tamatia) I Bucc. 81.
bitorquatus (Charadrius) IV Cur. 24.
" (Psittacus) III P. 81.
" (Turtur) IV Col. 121.
Biziura VI A. 7.
" armata VI A. 12.
" australis " " 11.
" dominica " " 9.
" ferruginea " " 10.
" leucocephala " " 11.
" leuconota " " 8.
" lobata " " 7.
" maccao " " 10.
" novae hollandiae " " 7.
" rubida " " 11.
Blagre II Aq. 14.
Blanchard II Ass. 3.
Blasipus crassirostris VI L. 8.
blythii (Phoenicopterus) VI A. 116.
" (Psittacula) III P. R. 32.
boeckii (Rufirallus) V Ra. 17.

bonapartei (Actodromas) V Sc. 42.
" (Gymnobucco) I Bucc. 51.
" (Heteropygia) V Sc. 42.
" (Larus) VI L. 41.
" (Megalaima) I Bucc. 51.
" (Tringa) V Sc. 42.
Bondrée II But. 5.
Bondrées II Per. 1.
Bondrées-coucous " " 3.
bonelli (Falco) II Aq. 9.
bonnellii (Aquila) II Aq. 9; II Acc. 116.
boobook (Athene) II Str. 38.
" (Noctua) " " 38; II Noc. 26.
boraquira (Nothura) VIII Ti. 44.
" (Tinamus) " " 44.
borbonicus (Didus) IV St. 3.
borealis (Aphriza) IV Cur. 45.
" (Buteo) II But. 8; II Acc. 107.
" (Colymbus) VI U. 32.
" (Falco) II But. 8.
" (Laroides) VI L. 15.
" (Larus) " " 15, 16.
" (Numenius) V Sc. 100, 101.
" (Rhynchops) VI Ster. 39.
" (Scolopax) V Sc. 100, 101.
" (Tringa) IV Cur. 45.
bornea (Eos) III P. 128.
borneensis (Cacomantis) I Cuc. 21.
" (Centropus) " " 66.
bornensis (Buceros rhinoceros) I Buc. 5.
borneoënsis (Athene) II Str. 25.
" (Buceros rhinoceros) I Buc. 4.
" (Chalcophaps) IV Col. 145.
" (Noctua hirsuta) II Str. 25; II Noc. 24.
" (Spizaetus) II Ass. 10.
borneus (Lorius) III P. 128.
" (Palaeornis) " " 85.
" (Psittacus) " " 123.
boschas (Anas) VI A. 40.
boschii (Falco) II Fal. 23; II Acc. 39.
" (Pitta) III Pit. 14.
bostrichia carunculata V I. 10.
Botaurus australis V Ar. 48.
" freti hudsonis " " 49.
" heliosylos " " 51.
" leucolophus " " 50.
" limnophylax " " 55.
" melanotus " " 48.
" minor " " 49.
" pinnatus " " 49.
" stellaris " " 47.
" undulatus " " 56.
bottae (Saurothera) I Cuc. 40.
boucardi (Crypturus) VIII Ti. 26.
" (Tinamus) " " 26.
bourcierii (Capito) I Bucc. 58.
" (Micropogon) " " 58.
bourkii (Euphema) III P. 102; III P.R. 41.
Bouron swanghi V Sc. 100.
boysii (Sterna) VI Ster. 5.
braccata (Aquila) II But. 12.
" (Harpyia) II Ass. 2.
braccatus (Spizaetus) II Ass. 2; II Acc. 59.
brachydactyla (Aquila) II But. 23.
brachydactylus (Accipiter) II Acc. 94.
Brachyotus cassinii II Oti. 3.
" galopagoensis " " 3.
" (Otus) II Oti. 3; II Noc. 3.
" palustris " " 3.
" (Strix) " " 3.
Brachypetes tenebrosa I Bucc. 91.
brachyptera (Anas) VI A. 13.
" (Leptopila) IV Col. 160.
" (Piaya) I Cuc. 59.
" (Uria) VI U. 21.
Brachypteracias I Cor. 138.
" pittoides " " 138.
" squamigera " " 138.
brachypterus (Buteo) II Acc. 108.
" (Circaëtus) II Ass. 52.
" (Falco) " " 52.
" (Gallirallus) V Ra. 73.
" (Herpetotheres) II Ass. 52.
" (Micrastur) " " 52.
" (Nisus) II Ass. 52; II Acc. 99.
" (Ocydromus) V Ra. 73.
brachypus (Rallus) V Ra. 12.
" (Sterna) VI Ster. 16.
brachyrhynchos (Anser) VI A. 112.
brachyrhynchus (Garrulus) I Cor. 65.
" (Larus) VI L. 22, 30.
" (Oriolus) I Cor. 108
brachytarsa (Pagophila) VI L. 6.
brachyura (Amazona) III P. 66; III P.R. 30.
" (Diomedea) VI Proc. 32, 33.
" (Pitta) III Pit. 11, 12; III Pit. R. 14.
Brachyurus atricapillus III Pit. 2.
" bengalensis " " 12.
" (Corvus) " " 11.
" forsteni " " 4.
" mülleri " " 3.
" nipalensis " " 2.
" (Psittacus) III P. 66.
" venustus III Pit. 13.
" vigorsii " " 10.
brag (Ardea) V Ar. 5
brama (Athene) II Str. 29.
" (Noctua) " " 29; II Noc. 27.
" (Strix) " " 29.
brandtii (Garrulus) I Cor. 59.
brasilianus gracilis (Graculus) VI Pe. 22.
" (Graculus) " " 22.
brasiliense (Tigrisoma) V Ar. 52.
brasiliensis (Amazona) III P. 57; III P. R. 28.
" (Anas) VI A. 61.
" (Aptenodytes) VI U. 11.
" (Ara) III P. 3.
" (Ardea) V Ar. 49, 52.
" (Asio) II Oti. 21.
" (Cathartes) II Vul. 3.
" (Cathartes atratus) II Vul. 3; II Acc. 139.
" cristatus Cuculus) I Cuc. 43.

brasiliensis (Falco) II Pol. 2.
" (Haematopus) IV Cur. 74.
" (Himantopus) V Sc. 107.
" (Ispida naevia) I Bucc. 84.
" (Leptopila) IV Col. 159.
" (Mergus) VI A. 6.
" (Momotus) III Mo. 2.
" (Noctua) II Str. 31.
" (Otus) II Oti. 21.
" (Parra) V Ra. 65.
" (Perdix) VIII Ti. 13.
" (Polyborus) II Pol. 2; II Acc. 137.
" (Psittacus) III P. 57.
" (Querquedula) VI A. 61.
" (Scolopax) V Sc. 9.
" (Scops) II Oti. 21; II Noc. 11.
" (Sula) VI Pe. 41.
" (Tinamus) VIII Ti. 10, 13.
" (Vultur) II Vul. 3.
brehmi (Scolopax) V Sc. 6.
brehmii (Psitacella) III P. R. 42.
" (Scolopax) V Sc. 4.
brenchleyi (Megapodius) VIII Ti. 65.
brenta (Anser) VI A. 103.
" (Bernicla) " " 103.
Brève de Malacca III Pit. 12.
" élégant " " 14.
" irène " " 11.
breviauris (Otus) II Oti. 4.
brevicaudus (Nectris) VI Proc. 27.
" (Puffinus) " " 27.
brevipennis (Anas) VI A. 8.
" (Corvus) I Cor. 22.
" (Leptopila) IV Col. 158.
brevipes (Batorides) V Ar. 42.
" (Gambetta) V Sc. 74.
" (Heteroscelis) " " 74.
" (Limosa) " " 21.
" (Nisus) II Acc. 92.
" (Totanus) V Sc. 74.
brevirostris (Actodromus minutus) V Sc. 49.
" (Anser) VI A. 111, 112.
" (Charadrius) IV Cur. 30.
" (Graculus) VI Pe. 16.
" (Haliaeus) " " 16.
" (Larus) VI L. 30.
" (Numenius) V Sc. 101.
" (Pelecanus) VI Pe. 30.
" (Phalacrocorax) VI Pe. 16.
" (Podilymbus) VI U. 47.
" (Pygoscelis) " " 4.
" (Rhynchops) VI Ster. 39.
" (Sterna) " " 15.
" (Tinamus) VIII Ti. 32.
" (Tringa) V Sc. 49, 55, 79.
bridgesi (Larus) VI L. 44.
broderipi (Oriolus) I Cor. 106.
brodiei (Noctua) II Str. 35; II Noc. 28.
broeckei (Pezophaps) IV St. 4.
bronzina (Aplopelia) IV Col. 161.
" (Columba) " " 161.
bronzinus (Cuculus) I Cuc. 26.
Brotogeris aurifrons III P. 28.
browni (Psittacus) " " 96.
brucei (Pogonias) I Bucc. 5.
bruchi (Larus zonorhynchus) VI L. 22
Bruchigavia corallina VI L. 36.
" gouldii " " 30.
" jamesonii " " 28.
" pomare " " 28.
bruchii (Anser) VI A. 109.
brunnea (Nyroca) VI A. 31.
brunneus (Falco) II Fal. 35.
brunnicephala (Xema) VI L. 35.
brunnicephalus (Larus) " " 35.
brunniceps (Xema) " " 35.
brünnichii (Uria) VI U. 16.
brutus (Nisus) II Acc. 95.
bruynii (Tallegallus) VIII Ti. 82.
Bubo II Oti 7; II Noc. 4.
Bubo abyssinicus " " 15.
" africanus " " 14.
" albescens " " 7.
" ascalaphus " " 8; II Noc. 4.
" atheniensis " " 7.
" bengalensis " " 8; II Noc. 4.
" caligatus " " 21.
" capensis II Oti. 9; " " 4.
" ceylonensis " " 19; " " 7.
" cinerascens " " 15; " " 5.
" coromandus " " 9; " " 4.
" cristatus " " 16; " " 6.
" fasciolatus " " 15; " " 6.
" flavipes " " 18; " " 7.
" gryscatus " " 16.
" javanensis " " 18; II Noc. 6
" ketupa " " 18.
" lacteus II Oti. 11; II Noc. 5; II Str. 19.
" leucosticticus II Oti. 16; II Noc. 6.
" leucotis " " 17; " " 6.
" maculosus " " 14; " " 5.
" maximus " " 7; " " 4.
" nipalensis " " 5.
" orientalis II Oti. 12; " " 5.
" " minor " " 13; " " 5.
" philippensis " " 14; " " 5.
" scandiaca " " 7.
" sibiricus " " 7.
" (Strix) " " 7.
" sultaneus " " 11.
" verreauxii " " 12.
" virginianus " " 10; II Noc. 4.
bubulcus (Ardea) V Ar. 31.
" coromandelensis " " 30.
" ibis " " 31.
" ruficrista " " 31.
Bubutus duvaucelii I Cuc. 52.
" isodori " " 52.
bucarius (Ichthyaëtus) II Aq. 17.
buccalis (Psittacus) III P. 15.
Buccanodon duchaillui I Bucc. 39.
buccinator (Buceros) I Buc. 17.
" (Cygnus) VI A. 83.
" (Olor) " " 83.
Bucco I Bucc. 75.

Bucco albifrons I Bucc. 89.
" armillaris " " 21, 22.
" atroflavus " " 42.
" auratus " " 55.
" aurifrons " " 23.
" aurovirens " " 58.
" australis " " 28, 29.
" barbatula " " 40.
" barbiculus " " 26, 27.
" bicinctus " " 81.
" bidentatus " " 3.
" caerulatus " " 16.
" caeruligula " " 17.
" calcaratus " " 88.
" calvus " " 49.
" caniceps " " 31, 32, 34, 36.
" capensis " " 76.
" cayanensis " " 53.
" cayenensis naevius I Bucc. 53.
" cayannensis " " 53.
" chacuru " " 82.
" chrysocomus " " 41.
" chrysoconus " " 41.
" chrysopogon " " 14.
" chrysoptera " " 40.
" chrysozonus " " 41.
" cinereus " " 88.
" collaris " " 76.
" corvinus " " 30.
" cyanocephalus " " 30.
" cyanops " " 16.
" cyanotis " " 28.
" dubius " " 13.
" duvaucelli " " 28.
" dysoni " " 77.
" elegans " " 63.
" erythrocephalus " " 53.
" erythronotus " " 42.
" faiostriatus " " 36.
" faiostrictus " " 36.
" flavicollis " " 24.
" flavifrons " " 23.
" flavigula " " 24.
" franklinii " " 20.
" frontalis " " 28.
" fuscescens " " 6.
" fuscicapillus " " 31.
" fuscus " " 85.
" giganteus " " 77.
" grandis " " 13.
" gularis " " 30.
" gutturalis " " 28.
" hayii " " 73.
" henrici " " 21.
" hyperrhynchus " " 77.
" igniceps " " 20.
" indicus " " 24.
" javensis " " 19.
" kotorea " " 19.
" lathami " " 73.
" leucocrissus " " 77.
" leucomelas " " 7.
" leuconotus " " 3.

Bucco leucops I Bucc. 89.
" leucorhynchus " " 32.
" levaillantii " " 3.
" lineatus " " 36.
" luteus " " 24.
" macrodactylus " " 81.
" macrorhynchos " " 76.
" macrorhynchus " " 76.
" maculatus " " 84.
" malabaricus " " 27.
" malaccensis " " 21.
" marginatus " " 67.
" maynanensis " " 63.
" melanoleucos " " 78.
" minutus " " 40.
" mystacophanos " " 18.
" nana " " 24.
" niger " " 7.
" nigrifrons " " 89.
" nigrithorax " " 4.
" nigro-maculatus " " 53.
" oorti " " 21.
" parvus " " 24, 40, 41
" peruvianus " " 55.
" philippensis " " 24, 27.
" picatus " " 78.
" pictus " " 63.
" pulmentum " " 80.
" pusillus " " 40.
" pyrolophus " " 37.
" quadricolor " " 18.
" radiatus " " 83.
" rafflesii " " 15.
" rafflesius " " 24.
" robustus " " 31.
" roseicollis " " 27.
" roseus " " 27.
" rubecula " " 87.
" rubricapillus " " 26.
" rubricollis " " 24.
" rubrifrons " " 40.
" ruficollis " " 81.
" rufifrons " " 7.
" saltii " " 5.
" scolopaceus " " 47.
" somnolentus " " 84.
" striatus " " 85.
" strigilatus " " 82.
" subsulphureus " " 44.
" subtectus " " 79.
" tamatia " " 79.
" tectus " " 78.
" torquatus " " 4, 24, 85.
" trimaculatus " " 28.
" tristis " " 19.
" variegatus " " 79.
" versicolor " " 15.
" virens " " 13.
" viridis " " 32, 34.
" zeylanicus " " 34, 36.
buccoides (Dacelo) III Al. 21.
" (Kitta) I Cor. 118.
" (Ptilorhynchus) " " 118.

Buccotrogon torquatus I Bucc. 37.
Bucephala albeola VI A. 22.
" americana " " 20.
" (Anas) " " 22.
" islandica " " 21.
Buceros albicristatus I Buc. 9.
" albirostris " " 6.
" anthracinus " " 7.
" atratus " " 18.
" bicornis " " 3.
" buccinator " " 17.
" carunculatus " " 19.
" " abyssinicus I Buc. 19.
" " cafer " " 20.
" " guincensis " " 20.
" cassidix I Buc. 9.
" cavatus " " 3.
" cineraceus " " 11.
" comatus " " 8.
" convexus " " 7.
" coronatus " " 6, 12.
" corrugatus " " 9.
" cristatus " " 16.
" cultratus " " 18.
" cylindricus " " 17.
" elatus " " 18.
" erythrorhynchus " " 14.
" exaratus " " 10.
" fasciatus " " 12.
" fistulator " " 16.
" flavirostris " " 14.
" galeatus " " 1.
" galeritus " " 8.
" gingalensis " " 12.
" ginginianus " " 11.
" griseus " " 11.
" hastatus " " 13.
" hydrocorax " " 2.
" leucostigma " " 16.
" limbatus " " 13.
" macrourus " " 9.
" malabaricus " " 6.
" malayanus " " 7.
" melanoleucus " " 12.
" monoceros " " 6.
" nagtglasii " " 16.
" nasica " " 13.
" nasutus " " 13.
" nipalensis " " 10.
" panayensis " " 11.
" pica " " 6.
" plicatus " " 2.
" poecilorhynchus " " 14.
" poënsis " " 18.
" pulchirostris " " 15.
" rhinoceroides " " 5.
" rhinoceros " " 3.
" " bornensis " " 5.
" " borneoensis I Buc. 4.
" " indica " " 6.
" " lunatus " " 5.
" " sumatranus " " 4.
" ruficollis " " 3.
Buceros scutatus I Buc. 1.
" semifasciatus " " 13.
" sublunatus " " 6.
" sulcatus " " 10.
" sulcirostris " " 11.
" violaceus " " 7.
Bucia athertonii III Me. 12.
Bucorax abyssinicus I Buc. 20.
buff-faced Barbet I Bucc. 74.
buffonii (Opaëthus) I Cuc. 76.
Bulaca monticola II Str. 19.
" newarensis II Noc. 21; II Str. 10.
bullaragang (Ardea) V Ar. 7.
bullockii (Cyanurus) I Cor. 43.
" (Merops) III Me. 8.
" (Pica) I Cor. 43.
bullockoides (Merops) III Me. 9.
bulweri (Procellaria) VI Proc. 9.
" (Thalassidroma) " " 9.
Bulweria columbina " " 9.
Buphus bachus V Ar. 33.
" comatus " " 32.
" leucopterus " " 35.
" sibilatrix " " 36.
" speciosus " " 34.
burchelli (Tachydromus) IV Cur. 13.
burchellii (Centropus) I Cuc. 72.
" (Corythaix) " " 75.
" (Cursorius) IV Cur. 13.
Burhinus bistriatus " " 18.
burka (Gallinago) V Sc. 4.
burmanica (Pelargopsis) III Al. R. 7.
burnesii (Gallinula) V Ra. 45.
burrovianus (Cathartes) II Vul. 4.
buruensis (Mimeta) I Cor. 113.
" (Oriolus) " " 113.
" (Philedon) " " 113.
" (Tropidorhynchus) I Cor. 113.
busa ellus (Falco) II But. 17.
buson (Aquila) " " 17.
" (Falco) " " 17, 18.
Butaëtus leucurus " " 9.
butanensis (Pica) I Cor. 39.
Buteo II But. 1; II Acc. 104.
Buteo abbreviatus II But. 11.
" aequinoctialis II But. 17, 18; II Acc. 110.
" aguia II Ase. 6.
" albicollis " " 9.
" albifrons II But. 10; II Acc. 109.
" asiaticus " " 107.
" augur II But. 16; " " 110.
" bairdii " " 107.
" barbatus " " 111.
" borealis II But. 8; " " 107.
" brachypterus " " 108.
" cabanisii II But. 11.
" calurus " " 8; II Acc. 107.
" canescens " " 9, 10.
" capensis " " 5.
" cirtensis " " 5.
" cooperi II Acc. 107.
" desertorum II But. 5; II Acc. 106.

Buteo elegans II Acc. 108.
" erythronotus II But. 12.
" (Falco) " " 3.
" ferox II But. 9; II Acc. 107.
" fuliginosus " " 107.
" ghiesbrechtii II Ase.11; " " 104.
" harrisii " " 2.
" hemilasius II But. 3; II Acc. 107.
" holospilus " " 28.
" hyemalis " " 20.
" insignatus II Acc. 107.
" jackal II But. 14; II Acc. 110.
" japonicus " " 7; " " 106.
" lagopus " " 1; " " 104.
" leucocephalus " " 3.
" leucurus " " 9.
" lineatus " " 20; II Acc. 108.
" liventer " " 21; " " 111.
" longipes " " 9.
" melanoleucus II Ass. 14.
" melanonotus II Ase. 10; II Acc. 103.
" melanops " " 10.
" melanosternon II But.19; II Acc.111.
" meridionalis " " 17; " " 110.
" minor " " 5.
" montanus II Acc. 107.
" nigricollis II But. 17; " " 110.
" oxypterus " " 107.
" pennsylvanicus II But.20; " " 109.
" plagiatus II Ase. 1.
" plumipes II Acc. 106.
" poliogenys II But. 22; II Acc. 111.
" polionotus " " 103.
" polysoma II But. 12; " " 109.
" pterocles " " 13; " " 110.
" pyrrhogenys " " 22.
" rufipennis " " 23; II Acc. 111.
" rufiventer " " 9.
" sancti johannis II But. 2.
" swainsonii II But. 3; II Acc. 107.
" tachardus " " 5.
" teesa " " 22; II Acc. 111.
" tricolor " " 12.
" vulgaris " " 3; II Acc. 105.
" vulgaris japonicus II But. 7.
" wilsonii " " 20.
Buteogallus cathartoides " " 18.
buteoides (Avicida) II Per. 6.
Buteones II But. 1; II Acc. 104.
Butorides atricapilla V Ar. 42.
" brevipes " " 42.
" chloriceps " " 43.
" javanica " " 43.
" macrorhynchus " " 44.
" patruelis " " 43.
" scapularis " " 42.
" stagnatilis " " 43.
" virescens " " 41.
Butors " " 47.
butors (Petits-) " " 37.
Butreron capellei IV Col. 58.

C.

cabanisii (Alcedo) III Al. 5; III Al. R. 2.
" (Ardea) V Ar. 51.
" (Buteo) II But. 11.
" (Tigrisoma) V Ar. 51.
cacalotl (Corvus) I Cor. 12.
Cacangelus I Cuc. 28.
Cacao-Walk I Cor. 32.
Cacatua III P. 133; III P. R. 63.
" aequatorialis III P.140.
" chrysolophus " " 134.
" citrino-cristata " " 140; IIIP.R.66.
" cristata " " 143; " " 67.
" cyanopsis " " 135.
" ducorpsii " " 142.
" eleonorae " " 135.
" erythrolopha " " 142.
" galeata " " 142; IIIP.R.70.
" galerita " " 134; " " 63.
" leadbeateri " " 141; " " 66.
" leucolophus " " 143.
" luteocristata " " 137.
" minor " " 144.
" moluccensis " " 142; IIIP.R.66.
" nasica " " 146; " " 67.
" philippinarum " " 144; " " 67.
" rosea " " 145.
" roseicapilla " " 145; IIIP.R.67.
" rubrocristata " " 142.
" sanguinea " " 144; IIIP.R.67.
" sulphurea IIIP.135,137; " " 66.
" tenuirostris III P. 146.
" triton " " 135; IIIP.R.63.
cachinnans (Astur) II Ass. 26; II Acc. 68.
" (Falco) II Ass. 26.
" (Herpetotheres) " " 26.
" (Larus) VI L. 15, 16.
Cacomantis I Cuc. 21.
" borneensis " " 21.
" dysonymus " " 21.
" flabelliformis " " 26.
" incertus " " 26.
" infaustus " " 23.
" lanceolatus " " 21.
" merulinus " " 21.
" passerinus " " 27.
" querulus " " 23.
" threnodes " " 21.
cactorum (Conurus) III P. 21; III P. R. 5.
" (Psittacus) " " 21.
caeruleus (Bucco) I Bucc. 16.
caeruligula (Bucco) I Bucc. 17.
caesarinus (Ptilinopus) IV Col. 10.
Caesarornis alleni V Ra. 38.
" poliocephala V Ra. 54.
caesia (Gallinula) V Ra. 8.
" (Megaceryle) III Al. 4.
caesio-scapulata (Anas) VI A. 35.
caesius (Elanus) II Mil. 6.
" (Porphyrio) V Ra. 52.
" (Rallus) " " 8.

cafer (Buceros carunculatus) I Buc. 29.
" (Capito) I Bucc. 65.
" (Corvus) I Cor. 3.
" (Cucupicus) I Bucc. 65.
" (Picus) " " 65.
caffer (Hytiopus) II Acc. 133.
" (Rallus) V Ra. 9.
caffra (Eupodotis) IV Cur. 7.
" (Otis) " " 7.
Cafre II Aq. 9.
Caica III P. 63.
Caica chrysopogon " " 29.
" melanotis " " 67.
" (Psittacus) " " 64.
Cairina moschata VI A. 73.
cajanensis (Tringa) IV Cur. 57.
cajeli (Ceyx) III Al. R. 34.
" (Daccelo) " " " 34.
Calao de Gingi I Buc. 11.
Calao nasique " " 13.
calauchenia (Megalaima) I Bucc. 94.
calcaratus (Bucco) " " 88.
caledonica (Ardea) V Ar. 59, 60.
" (Streptocitta) I Cor. 1.
caledonicus (Nycticorax) V Ar. 59.
" (Platycercus) III P. 98.
Calherodias cucullatus V Ar. 60.
Calidris americana V Sc. 55.
" arenaria " " 55.
" (Charadrius) " " 55.
" (Gambetta) " " 65.
" nigellus " " 55.
" (Scolopax) " " 65.
" (Totanus) " " 65.
" tringoides " " 55.
calidus (Falco) II Acc. 32.
Calicchthrus leucolophus I Cuc. 16.
californiana (Saurothera) " " 40.
californianus (Cathartes) II Vul. 2; II Acc. 139.
" (Geococcyx) I Cuc. 40.
" (Sarcorhamphus) II Vul. 2.
" (Vultur) " " 2.
californica (Cyanocitta) I Cor. 64.
californicus (Larus) VI L. 16.
" (Podiceps) VI U. 40.
caligatus (Bubo) II Noc. 21.
" (Falco) II Ass. 6; II Acc. 52.
" (Rhynchophilus) V Sc. 73.
calipareus (Podiceps) VI U. 41.
calita (Conurus) III P. 16; III P. R. 4.
" (Psittaca) " " 16.
Callaeas cinerea I Cor. 73.
" (Vanellus) IV Cur. 67.
Callialcyon lilacina III Al. 25.
Callichen rufina VI A. 25.
callipterus (Conurus) III P. 26; III P. R. 7.
Callocephalon galeatus III P. 142.
Calloenas IV Col. 170.
" nicobarica IV Col. 170.
Calobates radiatus I Cuc. 60.
Calocitta sinensis I Cor. 70.
Calodera maculata " " 119, 120.
" nuchalis " " 119.
Caloenas gouldiae IV Col. 170.
" stairii " " 162.
Calopsitta novae hollandiae III P. 99.
Calorhamphus I Bucc. 73.
" fuliginosus " " 73.
" sanguinolentus " " 73.
calorhynchus (Phoenicophaës) I Cuc. 48.
calornis (Eurystomus) I Cor. 139.
calthopticus (Psittacus) III P. 28.
calthropae (Palaeornis) III P. 83; III P. R. 36.
calurus (Buteo) II But. 8; II Acc. 107.
calva (Columba) IV Col. 46.
" (Ibis) V I. 11.
" (Megalaima) I Bucc. 49.
" (Paradisea) I Cor. 87.
" (Phalacotreron) IV Col. 47.
" (Schlegelia) I Cor. 87.
" (Treron) IV Col. 46.
" (Vinago) " " 49.
calvus (Bucco) I Bucc. 49.
" (Geronticus) V I. 11.
" (Gymnobucco) I Bucc. 49.
" (Tantalus) V I. 11.
" (Vultur) II Vul. 8; II Acc. 141.
Calyptomenaenas holosericeus IV Col. 41.
Calyptorhynchus III P. 152; III P. R. 69.
" banksii " " 153; " " 69.
" baudini " " 155; " " 70.
" funereus " " 155; " " 70.
" galeatus " " 142; " " 70.
" leachii " " 153.
" macrorhynchus " " 154; III P. R. 70.
" naso " " 153.
" solandri " " 153; III P. R. 69.
" stellatus " " 152.
" temminckii " " 153.
" xanthonotus " " 155.
" xanthotus " " 155; III P. R. 70.
cambayensis (Columba) IV Col. 120.
" (Turtur) " " 120.
camelus (Struthio) IV St. 6.
campestris (Columba) IV Col. 138.
" (Peristera) " " 138.
" (Tetrax) IV Cur. 2.
" (Uropelia) IV Col. 138.
Camptolaimus labradorius VI A 19.
camtschatica (Phaleris) VI U. 25.
" (Sterna) VI Ster. 24.
camtschaticus (Simorhynchus) VI U. 25.
" (Tylorhamphus) " " 25.
camurus (Tockus) I Buc. 15.
cana (Anas) VI A. 67.
" (Casarca) " " 67.
" (Otis) IV Cur. 4.
" (Psittacula) III P. 72; III P. R. 31.
canadensis (Anas) VI A. 105.
" (Anser) " " 105.
" (Ardea) V Ra. 2.
" (Bernicla) VI A. 105.
" (Columba) IV Col. 142.
" (Corvus) I Cor. 65.
" (Cygnus) VI A. 105.

canadensis (Falco) II Aq. 1.
" (Garrulus) I Cor. 65.
" (Grus) V Ra. 2.
" (Grus fusca) V Ra. 2.
" (Perisoreus) I Cor. 65.
" (Tringa) V Sc. 30.
canagensis (Anser) VI A. 106.
canagica (Anas) " " 115.
" (Chloëphaga) " " 115.
canagicus (Anser) " " 115.
Canards-spatules " " 33.
Cancroma V Ar. 62.
" cochlearia V Ar. 62.
candicans (Falco) II Fal. 7; II Acc. 34.
" islandicus (Falco) II Fal. 14; II Acc. 34.
candida (Alca) VI U. 20.
" (Gygis) VI Ster. 35.
" (Piscatrix) VI Pe. 40.
" (Sterna) VI Ster. 35.
" (Strix) II Str. 6, 43; II Noc. 17.
candidissima (Ardea) V Ar. 15.
" (Garzetta) V Ar. 15.
candidus (Anser) VI A. 98.
" (Himantopus) V Sc. 105.
" (Lepturus) VI Pe. 43.
" (Phaëton) " " 43.
canescens (Buteo) II But. 9, 10.
" (Glottis) V Sc. 61.
caniceps (Bucco) I Bucc. 31, 32, 34, 36.
" (Megalaima) I Bucc. 34, 36.
" (Phoenicophaeus) I Cuc. 52.
" (Rhinota) " " 51.
canicollis (Sphecotheres) I Cor. 115.
canicularis (Conurus) III P. 19; III P. R. 5.
" (Psittacus) " " 19.
Canirallus oculeus V Ra. 20.
canningi (Euryzona) " " 19.
canorinus (Cuculus) I Cuc. 7.
canoroides (Cuculus) " " 7.
canorus (Cuculus) " " 4.
" (Haliaetus) II Aq. 21.
" indicus (Cuculus) I Cuc. 6.
cantiaca (Sterna) VI Ster. 5, 11.
cantiacus (Thalasseus) VI Ster. 5.
cantianus (Charadrius) IV Cur. 31.
cantillans (Sphenocercus) IV Col. 60.
canus (Larus) VI L. 23, 26.
" major (Larus) VI L. 26.
" (Psittacus) III P. 72.
" (Tinamus) VIII Ti. 8.
canutus (Tringa) V Sc. 29.
capellei (Butreron) IV Col. 58.
" (Columba) " " 57.
" (Treron) " " 58.
" (Vinago) " " 58.
capensis (Alcedo) III Al. 13.
" (Anas) VI A. 31.
" (Ardea stellaris) V Ar. 48.
" (Aythyia) VI A. 31.
" (Bubo) II Oti. 9; II Noc. 4.
" (Bucco) I Bucc. 76.
" (Buteo) II But. 5.
capensis (Chaulelasmus) VI A. 48.
" (Colius) I Cuc. 79.
" (Columba) IV Col. 145.
" (Corvus) I Cor. 27.
" (Cuculus) I Cuc. 6, 9.
" (Daption) VI Proc. 14.
" (Falco lanarius) II Fal. 16; II Acc. 35.
" (Fuligula) VI A. 31.
" (Graculus) VI Pe. 19.
" (Grus) V Ra. 6.
" (Hagedashia) V I. 10.
" (Hians) V Cic. 15.
" major (Otus) II Noc. 3.
" (Noctua) " " 28.
" (Noctua perlata) II Str. 37; II Noc. 30.
" (Oedicnemus) IV Cur. 21.
" (Oenas) IV Col. 145.
" (Otus) II Oti. 5; II Noc. 3.
" (Parra) V Ra. 69.
" (Pelecanus) VI Pe. 19.
" (Peristera) IV Col. 145.
" (Phalacrocorax) VI Pe. 19.
" (Procellaria) VI Proc. 14.
" (Querquedula) VI A. 59.
" (Rhynchaspis) " " 33.
" (Scolopax) V Sc. 16.
" (Scops) II Oti. 20; II Noc. 14.
" (Strix) II Str. 6; " " 17.
" (Sula) VI Pe. 39.
" (Tachybaptus) VI U. 43.
" (Tetrapterix) V Ra. 6.
capillata (Ciconia) V Cic. 13.
capillatus (Carbo) VI Pe. 8.
" (Phalacrocorax) VI Pe. 8.
capistrata (Columba) IV Col. 96.
capistratus (Capito) I Bucc. 61.
" (Larus) V L. 37.
" (Megalaima) I Bucc. 61.
" (Psittacus) III P. 43, 109.
" (Trichoglossus) III P. 109; III P. R. 48.
capitalis (Corvus) I Cor. 35.
capitata (Psittacus) III P. 96.
capitis bonae spei (Gallinago) V Sc. 16.
Capito I Bucc. 52.
" amazonicus I Bucc. 57.
" aurantiicollis " " 60.
" auratus " " 55.
" aurifrons " " 55.
" aurovirens " " 58.
" bourcierii " " 58.
" cafer " " 65.
" capistratus " " 61.
" cayanensis " " 53.
" cayennensis " " 53.
" collaris " " 76.
" cyanicollis " " 16.
" cyphos " " 81.
" erythrocephalus " " 63.
" fuscus " " 85.
" glaucogularis " " 64.

Capito gottlinii I Bucc. 72.
„ hartlaubi „ „ 61.
„ hartlaubii „ „ 61.
„ leucops „ „ 89.
„ lineatus „ „ 31, 32.
„ maculicoronatus „ „ 57.
„ margaritatus „ „ 67.
„ maynanensis „ „ 63.
„ melanoleucus „ „ 78.
„ melanotis „ „ 61, 82.
„ pictus „ „ 63.
„ punctatus „ „ 55.
„ purpuratus „ „ 71.
„ richardsoni „ „ 59.
„ rosacei-collis „ „ 27.
„ rubricollis „ „ 53.
„ ruficollis „ „ 81.
„ squamiceps „ „ 70.
„ sulphureus „ „ 59.
„ tschudii „ „ 63.
„ vulgaris „ „ 79.
Çaraçara II Pol. 2.
Çaraçaras „ „ 1.
carbo (Alca) VI U. 17.
„ bicristatus VI Pe. 17.
„ capillatus „ „ 8.
„ cincinnatus „ „ 22.
„ cormoranus „ „ 7.
„ desmarestii „ „ 18.
„ dilophus „ „ 22.
„ dimidiatus „ „ 15.
„ gaimardii „ „ 22.
„ gracilis „ „ 22.
„ graculus „ „ 22, 23.
„ (Graculus) „ „ 6.
„ longicaudus „ „ 15.
„ lugubris „ „ 12.
„ medius (Phalacrocorax) VI Pe. 8.
„ melanogaster „ „ 12.
„ mentalis „ „ 18.
„ mexicanus „ „ 23.
„ novae hollandiae (Phalacrocorax) VI Pe. 8.
„ (Pelecanus) VI Pe. 7.
„ (Phalacrocorax) „ „ 7.
„ punctatus „ „ 21.
„ purpurascens „ „ 20
„ sinensis (Phalacrocorax) „ „ 8.
„ (Uria) VI U. 17.
carboides (Phalacrocorax) VI Pe. 8.
cardinalis (Eclectus) III P. 39; III P.R. 13.
„ (Psittacus) „ „ 39.
carinatus (Rallus) V Ra. 34.
carneipes (Nectris) VI Proc. 26.
„ (Procellaria) „ „ 26.
„ (Puffinus) „ „ 26.
carnivorus (Corvus) I Cor. 12.
carola (Carpophaga) IV Col. 88.
carolina (Gallinula) V Ra. 28.
„ (Ortygometra) V Ra. 28.
„ (Porzana) „ „ 28.
carolinae augustae (Aratinga) III P. 17.
„ (Tanysiptera) III Al. R. 41.
carolinensis (Anas) VI A. 53.
„ (Columba) IV Col. 142.
„ (Conurus) III P. 17, 18; III P. R. 5.
„ (Peristera) IV Col. 142.
„ (Podiceps) VI U. 47.
„ (Podilymbus) „ „ 47.
„ (Psittacus) III P. 17, 18.
„ (Scops) II Oti. 26.
„ (Strix) „ „ 26.
„ (Turdus iliacus) I Bucc. 79.
„ (Zenaidura) IV Col. 142.
carolinus (Rallus) V Ra. 28.
Carphibis spinicollis V I. 12.
Carpococcyx radiatus I Cuc. 60.
Carpophaga IV Col. 80.
„ aenea „ „ 85.
„ assimilis „ „ 38.
„ badia „ „ 96.
„ basilica „ „ 96.
„ bernsteinii „ „ 40.
„ bicolor „ „ 98.
„ carola „ „ 88.
„ chalybura „ „ 85.
„ cineracea „ „ 91.
„ concinna „ „ 82.
„ formosa „ „ 40.
„ forsteni „ „ 93.
„ geelvinkiana „ „ 86.
„ goliath „ „ 95.
„ grisea „ „ 103.
„ griseipectus „ „ 88.
„ lacernulata „ „ 95.
„ latrans „ „ 91.
„ littoralis „ „ 103.
„ luctuosa „ „ 102.
„ magnifica „ „ 38.
„ melanura „ „ 98.
„ microcera „ „ 87.
„ mülleri „ „ 93.
„ neglecta „ „ 90.
„ norfolciensis „ „ 103.
„ novae zeelandiae „ 98.
„ oceanica „ „ 87.
„ ochropygia „ „ 91.
„ pacifica „ „ 87.
„ paulina „ „ 84.
„ perlata „ „ 17.
„ perspicillata „ „ 89, 90.
„ pinon „ „ 94.
„ pinon jobiensis „ „ 95.
„ poliocephala „ „ 92.
„ puella „ „ 39.
„ pusilla „ „ 86.
„ radiata „ „ 93.
„ rosacea „ „ 87.
„ roseinucha „ „ 81, 82.
„ rubricera „ „ 81.
„ rufigaster „ „ 97.
„ spilorrhoa „ „ 98.
„ sundewallii „ „ 87.
„ sylvatica „ „ 86.
„ tarrali „ „ 87.

Carpophaga temminckii IV Col. 89.
" torringtoni " " 71.
" tumida " " 81.
" westermanii " " 95.
" zoeae " " 91.
carua (Aramus) V Ra. 7.
carunculata (Anas) VI A. 7, 74.
" (Antigone) V Ra. 5.
" (Ardea) " " 5.
" (Bostrichia) V I. 10.
" (Grus) V Ra. 5.
" (Ibis) V I. 10.
" (Laomedontia) V Ra. 5.
carunculatus abyssinicus (Buceros) IBuc. 19.
" (Buceros) " " 19.
" (Buceros cafer) " " 20.
" (Buceros guineensis) " " 20.
" (Colius) I Cuc. 80.
" (Graculus) VI Pe. 20.
" (Leucocarbo) " " 20.
" (Pelecanus) " " 20.
Carvanaca grisea IV Cur. 23.
caryocatactes (Corvus) I Cor. 37, 38.
" (Nucifraga) " " 37.
caryophyllacea (Anas) VI A. 62.
" (Rhodonessa) " " 62.
casarca (Anas) " " 66, 110.
" cana " " 67.
" castanea " " 65.
" leucoptera " " 64.
" rutila " " 66.
" tadornoides " " 65.
" variegata " " 65.
casassii (Crotophaga) I Cuc. 47.
casiotis (Columba) IV Col. 66.
caspia (Gallinago) V Sc. 4.
" (Sterna) VI Ster. 13.
" (Sylochelidon) VI Ster. 13.
caspicus (Colymbus) VI U. 40.
caspius (Charadrius) IV Cur. 38.
" (Morinellus) " " 38.
Casse-noix commun I Cor. 37.
cassicus (Cracticus) " " 127.
cassidix (Buceros) I Buc. 9.
cassini (Mergulus) VI U. 26.
cassinii (Brachyotus) II Oti. 3.
" (Leptopila) IV Col. 159.
castanea (Anas) VI A. 59.
" (Casarca) " " 65.
" (Mareca) " " 47.
" (Rallina) V Ra. 17.
castaneiceps (Columba) IV Col. 77.
" (Janthoenas) " " 77.
castaneifrons (Ara) III P. 6.
castaneus (Merops) III Me. 3.
" (Rallus) V Ra. 17.
" (Rufirallus) V Ra. 17.
castanops (Strix) II Str. 7; II Noc. 17.
castanoptera (Athene) " " 34.
" (Noctua) " " 34; II Noc. 29.
" (Strix) " " 34.
castanota (Noctua) " " 34; II Noc. 28.
castanotus (Athene) " " 34.
castor (Merganser) VI A. 2.
" (Mergus) " " 2.
Casuarius IV St. 6, 8.
Casuarius australis IV St. 9.
" bennettii " " 11.
" bicarunculatus " " 10.
" emeu " " 9.
" galeatus " " 9.
" kaupii " " 10.
" papuanus " " 11.
" (Struthio) " " 9.
" uniappendiculatus IV St. 10.
catamene (Loriculus) III P. R. 62.
Catarractes VI U. 1.
catarractes (Aptenodytes) VI U. 8.
" (Larus) VI L. 45.
" (Lestris) " " 45.
" (Spheniscus) VI U. 8.
" (Stercorarius) VI L. 45.
Catarrhactes adelia VI U. 4.
" antipodes " " 9.
" (Aptenodytes) " " 7.
catesbyi (Atricilla) VI L. 44.
Catharacta cephus " " 49.
Cathartes II Vul. 1; II Acc. 138.
" atratus " " 2; " " 139.
" atratus brasiliensis II Vul. 3; II Acc. 139.
" aura II Vul. 2, 3; II Acc. 139.
" brasiliensis " " 3.
" burrovianus " " 4.
" californianus " " 2; II Acc. 139.
" foetens " " 3.
" gryphus " " 1; II Acc. 138.
" monachus " " 5.
" papa " " 1; II Acc. 138.
" percnopterus " " 5; " " 139.
" septentrionalis II Vul. 3.
" urubitinga II Vul. 4; II Acc. 139.
" vulturinus " " 2.
cathartoides (Buteogallus) II But. 18.
Catoptropelicanus conspicillatus VI Pe. 36.
Catoptrophorus crassirostris V Sc. 76
" semipalmatus " " 76.
caudacuta (Anas) VI A. 37.
caudata (Coracias) I Cor. 135.
" (Pica) " " 39.
caudatus (Galgulus) " " 134.
caurinus (Corvus) " " 24.
cauta (Diomedea) VI Proc. 34.
cavatus (Buceros) I Buc. 3.
cayana (Gallinula) V Ra. 39.
" (Piaya) I Cuc. 57, 58.
" (Sterna) VI Ster. 8.
" (Uroleuca) I Cor. 51.
cayanensis (Bucco) I Bucc. 53.
" (Capito) " " 53.
" (Cuculus minor) I Cuc. 59.
" (Cymindis) II Per. 9; II Acc. 136.
" (Falco) " " 9.
" (Garrulus) I Cor. 51.
" (Micropogon) I Bucc. 53.
" naevius (Bucco) I Bucc. 53.

cayanensis naevius (Cuculus) I Cuc. 42.
" (Psittacus) III P. 28.
" (Rallina) V Ra. 17.
" (Rallus) " " 17.
" (Rufirallus) " " 17.
cayanus (Charadrius) IV Cur. 62.
" (Coccyzus) I Cuc. 58
" (Corvus) I Cor. 51.
" (Cuculus) I Cuc. 58, 59.
" (Cyanocorax) I Cor. 51.
" (Hoploxypterus) IV Cur. 62.
" (Vanellus) " " 62.
cayenne red-billed crow I Bucc. 88.
" (Tinamou de) VIII Ti. 13.
cayennensis (Ardea) V Ar. 61.
" (Belonopterus) IV Cur. 57.
" (Bucco) I Bucc. 53.
" (Capito) " " 53.
" (Colymbus) VI U. 38.
" (Fulica) V Ra. 14, 17.
" (Harpiprion) V I. 8.
" (Ibis) " " 8.
" (Parra) IV Cur. 57.
" (Psittaca) III P. 27.
" (Rallus) V Ra. 14, 17.
" (Sterna) VI Ster. 8.
" (Strix) II Str. 14.
" (Sylochelidon) VI Ster. 8.
" (Tantalus) V I. 8.
" (Ulula) II Str. 14; II Noc. 19.
" (Vanellus) IV Cur. 57.
celebensis (Baza) II Acc. 133, 135.
" (Centropus) I Cuc. 73.
" (Circaëtus bacha) II But. 27; II Acc. 114.
" (Hypotaenidia) V Ra. 22.
" (Pitta) III Pit. 6; III Pit. R. 10.
" (Rallus) V Ra. 22.
cenchris (Falco) II Fal. 29; II Acc. 45.
" (Milvus) II Mil. 10.
cenchroides (Falco) II Fal. 29; II Acc. 45.
cendré (Tinamou) VIII Ti. 20.
Centrococcyx bengalensis I Cuc. 68.
" chlororhynchus " " 64.
" moluccensis " " 69.
" rectunguis " " 68.
" rufipennis " " 66.
" sinensis " " 66.
" validus " " 66.
" viridis " " 65.
Centropus " " 60.
" aegyptius " " 72.
" affinis " " 68.
" bicolor " " 73.
" borneensis " " 66.
" burchellii " " 72.
" celebensis " " 73.
" chlororhynchus " " 64.
" dimidiatus " " 68.
" epomidis " " 71.
" curycercus " " 66.
" francisci " " 71.
" gigas " " 63.
Centropus goliath I Cuc. 61.
" grillii " " 68.
" lepidus " " 68.
" leucogaster " " 63.
" lignator " " 68.
" macrourus " " 63.
" madagascariensis " " 65.
" medius " " 70.
" melanops " " 65, 66.
" melanorhynchus " " 65.
" melanurus " " 63.
" menebeki " " 61.
" molkenboeri " " 65.
" monachus " " 72.
" nigrifrons " " 65.
" nigrirufus " " 64.
" phasianinus " " 63.
" phasianus " " 63.
" philippensis " " 66.
" pygmaeus " " 68.
" rectunguis " " 67.
" rufipennis " " 65.
" senegalensis " " 71, 72.
" sinensis " " 65.
" spilopterus " " 61.
" superciliosus " " 72.
" variegatus " " 63.
" violaceus " " 61.
" viridis " " 65, 68.
Cephus arra VI U. 16.
" (Catharacta) VI L. 49.
" columba VI U. 18.
" fuscus (Lestris) VI L. 49.
" lacteola VI U. 18.
" (Lestris) VI L. 49.
" (Stercorarius) VI L. 49.
ceramensis (Cuculus) I Cuc. 19.
" (Nisus cirrhocephalus) II Ass. 39; II Acc. 78.
Ceratorhyncha occidentalis VI U. 26.
Cercibis oxycerca V I. 8.
Cereopsis VI A. 115.
Cereopsis novae hollandiae VI A. 115.
Cerorhina orientalis VI U. 26.
" suckleyi " " 26.
Cerorhyncha occidentalis VI U. 26.
" (Phaleris) " " 26.
cervicalis (Falco) II Fal. 16; II Acc. 36.
cervicalis (Garrulus) I Cor. 59.
cervina (Dacelo) III Al. 19; III Al. R. 11.
cerviniventris (Chlamydodera) I Cor. 120.
cerviniventris (Leptopila) IV Col. 159.
cervinus (Tinamus) VIII Ti. 22.
Ceryle alcyon III Al. 4.
" amazona " " 5.
" americana " " 5.
" bicolor " " 5.
" guttata " " 1, 2.
" leucomelanura " " 2.
" maxima " " 3.
" rudis " " 2.
" sharpei III Al. R. 1.
" superciliosa III Al. 6.

Ceryle torquata III Al. 4.
" varia " " 2.
Ceutmochares I Cuc. 50.
Ceycopsis fallax III Al. R. 32.
" sharpei " " 33.
ceylanensis (Eclectus) III P. 39.
" (Oriolus) I Cor. 107.
" (Psittacus) III P. 39.
" (Turtur) IV Col. 129.
ceylonensis (Bubo) II Oti. 19; II Noc. 7.
" (Eudynamis) I Cuc. 17.
" (Ketupa) II Oti. 19.
" (Strix) " " 18, 19.
Ceyx cajeli III Al. R. 34.
" cyanea " " 17.
" cyanopectus " " 18.
" dillwynii " " 33.
" lepida III Al. 48; " " 34.
" melanura " " 49.
" philippensis III Al. R. 11.
" pusilla III Al. 18.
" rubra " " 49.
" rufidorsa III Al. R. 33.
" tribrachis III Al. 17.
" uropygialis III Al. R. 34.
" wallacei " " 34.
Chacuru I Bucc. 82.
chacuru (Bucco) " " 82.
chalcites (Chloroceryle) III Al. 5.
" (Chrysococcyx) I Cuc. 32.
" (Cuculus) " " 33.
" osculans " " 34.
" smaragdineus " " 29.
Chalcopelia afra IV Col. 144.
" chalcospilos " " 144.
" puella " " 134.
chalcopepla (Lampromorpha) I Cuc. 31.
Chalcophaps IV Col. 145.
" augusta " " 145.
" borneoensis " " 145.
" chrysochlora " " 145.
" formosana " " 146.
" hombroni " " 151.
" indica " " 145.
" javanica " " 145.
" longirostris " " 145.
" moluccensis " " 145.
" stephani " " 151.
Chalcopsitta leucopygialis III P. 122.
" rubiginosa " " 129.
" rubrifrons " " 122.
" scintillatus " " 122.
chalcoptera (Amazona) IIIP. 62; IIIP. R. 29.
" (Anas) VI A. 46.
" (Columba) IV Col. 154.
" (Ibis) V I. 4.
" (Phaps) IV Col. 154.
chalcopterus (Cursorius) IV Cur. 12.
" (Leucus) VI L. 6.
" (Psittacus) III P. 62.
" (Rhinoptilus) IV Cur. 12.
chalcospilos (Chalcopelia) IV Col. 144.
" (Columba) " " 144.
chalcospilos (Peristera) IV Col. 144.
chalcurus (Ptilinopus) IV Col. 14.
chalybaea (Nanucodia) I Cor. 122.
Chalybaeus I Cor. 120.
" ater " " 121.
" (Cracticus) " " 122.
" cornutus " " 120.
" keraudreni " " 120.
" paradiseus " " 122.
" viridis " " 122.
chalybura (Carpophaga) IV Col. 85.
Chamaepelia albivitta " " 135.
" amazilia " " 135.
" cinnamomea " " 136.
" granatina " " 135.
" griseola " " 135.
" inca " " 133.
" passerina " " 135.
" rufipennis " " 136.
" trochila " " 135.
Charadrii IV Cur. 23.
charadrioides (Cursorius) " " 14.
Charadrius " " 23.
Charadrius aegyptius " " 14.
" albiceps " " 62.
" albifrons " " 32.
" alexandrinus " " 32.
" annuligerus " " 36.
" apricarius " " 49.
" arabs " " 26.
" armatus " " 62.
" asiaticus " " 38, 39.
" atrigularis " " 68.
" auratus " " 49.
" auratus orientalis " " 50.
" azarae " " 37.
" bicinctus " " 37.
" bilobus " " 64.
" bitorquatus " " 24.
" brevirostris " " 30.
" calidris V Sc. 55.
" cantianus IV Cur. 31.
" caspius " " 38.
" cayanus " " 62.
" cinclus " " 43.
" cirrhepidesmus " " 41.
" collaris " " 30, 37.
" columbinus " " 39.
" coronatus " " 62.
" crassirostris " " 30.
" cristatus " " 60.
" cucullatus " " 35, 67.
" curonicus " " 28.
" elegans " " 32.
" falklandicus " " 36.
" fluviatilis " " 28.
" frontalis " " 34, 63.
" fulvus " " 50.
" fuscus " " 39.
" gallicus " " 12.
" gavia " " 56.
" geoffroyi " " 39.
" gigas " " 38.

Charadrius glaucopis IV Cur. 50.
" gregarius " " 58.
" gularis " " 41.
" heywoodii " " 35.
" hiaticula " " 26, 28,29,30.
" hiaticuloides IV Cur. 26.
" himantopus V Sc. 105.
" hypomelas IV Cur. 54.
" inconspicuus " " 41.
" indicus " " 24, 25.
" inornatus " " 39, 63.
" intermedius " " 28.
" isabellinus " " 34.
" jamaicensis " " 23.
" jugularis " " 38.
" kittlitzii " " 34.
" lampronotus " " 57.
" larvatus " " 37.
" leschenaultii " " 39.
" leucopolius " " 35.
" leucurus " " 59.
" littoralis " " 31.
" longipes " " 34, 50.
" lugubris " " 63.
" marginatus " " 35, 42.
" marmoratus " " 53.
" melanocephalus " " 14.
" melanops " " 31.
" melanopteroides " " 63.
" melanopterus " " 63.
" melasomus " " 61.
" melodus " " 29, 33.
" minor " " 28.
" modestus " " 48.
" monachus " " 35.
" mongolicus " " 41.
" montanus " " 38, 46.
" morinellus " " 46.
" nigrifrons " " 31.
" nivifrons " " 35.
" novae zeelandiae " " 45.
" obscurus " " 45.
" okeni " " 29.
" pardela " " 54.
" pastor " " 34.
" pectoralis " " 34,53,65.
" pecuarius " " 34.
" peronii " " 33.
" persicus " " 60.
" philippinus " " 28.
" pileatus " " 65.
" pluvialis " " 49,50,53.
" pusillus " " 28.
" pygmaeus " " 28.
" pyrrhocephalus " " 36.
" pyrrhothorax " " 41.
" rubecola " " 48.
" rubidus V Sc. 55.
" rubricollis IV Cur. 41.
" ruficapillus " " 42.
" ruficollis " " 39, 41.
" rufinellus " " 41.
" rufinus " " 39.
Charadrius sanguineus IV Cur. 41.
" semipalmatus " " 30.
" sibiricus " " 46.
" simplex " " 28.
" speciosus " " 62.
" spinosus " " 60.
" spixii " " 63.
" stolatus " " 62.
" stolidus " " 46.
" subrufinus " " 41.
" taïtensis " " 50.
" tataricus " " 46.
" textus " " 65.
" tricollaris " " 24.
" tricolor " " 65.
" trifasciatus " " 33, 36.
" torquatula " " 45.
" torquatus " " 23.
" vanelloides " " 65.
" varius " " 34.
" veredus " " 38.
" ventralis " " 61.
" virginicus " " 50, 53.
" vociferus " " 23.
" wilsonius " " 30.
" winterfeldii " " 45.
" xanthocheilus " " 50.
" zonatus " " 28.
charadroides (Ammoptila) VI Ster. 41.
Charitornis I Cor. 1.
Charmosina papuensis III P. 130.
Charmosyna pectoralis " " 130.
Charmosyne pulchella " " 130; III P. R. 52.
chattering Crow I Cor. 32.
Chaulelasmus americana VI A. 48.
" capensis " " 48.
" strepera " " 48.
Chauna chavaria V Ra. 72.
" derbyana " " 72.
Chaunornis tamatia I Bucc. 79.
chavaria (Chauna) V Ra. 72.
" (Palamedea) " " 72.
" (Parra) " " 72.
cheela (Circaëtus) II But. 25; II Acc. 113.
" (Falco) " " 25.
chelicuti (Alcedo) III Al. 32.
" (Dacelo) " " 32; III Al. R. 21.
" (Halcyon) " " 32.
Chelidoptera I Bucc. 90.
" albipennis " " 91.
" tenebrosa " " 90.
Chelochelidon longipennis VI Ster. 24.
Chelodipteryx II Mil. 5.
Chenalopex aegyptiacus VI A. 94.
" jubata " " 95.
cheneros (Anas) " " 65.
Chenopis atrata " " 80.
cheroyeus (Psittacus) III P. 22.
Chettusia crassirostris IV Cur. 60.
" gregaria " " 58.
" leucura " " 59.
" wagleri " " 69,

chilensis (Accipiter) II Acc. 72.
" (Aptenodytes) VI U. 10.
" (Diomedea) " " 10.
" (Fulica) V Ra. 63.
" (Merganetta) VI A. 12.
" (Nisus) II Acc. 71.
" (Phoenicopterus) VI A. 117.
" (Podiceps) VI U. 41.
" (Psilorhinus) I Cor. 47.
" (Rhaphipterus) VI A. 12.
chiloënsis (Anas) VI A. 46.
" (Aptenodytes) VI U. 10.
" (Bernicla) VI A. 101.
" (Diomedea) VI U. 10.
" (Mareca) VI A. 46.
chimachima (Polyborus) II Pol. 5; II Acc. 137.
Chimaerina cornuta VI U. 26.
chimanga (Milvago) II Pol. 6.
chimango (Polyborus) II Pol. 6; II Acc. 137.
chinensis (Anser) VI A. 106.
" (Eudynamis) I Cuc. 17.
" (Fulica) V Ra. 41.
" (Oriolus) I Cor. 102.
" (Scolopax) V Sc. 16.
" (Turtur) IV Col. 127.
chionis (Coscoroba) VI A. 83.
" (Cygnus) " " 83.
chionogaster (Accipiter) II Acc. 72.
" (Nisus) " " 71.
chiquera (Falco) II Fal. 20; II Acc. 38.
chiriri (Psittaca) III P. 27.
chirocote (Rallus) V Ra. 15.
chirurgus (Parra) " " 71.
Chizaerhis gigantea I Cuc. 77.
" personata " " 78.
" variegata " " 79.
Chizaerrhis feliciae " " 78.
Chlamydauchen jubata VI A. 97.
Chlamydera nuchalis I Cor. 119.
" maculata " " 119, 120.
Chlamydodera guttata " " 120.
" cerviniventris I Cor. 120.
Chloëphaga canagica VI A. 115.
" magellanica " " 99.
" melanoptera " " 100.
" poliocephala " " 101.
" rubidiceps " " 102.
chloriceps (Ardea) V Ar. 43.
" (Butorides) " " 43.
chlorigaster (Treron) IV Col. 46.
chloris (Alcedo) III Al. 32.
" (Dacelo) " " 32; III Al. R. 21.
" (Halcyon) III Al. 32.
chlorocephala (Alcedo) " " 32.
Chloroceryle leucosticta " " 5.
" chalcites " " 5.
Chloroenas IV Col. 78.
" albilinea " " 67.
" amethystina " " 80.
" fallax " " 80.
" fasciata " " 67.
" flavirostris " " 78.
" inornata " " 78.
Chloroenas leucotis IV Col. 79.
" nigrirostris " " 78.
" plumbea " " 70.
" rufina " " 79.
" vinacea " " 78.
chlorogaster (Crocopus) " " 46.
chlorolepidotus (Conurus) III P. 111.
" (Psittacus) " " 111.
" (Trichoglossus) " " 111; III P. R. 49.
chloronotus (Porphyrio) V Ra. 54.
chlorophaeus (Cuculus) I Cuc. 51.
" (Phoenicophaës) " " 51.
chloropoda (Sterna) VI Ster. 12.
chloropoides (Fulica) V Ra. 63.
chloroptera (Arara) III P. 3; III P. R. 2.
" (Treron) IV Col. 52.
chloropterus (Ara) III P. 3.
chloropus (Gallinula) V Ra. 45, 49.
" (Glottis) V Sc. 61.
chloropygius (Rhynchophilus) V Sc. 73.
" (Totanus) V Sc. 71.
chlororhyncha (Diomedea) VI Proc. 35.
" (Platalea) V Cic. 22.
" (Procellaria) VI Proc. 25.
chlororhynchus (Centrococcyx) I Cuc. 64, 65.
" (Centropus) " " 64.
" (Puffinus) VI Proc. 25.
" (Thiellus) " " 25.
chlorynotus (Porphyrio) V Ra. 54.
chochi (Diplopterus) I Cuc. 42.
choliba (Strix) II Oti. 21.
Choriotis arabs IV Cur. 8.
" australis " " 9.
" cristata " " 8.
" edwardii " " 8.
Chotorea javensis I Bucc. 19.
Choucas I Cor. 33.
Chroicocephalus cucullatus VI L. 37.
" franklini " " 37.
" ichthyaëtus " " 34.
" maculipennis " " 36.
" personatus " " 35.
" philadelphiae " " 41.
" schimperi " " 40.
" subulirostris " " 37.
chrysaëtos (Falco) II Aq. 1.
chryseogenys (Conurus) III P. 21; III P. R. 5.
chrysites (Lamprococcyx) I Cuc. 31.
chrysocephalus (Aratinga) III P. 18.
chrysochlora (Chalcophaps) IV Col. 145.
chrysochloris (Lamprococcyx) I Cuc. 31.
Chrysococcyx " " 29.
" chalcites " " 32.
" hodgsoni " " 32.
" intermedius " " 29.
" lucidus I Cuc. 32, 34.
" minutillus " " 33.
" plagosus " " 32.
" poecilurus " " 33.
" smaragdinus " " 32.
" xanthorhynchus " " 32.
Chrysocoma VI U. 1.

chrysocoma (Megalaima) I Bucc. 41.
chrysocome (Aptenodytes) VI U. 6, 7, 8.
" (Eudyptes) " " 7.
" (Spheniscus) " " 6.
chrysocomus (Bucco) I Bucc. 41.
chrysoconus (Bucco) " " 41.
chrysogaster (Cuculus) I Cuc. 55.
" (Euphema) III P. 104; III P. R. 41.
" (Kurutreron) IV Col. 14.
" (Psittacus) III P. 104.
" (Ptilinopus) IV Col. 14.
chrysolophus (Cacatua) III P. 134.
" (Eudyptes) VI U. 7.
" (Spheniscus) " " 7.
chrysopogon (Bucco) I Bucc. 14.
" (Caica) III P. 29.
" (Megalaima) I Bucc. 14.
chrysopsis (Megalaima) " " 15.
chrysoptera (Bucco) " " 40.
chrysosema (Conurus) III P. 28.
" (Psittaculus) III P. 28; III P. R. 7.
chrysosticta (Strix) II Str. 15.
chrysostoma (Euphemia) III P. 103; III P. R. 41.
chrysostomus (Conurus) III P. 103.
" (Psittacus) " " 103.
Chrysotis III P. 49.
Chrysotis aestivalis " " 51.
" guatemalae III P. R. 27.
" hypochondriacus " " 57.
" levaillantii III P. 55; " " 27.
" sallaei " " 58.
" xantholora " " 59.
chrysotorques (Ara) " " 7.
chrysozonus (Bucco) I Bucc. 41.
chrysurus (Psittacus) III P. 70.
Ciccaba grisella II Str. 9.
" ieptogrammica " " 20.
" myrtha " " 19.
" pagodarun " " 22.
Ciceronia microceros VI U. 23.
" nodirostris " " 23.
Ciconia V Cic. 1.
Ciconia abdimii " " 5.
" alba " " 2.
" americana " " 8.
" (Ardea) " " 2.
" argala " " 12.
" australis " " 6.
" biclavata " " 9.
" capillata " " 13.
" crumenifera " " 12.
" ephippiorhyncha " " 7.
" jabiru " " 8.
" javanica " " 13.
" leucocephala " " 9.
" leucoptera " " 6.
" maguari " " 8, 11.
" marabu " " 13.
" mycteria " " 11.
" nigra " " 4.
" ruyssenaersi " " 9.
senegalensis " " 7.
Ciconia umbellata V Cic. 9.
" xenorhyncha " " 7.
Ciconiae " " 1.
cincinnatus (Carbo) VI Pe. 22.
" (Graculus) " " 22.
" (Phalacrocorax) " " 22.
Cincinnurus regius I Cor. 89.
" spinturnix " " 89.
cinclus (Charadrius) IV Cur. 43.
" interpres " " 43.
" minor (Tringa) V Sc. 33.
" (Pelidna) " " 33, 42.
" (Tringa) " " 32.
cincta (Columba) IV Col. 34.
" (Leucotreron) " " 34.
cinctus (Cursorius) IV Cur. 11.
" (Erythrogenys) " " 59.
" florensis (Ptilopus) IV Col. 34.
" lettiensis (Ptilopus) " " 35.
" (Micropogon) I Bucc. 24.
" (Ptilinopus) IV Col. 34.
" (Ptilopus) " " 34.
" (Vanellus) IV Cur. 48, 59.
cineracea (Carpophaga) IV Col. 91.
" (Columba) " " 91.
" (Ducula) " " 91.
cineraceus (Buceros) I Buc. 11.
" (Cuculus) I Cuc. 26.
cinerascens (Anser) VI A. 111.
" (Bidens) II Fal. 34.
" (Bubo) II Oti. 15; II Noc. 5.
" (Circus) II Cir. 37; II Acc. 49.
" (Cuculus) I Cuc. 26.
" (Falco) II Cir. 3.
" (Nothura) VIII Ti. 40.
" (Rhynchops) VI Ster. 39
" (Rhynchotus) VIII Ti. 40.
cinerea (Anas) VI A. 13.
" (Ardea) V Ar. 5.
" (Asturina) II Acc. 100.
" (Callaeas) I Cor. 73.
" (Columba) IV Col. 118, 138.
" (Cryptura) VIII Ti. 20.
" (Erythra) V Ra. 32.
" (Fulica) " " 39.
" (Fuligula) VI A. 13.
" (Gallinula) V Ra. 40.
" (Glareola) IV Cur. 17.
" (Glaucopis) I Cor. 73.
" (Grus) V Ra. 1.
" longirostris (Grus) V Ra. 2.
" media (Erythra) " " 32.
" minima (Erythra) " " 32.
" (Peristera) IV Col. 138.
" (Porzana) V Ra. 32.
" (Procellaria) VI Proc. 23, 24.
" (Procelsterna) VI Ster. 38.
" (Scolopax) V Sc. 77.
" (Squatarola) IV Cur. 54.
" (Sterna) VI Ster. 38.
" (Strix) II Str. 9.
" (Struthidea) I Cor. 73.
" (Terekia) V Sc. 77.

cinerea (Thalassidroma) VI Proc. 3.
" (Tringa) V Sc. 29.
" (Ulula) II Str. 8, 9; II Noc. 18.
cinereicollis (Aegialites) IV Cur. 24.
" (Fulica) V Ra. 62.
" (Psittacus) III P. 15.
cinereifrons (Alcedo) III Al. 29.
" (Dacelo) " " 29; III Al. R. 20.
" (Halcyon) " " 29.
cinereus (Anastomus) V Cic. 15.
" (Anous) VI Ster. 38.
" (Anser) VI A. 109.
" (Bucco) I Bucc. 88.
" (Circaëtus) II But. 25; II Acc. 113.
" (Circus) II Cir. 5; II Acc. 49.
" (Coccygus) I Cuc. 38.
" (Cracticus) I Cor. 129.
" (Crypturus) VIII Ti. 7, 20.
" (Cuculus) I Cuc. 26.
" (Lobivanellus) IV Cur. 69.
" (Micropterus) VI A. 13.
" (Numenius) V Sc. 77.
" (Phalaropus) V Sc. 58.
" (Pluvianus) IV Cur. 69.
" (Porphyrio) V Ra. 32, 34.
" (Puffinus) VI Proc. 24, 26.
" (Rallus) V Ra. 32, 34.
" (Tetrao) VIII Ti. 20.
" (Tinamus) " " 20.
" (Totanus) V Sc. 77.
" (Turtur) IV Col. 127.
" (Vultur) II Vul. 9.
" (Xenus) V Sc. 77.
cinerosus (Cuculus) I Cuc. 37.
cingulata (Psittacula) III P. 69; III P. R. 30.
cingulatus (Psittacus) " " 69.
Cinnamolegus papuensis I Cor. 94.
cinnamomea (Ardea) V Ar. 40,
" (Ardeola) V Ar. 40.
" (Chamaepelia) IV Col. 136.
" (Columba) " " 57.
" (Talpacotia) " " 136.
cinnamomeiventris (Piaya) I Cuc. 39.
cinnamomeus (Falco) II Fal. 30.
" (Rallus) V Ra. 27.
cinnamomina (Dacelo) III Al. 39; III Al. R. 29.
cinnamominus (Halcyon) III Al. 39.
Circaëtos II Aq. 1.
Circaëtus II But. 23; II Acc. 112.
Circaëtus bacha " " 26; " " 113.
" " celebensis " " 27; " " 114.
" beaudouini " " 25; " " 112.
" brachypterus II Ass. 52.
" cheela II But. 25; II Acc. 113.
" cinereus " " 25; " " 113.
" coronatus II Ase. 12.
" ecaudatus II But. 28; II Acc. 115.
" fasciatus " " 112.
" fasciolatus " " 112.
" funereus II But. 25.
" gallicus II But. 23, 24, 25; II Acc. 112.
Circaëtus holospilus II But. 28; II Acc. 114.
" melanotis " " 113.
" rufipectus II But. 27; " " 114.
" rufipectus sulaënsis " " 114.
" solitarius II Ase. 8
" sulaënsis II Acc. 114.
" thoracicus II But. 24; " " 112.
" xanthothorax II Ass. 50.
" zonurus II Acc. 113.
circe (Piaya) I Cuc. 57.
Circi II Cir. 1; II Acc. 48.
circia (Anas) VI A. 49.
" (Querquedula) " " 49.
Circus acoli II Cir. 5.
" aeruginosus " " 10; II Acc. 50.
" approximans " " 51.
" assimilis II Cir. 9; II Acc. 50, 51.
" ater " " 3, 7.
" cinerascens II Cir. 3, 7; II Acc. 49.
" cinereus " " 5; " " 49.
" cyaneus " " 1; " " 48.
" " hudsonius II Cir. 2; II Acc. 48.
" gouldii II Cir. 8; II Acc. 51.
" jardinii " " 9; " " 50.
" lalandei " " 7.
" macropterus " " 8; II Acc. 49.
" macroscelis " " 50.
" maillardii " " 51.
" maurus II Cir. 7; " " 49.
" megaspilus " " 6.
" melanoleucos II Cir. 7; II Acc 49, 51.
" mülleri II But. 23.
" pallidus II Cir. 4.
" poliopterus " " 6; II Acc. 49.
" ranivorus " " 11; " " 50.
" rufinus II But. 9.
" rufus II Cir. 10.
" superciliosus " " 8.
" swainsonii II Cir. 4; II Acc. 49.
" wolffii " " 51.
cirratus (Falco) " " 52.
" (Falco indicus) II Ass. 6; " " 52.
" (Spizaetus) " " 6; " " 52.
Cirrepidesmos geoffroyi IV Cur. 39.
" pyrrhothorax " " 41.
cirrhata (Alca) VI U. 27.
" (Lunda) " " 27.
" (Paradisea) I Cor. 86.
cirrhatus (Hypoleucus) VI Pe. 20.
" (Mormon) VI U. 27.
" (Pelecanus) VI Pe. 20.
cirrhepidesmus (Charadrius) IV Cur. 41.
cirrhocephalus ceramensis (Nisus) II Ass. 39; II Acc. 78.
" (Larus) VI L. 36.
" major " " 36.
" (Mergulus) VI U. 22.
" minor VI L. 36.
" (Nisus) II Ass 38; II Acc. 77.
" plumbiceps VI L. 36.
" (Sparvius) II Ass. 38.
cirtensis (Buteo) II But. 5.

Cissa I Cor. 67.
" coerulea " " 71.
" erythrorhyncha " " 69.
" flavirostris " " 70.
" minor " " 68.
" ornata " " 69.
" puella " " 69.
" pyrrhocyanea " " 68.
" sinensis I Cor. 68.
" thalassina I Cor. 67.
citreocapillus (Phaeocephalus) III P. 35.
citrineocapillus (Phaeocephalus) III P. R. 9.
citrino-cristata (Cacatua) III P. 40; III P. R. 66.
citrino-cristatus (Plyctolophus) III P. 140.
citrinus (Plyctolophus) " " 137.
citrirostris (Larus) VI L. 23.
Cittura sanghirensis III Al. R. 14.
Cladorhynchus orientalis V Sc. 108.
Cladorhynchus pectoralis " " 108.
clamator (Grus) V Ra. 4.
clamosus (Cuculus) I Cuc. 16.
clanga (Aquila) II Aq. 3.
Clangula albeola VI A. 22.
" (Anas) " " 20.
" barrowii " " 21.
" (Fuligula) " " 20.
" histrionica VI A. 22.
" islandica " " 21.
" leuconota " " 8.
" vulgaris " " 20.
clarkii (Podiceps) VI U. 38.
clementinae (Kurukuru) IV Col. 6.
" (Ptilopus) " " 6.
lementinae (Ptilinope de) " " 6.
Clupeilarus fuscescens VI L. 14.
" fuscus " " 14.
" verreauxii " " 13.
clusii (Psittacus) III P. 67.
Clorhynchus strophiatus V Sc. 102.
clypeata (Anas) VI A. 33.
" (Rhynchaspis) " " 33.
" (Spatula) " " 33.
cobaltinus (Psittacus) III P. 61.
coccinea (Psittaca indica) " " 128.
coccineus (Lorius) III P. 128; III P. R. 58.
" (Psittacus) III P. 116.
coccinirostris (Sterna) VI Ster. 16.
Coccycua monachus I Cuc. 59.
Coccygus " " 37.
Coccygus americanus " " 37.
" cinereus " " 38.
" dominicensis " " 40.
" erythrophthalmus " " 37.
" lansbergi " " 39.
" melanocoryphus " " 38.
" merlini " " 40.
" nesiotis " " 38.
" pluvialis " " 39.
" seniculus " " 38.
" vetula " " 39.
Coccystes " " 43.
Coccystes afer " " 44.
Coccystes coromandus I Cuc. 43.
" flavirostris " " 37.
" glandarius " " 44.
" hypopinarus " " 44.
" jacobinus " " 44.
" pica " " 44.
" serratus " " 45.
Coccyzura leptogrammica IV Col. 108.
Coccyzura tusalia IV Col. 107.
Coccyzus badius I Cuc. 52.
" cayanus " " 58.
" coeruleus " " 46.
" cristatus " " 46.
" delalandei " " 46.
" dominicus " " 37.
" erythropyga " " 42.
" geoffroyi " " 60.
" helviventris " " 38.
" minor " " 38.
" minutus " " 59.
" naevius " " 42.
" phasianellus " " 41.
" pluvialis " " 40.
" rubrirostris " " 55.
" ruficapillus " " 42.
" seniculus " " 38.
" septorum " " 42.
" vaillantii " " 44.
Coccyzusa gracilis " " 59.
" rutila " " 59.
cochinchinensis (Oriolus) I Cor. 102.
" (Psittacus) III P. 125.
cochlearia (Cancroma) V Ar. 62.
Cochlothraustes delalandei I Cuc. 46.
cocineifrons (Trichoglossus) III P. R. 43.
çoçoi (Ardea) V Ar. 6.
coelestis (Psittacula) III P. 32.
" (Psittaculus) " " 32; III P. R. 9.
coerulata (Anas) VI A. 51.
" (Pterocyanea) " " 51.
" (Querquedula) " " 51.
coerulea (Ardea) V Ar. 22.
" (Cissa) I Cor. 71.
" (Cua) I Cuc. 46.
" (Herodias) V Ar. 22.
" (Myiothera) III Pit. 1.
" (Pica) I Cor. 46.
" (Pitta) III Pit. 1; III Pit. R. 4.
" (Procellaria) VI Proc. 12.
" (Urocissa) I Cor. 71.
coeruleatus (Psittacus) III P. 123.
coeruleiceps (Monotus) III Mo. 4.
" (Prionites) " " 4.
coeruleocephala (Alcedo) III Al. 12; III Al. R. 6.
coeruleocephalus (Merops) III Me. 7.
coeruleo-frontatus (Psittacara) III P. 11.
coerulescens (Anas) VI A. 108.
" (Anser) " " 108.
" (Apterornis) V Ra. 52.
" (Ardea) V Ar. 9.
" bengalensis (Falco) II Fal. 33; II Acc. 47.

coerulescens (Cryptura) VIII Ti. 23.
" (Falco) II Fal. 33; II Acc. 46.
" (Ibis) V I. 9.
" (Ierax) II Fal. 33.
" (Molybdophanes) V I. 9.
" (Notornis) V Ra. 52; IV St. 2.
" (Otis) IV Cur. 4.
" (Porphyrio) IV St. 2.
" (Rallus) V Ra. 9.
" (Trachelotis) IV Cur. 4.
coeruleus (Cuculus) I Cuc. 46.
" (Cyanocorax) I Cor. 46.
" (Glaucococcyx) I Cuc. 46.
" (Mergus) VI A. 2.
" (Polophilus) I Cuc. 46.
Colaptes rubricatus I Bucc. 65.
Colaris afra I Cor. 142.
" viridis " " 142.
" purpurascens " " 142.
colii (Otis) IV Cur. 7.
Coliphimus concolor I Cuc. 78.
Colius " " 79.
Colius atrigularis " " 81.
" capensis " " 79.
" carunculatus " " 80.
" erythropus " " 79.
" erythropygius " " 79.
" gularis " " 81.
" indicus " " 80.
" leuconotus " " 79.
" leucotis " " 80.
" (Loxia) " " 79.
" macrurus " " 80.
" nigricollis " " 81.
" panayensis " " 80.
" quiriva " " 80.
" senegalensis " " 80.
" striatus " " 80.
collaris (Alcedo) III Al. 32.
" (Anas) VI A. 26, 87.
" (Bucco) I Bucc. 76.
" (Capito) " " 76.
" (Charadrius) IV Cur. 30, 37.
" (Corvus) I Cor. 33.
" (Cursorius) IV Cur. 11.
" (Eurystomus) I Cor. 143.
" (Fuligula) VI A. 26.
" (Fulix) " " 26.
" (Halcyon) III Al. 32.
" (Merops) III Me. 10.
" (Strepsilas) IV Cur. 43.
" (Tamatia) I Bucc. 76.
" (Xema) VI L. 44.
colliei (Cyanurus) I Cor. 43.
" (Pica) " " 43.
Coloburis rufiventris III Pit. 7.
Columba IV Col. 63.
Columba abyssinica " " 48.
" aenea " " 85.
" afra " " 144.
" alba " " 98.
" albigularis " " 75.
" albilinea " " 67.
Columba albitorques IV Col. 73.
" amarantha " " 39.
" antarctica " " 74.
" aracauna " " 67.
" armillaris " " 163.
" aromatica " " 52, 53, 57.
" arquatrix " " 72.
" auricularis " " 65.
" australis " " 48.
" basilis " " 96.
" bicolor " " 98.
" bitorquata " " 121.
" bronzina " " 161.
" calva " " 46.
" cambayensis " " 120.
" campestris " " 138.
" canadensis " " 142.
" capellei " " 58.
" capensis " " 145.
" capistrata " " 96.
" carolinensis " " 142.
" casiotis " " 66.
" castaneiceps " " 77.
" (Cephus) VI U. 18.
" chalcoptera IV Col. 154.
" chalcospilos " " 144.
" cincta " " 34.
" cineracea " " 91.
" cinerea " " 118, 138.
" cinnamomea " " 57.
" corensis " " 68.
" coronata " " 168.
" cristata " " 164.
" cruenta " " 157.
" cruziana " " 137.
" cuneata " " 133.
" cuprea " " 165.
" curvirostra " " 52.
" cyanocephala " " 166.
" cyanovirens " " 23, 30.
" denisea " " 67.
" diademata " " 8, 11.
" dilopha " " 74.
" du petit thouarsii IV Col. 13.
" dussumieri " " 120.
" erythroptera " " 162.
" erythrothorax " " 160.
" fasciata " " 67.
" ferrago " " 118.
" ferruginea " " 57.
" fitzroyi " " 67.
" flavigaster " " 11.
" flavirostris " " 78.
" forsteri " " 8.
" fulvicollis " " 57.
" gelastes " " 118.
" geoffroyi " " 139.
" griseola " " 135.
" groenlandica VI U. 18.
" guinea IV Col. 72.
" gularis " " 37.
" gymnocyclus " " 65.
" hardwickii " " 45.

Columba hodgsonii IV Col. 71.
" holosericea " " 41.
" humeralis " " 48, 130.
" humilis " " 125.
" hyogastra " " 20.
" indica " " 145.
" inornata " " 78.
" intermedia " " 64.
" iriditorques " " 69.
" jamaicensis " " 158.
" jambu " " 36.
" janthina " " 74.
" kurukuru " " 15.
" lacernulata " " 95.
" larvata " " 161.
" leptogrammica " " 107.
" leucocephala " " 68.
" leuconota " " 69.
" leucophrys " " 162.
" leucoptera " " 152.
" leucotis " " 79.
" levaillantii " " 121.
" littoralis " " 98.
" livia " " 63.
" locutrix " " 70.
" lophotes " " 156.
" loricata " " 69.
" lugens " " 119.
" luteovirens " " 41.
" luzonica " " 157.
" maculata " " 141.
" madagascariensis IV Col. 42, 48.
" magnifica " " 38.
" malaccensis " " 131.
" manadensis " " 106.
" maugei " " 132.
" meena " " 118.
" melanocephala " " 28.
" melanoleuca " " 163.
" melanoptera " " 153.
" meridionalis " " 154.
" metallica " " 75.
" migratoria " " 142.
" militaris " " 45.
" minuta " " 135.
" modesta " " 107.
" monacha " " 12.
" montana " " 165.
" mystacea " " 164.
" nana " " 21.
" nicobarica " " 170.
" norfolciensis " " 103.
" novae zeelandiae " " 98.
" oceanica " " 87.
" oenas " " 65.
" olax " " 56.
" oopa " " 15.
" orientalis " " 118.
" oxyura " " 62.
" pacifica " " 87.
" pallida I Cuc. 26.
" palumbus IV Col. 66.
" " himalayana " " 66

Columba pampusana IV Col. 162.
" passerina " " 135.
" paulina " " 84.
" pectoralis " " 23.
" perlata " " 17.
" perspicillata " " 89.
" phasianella " " 108.
" phoenicoptera " " 45.
" phoenicura " " 42.
" picata " " 163.
" picturata " " 129.
" picui " " 137.
" plumbea " " 70.
" polleni " " 72.
" porphyracra " " 8, 15.
" porphyrea " " 33.
" portoricensis " " 68.
" psittacea " " 59.
" psittacina " " 59.
" puella " " 38.
" pulchella " " 2.
" pulcherrima " " 44.
" pulchricollis " " 71.
" purpurata IV Col. 4, 7, 8, 15.
" purpurea " " 49.
" purpureo-leucocephala IV Col. 13.
" reinwardtii " " 104.
" risoria " " 125.
" rivoli " " 24.
" rosacea " " 87.
" roseicapilla " " 8.
" roseicollis " " 33.
" rubricapilla " " 44.
" ruficeps " " 110.
" rufina " " 79.
" rupestris " " 64.
" rupicola " " 118.
" schimperi " " 65.
" scripta " " 155.
" semitorquata " " 124.
" senegalensis " " 119.
" sganzini " " 43
" sieboldii " " 61.
" smithii " " 155.
" spadicea " " 98.
" speciosa " " 70.
" sphenura " " 60.
" spiloptera " " 133
" squamosa " " 133.
" steursii " " 169.
" striata " " 131.
" superba " " 30.
" suratensis " " 129.
" sylvatica " " 86.
" taïtensis " " 15.
" talpacoti " " 136.
" temminckii " " 65.
" terrestre " " 125.
" tigrina " " 127.
" trigonigera " " 73.
" tristigmata " " 158.
" turtur " " 116.
" tympanistria " " 143.

Columba venusta IV Col. 138.
„ vernans „ „ 49, 50, 51.
„ versicolor „ „ 74.
„ vinacea „ „ 78, 123.
„ violacea „ „ 165.
„ virens „ „ 23.
„ viridis „ „ 22, 23, 50.
„ viridissima „ „ 8.
„ vitiensis „ „ 77.
„ waalia „ „ 48.
„ xanthogastra „ „ 11.
„ zenaida „ „ 140.
„ zoeae „ „ 91.
Columbae „ „ 63.
columbarius (Falco) II Fal. 19; II Acc. 37.
Columbars IV Col. 44.
columbiana (Merganetta) VI A. 12.
columbianus (Pyrrhococcyx) I Cuc. 57.
Columbi-gallina linearis IV Col. 164.
columbina (Bulweria) VI Proc. 9.
„ strepitans IV Col. 137.
columbinus (Charadrius) IV Cur. 39.
„ (Gelastes) VI L. 28.
„ (Psittacus) III P. 50.
„ (Pufinus) VI Proc. 9.
columboides (Conurus sagittifer) III P. 83.
„ (Ochthodromus) IV Cur. 39.
„ (Palaeornis) III P. 83; III P. R. 35.
Columbula cruziana IV Col. 137.
colymbis (Anas) VI A. 28.
Colymbus VI U. 30.
Colymbus arcticus VI U. 31.
„ auritus „ „ 36, 40.
„ balticus „ „ 31.
„ borealis „ „ 32.
„ caspicus „ „ 40.
„ cayennensis „ „ 38.
„ cornutus „ „ 34, 36.
„ cornutus minor „ „ 36.
„ cristatus „ „ 34.
„ cucullatus „ „ 38.
„ dominicus „ „ 47.
„ fluviatilis „ „ 43, 47.
„ fulica „ „ 48.
„ glacialis „ „ 30.
„ griseigena „ „ 38.
„ grylle „ „ 17.
„ hebridicus „ „ 43.
„ immer „ „ 30.
„ ludovicianus „ „ 47.
„ lumme „ „ 32.
„ major „ „ 38.
„ medius groenlandicus VI U. 28.
„ minor VI U. 15, 43.
„ naevius „ „ 38.
„ pacificus „ „ 31.
„ parotis „ „ 38.
„ parvus „ „ 43.
„ podiceps „ „ 47.
„ rubricollis „ „ 38.
„ septentrionalis „ „ 32.
„ stellatus „ „ 32.
Colymbus striatus VI U. 32.
„ subcristatus „ „ 38.
„ thomensis „ „ 36.
„ torquatus „ „ 30.
„ troile „ „ 15.
„ urinator „ „ 34.
comata (Ardea) V Ar. 32.
„ (Comatibis) V I. 9.
„ (Ibis) V I. 9.
Comatibis comata V I. 9.
Comatotis aurita IV Cur. 10.
comatus (Berenicornis) I Buc. 8.
„ (Buceros) „ „ 8.
„ (Buphus) V Ar. 32.
communis (Falco) II Fal. 1; II Acc. 32.
„ indicus (Falco) II Fal. 5.
„ minor (Falco) II Fal. 4; II Acc. 33.
„ (Nisus) II Ass. 28.
concentricus (Falco) II Ass. 51; II Acc. 98.
„ (Nisus) „ „ 51; „ „ 98.
concinna (Carpophaga) IV Col. 82.
„ (Pitta) III Pit. 10; III Pit. R. 14.
concinnus (Psittacus) III P. 114.
concolor (Coliphimus) I Cuc. 78.
„ (Corythaixoides) I Cuc. 78.
„ (Cyanocorax) I Cor. 49.
„ (Demiegretta) V Ar. 25.
„ (Falco) II Fal. 21, 25; II Acc. 40.
„ (Musophaga) I Cuc. 78.
„ (Rallus) V Ra. 17.
„ (Schizorrhis) I Cuc. 78.
concreta (Dacelo) III Al. 26; III Al. R. 18.
„ (Halcyon) III Al. 26.
concretus (Cuculus) I Cuc. 13
condor (Sarcorhamphus) II Vul. 1.
connivens (Athene) II Str. 39.
„ (Falco) „ „ 39.
„ (Noctua) „ „ 39; II Noc. 31.
Conostoma aemodium I Cor. 71.
conspicillata (Procellaria) VI Proc. 20.
„ (Psittacula) III P. 32.
conspicillatus (Catoptropelicanus) VI Pe. 36.
„ (Majequeus) VI Proc. 20.
„ (Pelecanus) VI Pe. 36.
„ (Psittaculus) III P. 32; III P. R. 8.
Conurus III P. 9; III P. R. 3.
Conurus acuticaudatus III P. 11; III P. R. 3.
„ aureus „ „ 19; „ „ 5.
„ auricapillus „ „ 18.
„ auriceps „ „ 106.
„ aurifrons III P. 15, 29; III P. R. 4.
„ aymara „ „ 16; „ „ 4.
„ aztec „ „ 21; „ „ 6.
„ cactorum „ „ 21; „ „ 5.
„ calita „ „ 16; „ „ 4.
„ callipterus „ „ 26; „ „ 7.
„ canicularis „ „ 19; „ „ 5.
„ carolinensis „ „ 17, 18; „ „ 5.
„ chlorolepidotus III P. 111.
„ chryseogenys III P. 21; III P. R. 5.
„ chrysosema „ „ 28.

Conurus chrysostomus III P. 103.
" coeruleo-barbatus " " 94.
" cruentatus IIIP.23; IIIP.R.6.
" cyanoliseos " " 9; " " 3.
" cyanops " " 11; " " 3.
" cyanopterus " " 25; " " 6.
" erythrochlorus " " 12.
" erythrogenys " " 12; IIIP.R.3.
" guianensis " " 12.
" guyanensis " " 9; IIIP.R.4.
" himalayanus " " 82.
" hoffmannii IIIP.R.6.
" holochlorus IIIP.13; " " 4.
" icterotis " " 97; " " 4.
" jandaya " " 18; " " 5.
" jugularis " " 29.
" leptorhynchus " " 22; IIIP.R.6.
" leucotis " " 24; " " 6.
" luciani " " 25; " " 6.
" luteus " " 16; " " 4.
" maugei " " 13; " " 4.
" monachus " " 15; " " 4.
" murinus " " 16.
" nanday " " 10; IIIP.R.3.
" nanus " " 14; " " 4.
" nobilis " " 8.
" ocularis IIIP.R.5.
" pachyrhynchus IIIP.11; " " 3.
" pavua " " 12.
" pertinax " " 20; IIIP.R.5.
" petzii " " 20; " " 5.
" phoenicurus " " 26; " " 7.
" rhodogaster " " 27; " " 7.
" rubrolarvatus " " 12
" sagittifer columboides III P. 83.
" smaragdinus IIIP.22; IIIP.R.6.
" solstitialis " " 17; IIIP.R.4.
" squamosus " " 23.
" tiriacula " " 14; IIIP.R.4.
" tui " " 29.
" venustus " " 96.
" viridissimus " " 14.
" vittatus " " 24; IIIP.R.6.
" wagleri " " 12; " " 3.
" weddellii " " 10; " " 3.
" xanthogenius " " 18; " " 5.
convexus (Buceros) I Buc. 7.
cookii (Anser) VI A. 106.
" (Cyanopica) I Cor. 42.
" (Psittacus) III P. 152, 153.
Cookilaria leucoptera VI Proc. 12.
" mollis " " 11.
" solandri " " 12.
cooperi (Actodromas) V Sc. 39.
" (Astur) II Ass. 18, 31, 35.
" (Buteo) II Acc. 107.
" (Falco) II Ass. 19.
" (Heteropygia) V Sc. 39.
" (Nisus) II Ass. 18; II Acc. 73.
" (Podiceps) VI U. 34.
" (Tringa) V Sc. 39.
coprotheres (Lestris parasitica) VI L. 47.
Coraces I Cor. 1.
Coraciae I Cor. 133.
Coracias " " 133.
Coracias abyssinica " " 134.
" affinis " " 136.
" afra " " 142.
" albifrons " " 134.
" angolensis " " 135.
" bengalensis " " 135.
" caudata " " 135.
" crinita " " 137.
" cyanogaster " " 136.
" garrulus " " 133.
" indica " " 135.
" levaillantii " " 137.
" madagascariensis " " 143.
" melanocephala " " 69.
" melanorhynchus " " 56.
" natalensis " " 135.
" nigra " " 78.
" nuchalis " " 137.
" orientalis " " 139.
" pacifica " " 139.
" papuensis " " 138.
" pilosa " " 135,137.
" sagittata " " 110.
" senegalensis " " 134.
" sinensis " " 68.
" strepera " " 124.
" temminckii " " 138.
" tibicen " " 125.
" vagabunda " " 77.
" varia " " 127.
Coracopsis melanorhyncha III P. 37.
coralensis (Kurutreron) IV Col. 14.
" (Ptilinopus) " " 14.
" (Ptilopus) " " 14.
corallina (Bruchigavia) VI L. 36.
corallirhynchus (Phoenicophaeus) I Cuc. 59.
corallirostris (Pionus) III P. 61.
corax (Corvus) I Cor. 11, 12.
Corbiveau " " 3.
Corcorax australis " " 56.
" melanorhynchus " " 56.
cordifera (Parra) V Ra. 66.
corensis (Columba) IV Col. 68.
" (Patagioenas) IV Col. 68.
Corethrura V Ra. 26.
Corethrura schomburgkii V Ra. 37.
Coridonyx giganteus I Cuc. 63.
" leucogaster " " 63.
" phasianus " " 63.
" variegatus " " 63.
Coriphilus dryas III P. 117.
" cuteles " " 112.
" fringillaceus " " 117.
" gouphili " " 117.
" iris " " 116.
" placentis " " 113.
" smaragdinus " " 117.
" solitarius " " 116.
" versicolor " " 115.
cormoranus (Carbo) VI Pe. 7.
corneliae (Eclectus) III P. R. 17.

corniculata (Lunda) VI U. 28.
corniculatum (Mormon) „ „ 28.
cornix (Corvus) I Cor. 6.
„ timoriensis „ „ 19.
cornuta (Anas) VI A. 67.
„ (Chimaerina) VI U. 26.
„ (Fulica) V Ra. 59.
„ (Lycornis) „ „ 59.
„ (Palamedea) „ „ 72.
cornutus (Chalybaeus) I Cor. 120.
„ (Colymbus) VI U. 34, 36.
„ (Dytes) VI U. 36.
„ minor (Colymbus) VI U. 36.
„ (Platycercus) III P. 95; III P. R. 39.
„ (Podiceps) VI U. 36.
„ (Psittacus) III P. 95.
coromanda (Alcedo) III Al. 25.
„ (Ardea) V Ar. 30.
„ (Dacelo) III Al. R. 16.
„ major (Halcyon) III Al. 25.
„ minor (Halcyon) „ „ 25.
coromandelensis (Bubulcus) V Ar. 30.
coromandeliana (Alcedo) III Al. 25.
„ (Anas) VI A. 76.
„ (Dacelo) III Al. 25; III Al. R. 16.
„ (Halcyon) III Al. 25.
„ minor (Dacelo) III Al. 25; III Al. R. 16.
coromandelicus (Cursorius) IV Cur. 13.
„ (Nettapus) VI A. 76.
coromandra (Strix) II Oti. 9.
coromandus (Bubo) „ „ 9; II Noc. 4.
„ (Coccystes) I Cuc. 43.
„ (Cuculus) „ „ 43.
coronata (Asturina) II Ase. 12; II Acc. 104.
„ (Columba) IV Col. 168.
„ (Dacelo) III Al. R. 30.
„ (Goura) IV Col. 168.
„ (Halcyon) III Al. 37, 38.
„ (Paralcyon) „ „ 38.
„ (Pitta) III Pit. R. 14.
coronatus (Asturina) II Ase. 12.
„ (Buceros) I Buc. 6, 12.
„ (Charadrius) IV Cur. 62.
„ (Circaëtus) II Ase. 12.
„ (Falco) II Ass. 3, 12.
„ (Garrulus) I Cor. 63.
„ (Harpyia) II Ase. 12.
„ (Psittacus) III P. 67.
„ (Spizaetus) II Ass 3; II Acc. 59.
„ (Stephanilyx) IV Cur. 62.
„ (Todirhamphus) III Al. 38.
„ (Thrasaëtus) II Ase. 12.
„ (Vanellus) IV Cur. 62.
corone (Corvus) I Cor. 17, 24.
Coronica fuliginosa „ „ 125.
„ strepera „ „ 124.
Coronideus hyacinthinus „ „ 46.
coronoides (Corvus) „ „ 18.
coronulatus (Ptilinopus) IV Col. 9.
„ (Ptilopus) „ „ 9.
corrugatus (Buceros) I Buc. 9.
Corvi I Cor. 1.
corvina (Megalaima) I Bucc. 30.
corvinus (Bucco) „ „ 30.
Corvultur albicollis I Cor. 3.
„ crassirostris „ „ 2.
Corvus „ „ 1.
Corvus advena „ „ 6.
„ affinis I Bucc. 88; „ „ 31.
„ albicollis „ „ 3.
„ americanus „ „ 24.
„ ater „ „ 77.
„ atricapillus „ „ 59.
„ australis I Bucc. 88; „ „ 18.
„ azureus „ „ 46.
„ bengalensis III Pit. 12.
„ brachyurus „ „ 11.
„ brevipennis I Cor. 22.
„ cacalotl „ „ 12.
„ cafer „ „ 3.
„ canadensis „ „ 65.
„ capensis „ „ 27.
„ capitalis „ „ 35.
„ carnivorus „ „ 12.
„ caryocatactes „ „ 37.
„ caurinus „ „ 24.
„ cayanus „ „ 51.
„ collaris „ „ 33.
„ corax „ „ 11, 12.
„ cornix „ „ 6.
„ corone „ „ 17, 24.
„ coronoides „ „ 18.
„ crassirostris „ „ 2.
„ cristatellus „ „ 50.
„ cristatus „ „ 62.
„ cryptoleucus „ „ 33.
„ culminatus „ „ 16, 22.
„ curvirostris „ „ 3.
„ cyaneus „ „ 41.
„ cyanoleucus „ „ 50.
„ cyanopogon „ „ 51.
„ dauricus „ „ 35.
„ enca „ „ 29.
„ erythrophthalmus „ „ 33.
„ erythrorhynchus „ „ 69.
„ europaea „ „ 39.
„ feroënsis „ „ 13.
„ floridanus „ „ 24.
„ frugilegus „ „ 25.
„ fuscicapillus „ „ 2, 20, 22.
„ galericulatus „ „ 66.
„ glandarius „ „ 57.
„ graculinus „ „ 124.
„ graculus „ „ 55.
„ gymnocephalus „ „ 54.
„ hyacinthinus „ „ 46.
„ illiceti „ „ 59.
„ impudiens „ „ 10.
„ intermedius „ „ 2, 16.
„ jamaicensis „ „ 25, 33.
„ japonensis „ „ 15.
„ leucognaphalus „ „ 32, 33.
„ leucomelas „ „ 13.

Corvus leuconotus I Cor. 3.
" leucophaeus " " 13.
" levaillantii " " 27.
" littoralis " " 12.
" macropterus " " 27.
" macrorhynchus " " 16, 19.
" madagascariensis " " 3.
" major " " 11.
" mexicanus " " 25, 63.
" minor " " 27, 29.
" minutus " " 24.
" monedula " " 33.
" montanus " " 11.
" morio " " 44.
" nasicus " " 32, 33.
" nasutus " " 33.
" neglectus " " 35.
" nobilis " " 12.
" orru " " 20, 22.
" ossifragus " " 24, 32, 33.
" palmarum " " 25.
" pastinator " " 25.
" pectoralis " " 5.
" peruvianus " " 53.
" phaiocephalus " " 3.
" philippensis III Pit. 2.
" philippinus I Cor. 22.
" pileatus " " 52.
" pyrrhocorax " " 55.
" pyrrhopterus " " 131
" rufulus " " 66.
" rufus " " 77.
" scapulatus " " 3.
" segetum " " 27.
" senegalensis " " 77.
" senex " " 22, 36.
" sinensis " " 16, 68, 76.
" solitarius " " 24.
" speciosus " " 68.
" spermolegus " " 33.
" splendens " " 10, 12.
" splendidus " " 50.
" thibetanus " " 13.
" torquatus " " 5.
" tricolor " " 50.
" tristis " " 36.
" umbrinus " " 19.
" validissimus " " 28.
" validus " " 29.
" varians " " 73.
" violaceus " " 31.
" vulturinus " " 3.
" yncas " " 53.
Corydonix bicolor I Cuc. 64.
" pyrrhopterus " " 65.
" viridis " " 65.
Corydonyx melanorhynchus " " 65.
Corythaeola cristata " " 77.
Corythaix burchellii " " 75.
" igniceps " " 75.
" leucotis " " 75.
" macrorhynchus " " 76.
" meriani " " 76.
Corythaix persa I Cuc. 76.
" purpureus " " 76.
" senegalensis " " 77.
" (Spelectos) " " 77.
Corythaixoides concolor " " 78.
Corythornis cyanostigma III Al. 11.
coscoroba (Anas) VI A. 83.
" chionis " " 83.
" (Cygnus) " " 83.
" (Olor) " " 83.
Coturnicops novaeboracensis V Ra. 26.
Coucal noiroux I Cuc. 64.
Coucou criard " " 16.
" de Madagascar " " 65.
" didric " " 31.
" du Cap de B. Espérance " " 9.
" noir I Bucc. 88.
" noir de Cayenne " " 91.
" petit de l'île Panay I Cuc. 21.
" solitaire " " 11.
" vulgaire " " 6.
coucous (Bondrées-) II Per. 3.
" siffleurs I Cuc. 21.
Coulacissi III P. 130.
coulacissi (Perruche) " " 130.
coxenii (Cyclopsitta) III P. R. 34.
" (Psittacula) " " 34.
Cracticus I Cor. 122.
Cracticus anaphonensis " " 123.
" argutus " " 123.
" cassicus " " 127.
" chalybaeus " " 122.
" cinereus " " 129.
" cuneicaudatus " " 123.
" fuliginosus " " 125.
" graculinus " " 124.
" gymnocephalus " " 130.
" hypoleucus " " 126.
" leucopterus " " 129.
" nigrogularis " " 128.
" picatus " " 128.
" quoyi " " 124.
" robustus " " 128.
" streperus " " 124.
" tibicen " " 125.
" torquatus " " 129.
" varius " " 127.
Craspedoenas IV Col. 65.
Craspedophora magnifica I Cor. 96.
Craspedophorus paradiseus " " 96.
crassirostris (Baza) II Acc. 135.
" (Blasipus) VI L. 8.
" (Catoptrophorus) V Sc. 76.
" (Charadrius) IV Cur. 31.
" (Chettusia) " " 60.
" (Corvultur) I Cor. 2.
" (Corvus) " " 2.
" (Cuculus) I Cuc. 17.
" (Cyanocitta) I Cor. 44.
" (Fulica) V Ra. 49.
" (Gallinula) V Ra. 49.
" (Larus) VI L. 8, 32.
" (Nycticorax) V Ar. 60.

crassirostris (Phalacotreron) IV Col. 47
" (Pitta) III Pit. R. 14.
" (Totanus) V Sc. 76.
" (Treron) IV Col. 47.
" (Tringa) V Sc. 28.
" (Vanellus) IV Cur. 60.
Crax cyanea I Cuc. 77.
Creagrus furcatus VI L. 44.
crecca (Anas) VI A. 52.
" (Nettion) VI A. 52.
" (Querquedula) " " 52.
creccoides (Anas) " " 59.
" (Querquedula) VI A. 59.
crepitans (Oedicnemus) IV Cur. 20.
" (Rallus) V Ra. 12.
Crex " " 24.
Crex dimidiata " " 27.
" femoralis " " 49.
" jardinii " " 27.
" lateralis " " 35.
" melampyga " " 14.
" mustelina " " 34.
" novaeboracensis " " 26.
" pratensis " " 25.
" pulchra " " 26.
" pygmaea " " 30.
" ruficollis " " 27.
" sandwichensis " " 25.
criard (Coucou) I Cuc. 16.
crinita (Coracias) I Cor. 137.
crispus (Pelecanus) VI Pe. 32.
cristata (Alcedo) III Al. 11; III Al. R. 6.
" (Anas) VI A. 28, 39.
" (Cacatua) III P. 143; III P R. 67.
" (Cacatua citrino-) III P. 140; III P. R. 66.
" (Choriotis) IV Cur. 8.
" (Columba) IV Col. 164.
" (Corythaeola) I Cuc. 77.
" (Cua) " " 46.
" (Dafila) VI A. 39.
" (Fulica) V Ra. 59.
" (Fuligula) VI A. 28.
" (Gallinula) V Ra. 39, 59.
" (Gallinulopha) V Ra. 40.
" (Geotrygon) IV Col. 164.
" (Guira) I Cuc. 43.
" (Ibis) V I. 6.
" (Lophaithya) VI U. 34.
" (Lophotibis) V I. 6.
" (Lupha) V Ra. 59.
" (Musophaga) I Cuc. 77.
" (Otis) IV Cur. 8.
" (Parra) V Ra. 68.
" (Plyctolophus citrino-) III P. 140.
" (Sasa) I Cuc. 81.
" (Starnoenas) IV Col. 164.
" (Sterna) VI Ster. 7.
" (Strix) II Oti. 16.
cristatella (Phaleris) VI U. 25.
" (Uria) " " 25.
cristatellus (Corvus) I Cor. 50.
" (Falco) II Ass. 7.
cristatellus (Phaleris) VI U. 25.
" (Simorhynchus) " " 25.
" (Tylorhamphus) " " 25.
cristatus (Bubo) II Oti. 16; II Noc. 6.
" (Buceros) I Buc. 16.
" (Charadrius) IV Cur. 60.
" (Coccyzus) I Cuc. 46.
" (Colymbus) VI U. 34.
" (Corvus) I Cor. 62.
" (Cuculus) I Cuc. 46.
" (Cuculus brasiliensis) " " 43.
" (Cyanogarrulus) I Cor. 62.
" demarestii (Graculus) VI Pe. 18.
" (Gallicrex) V Ra. 40.
" (Garrulus) I Cor. 62.
" (Graculus) VI Pe 18.
" (Hydralector) V Ra. 68.
" (Hypnodes) " " 40.
" (Mergus) VI A. 2.
" (Opisthocomus) I Cuc. 81.
" (Pelecanus) VI Pe. 18.
" (Pernis) II Per. 2; II Acc. 131.
" (Phasianus) I Cuc. 81.
" (Podiceps) VI U. 34.
" (Psittacus) III P. 143.
" (Ptiloleptus) I Cuc. 43.
" (Tantalus) V I. 6.
" (Vanellus) IV Cur. 56.
croceus (Plyctolophus) III P. 140.
Crocopus chlorogaster IV Col. 46.
" phoenicopterus " " 45.
" viridifrons " " 45.
crombus (Leptosomus) I Cuc. 36.
" madagascariensis I Cuc. 36.
Crossophthalmus gymnophthalmus IV Col. 69.
" reichenbachii " " 69.
Crotophaga I Cuc. 47.
Crotophaga ani " " 47.
" casassii " " 47.
" laevirostra " " 47.
" major " " 47.
" minor " " 47.
" pirigua " " 43.
" rugirostra " " 47.
" semisulcata " " 47.
" sulcirostris " " 47.
crow (Cayenne red-billed) I Bucc. 88.
" (Chattering) I Cor. 32.
" (Yellow necked carrion) II Vul. 4.
crucigera (Strix) II Oti. 21.
cruenta (Columba) IV Col. 157.
" (Phlegoenas) " " 157.
cruentatus (Conurus) III P. 23; III P. R. 6.
" (Psittacus) " " 23.
cruentus (Astur) II Ass. 40; II Acc. 80, 91.
" (Nisus) " " 40; " " 80.
crumenifera (Ardea) V Cic. 12.
" (Leptoptilos) " " 12.
" (Argala) " " 12.
" (Ciconia) " " 12.
" (Mycteria) " " 12.
cruziana (Columba) IV Col. 137.
" (Columbula) " " 137.

cruziana (Peristera) IV Col. 137.
Crypsirhina cucullata I Cor. 74.
" varians " " 73.
Crypticus martii III Mo. 4.
cryptoleucus (Corvus) I Cor. 33.
Cryptopelecanus trachyrhynchus III Pe. 35.
Cryptorhina leucoptera I Cor. 72.
" piapiac " " 78.
" poëcilorhynchus " " 78.
cryptoxanthus (Poiocephalus) III P. R. 9.
Cryptura cinerea VIII Ti. 20.
" coerulescens " " 23.
" fasciata " " 42.
" guazu " " 35.
" magna " " 13.
" sylvicola " " 29.
" tataupa " " 21.
" variegata " " 32.
Crypturus " " 19.
Crypturus adspersus " " 28.
" atricapillus " " 34.
" boucardi " " 26.
" cinereus " " 7,20.
" exiguus " " 22.
" erythropus " " 34.
" guttatus " " 12.
" maculosus " " 42.
" meserythrus " " 25.
" modestus " " 25.
" noctivagus " " 33.
" obsoletus " " 22
" parvirostris " " 22.
" perdicarius " " 40.
" pileatus " " 24.
" pileatus meserythrus " " 25.
" rufescens " " 35.
" sallaei " " 31.
" sovi " " 24.
" strigulosus " " 27.
" tataupa " " 21.
" undulatus " " 29.
" variegatus " " 32.
Cua I Cuc. 45.
Cua coerulea " " 46.
" cristata " " 46.
" delalandei " " 46.
" serriana " " 46.
cubicularius (Psittacus) III P. 81.
cuckow (Lark heeled) I Cuc. 67.
Cuculi " " 1.
cucullata (Ardea) V Ar. 60.
" (Crypsirhina) I Cor. 74.
" (Glaucopis) " " 74.
" (Pitta) III Pit. 4; III Pit. R. 5.
cucullati (Lari) VI L. 31.
cucullatus (Calherodias) V Ar. 60.
" (Charadrius) IV Cur. 35, 67.
" (Chroicocephalus) VI L. 37.
" (Colymbus) VI U. 38.
" (Larus) VI L. 36.
" (Lophodytes) VI A. 5.
" (Mergus) " " 5.
" (Nycticorax) V Ar. 60.
Cuculoides (Athene) II Str. 33.
" (Avicida) II Per. 6.
" (Baza) II Per. 6; II Acc. 133.
" (Falco) II Ass. 44; II Acc. 97.
" (Noctua) II Str. 33; II Noc. 27.
Cuculus I Cuc. 3.
Cuculus aëreus " " 50.
" afer " " 36, 44.
" albivertex " " 16.
" albopunctatus " " 28.
" albostrigatus " " 26.
" americanus " " 37.
" andalusiae " " 44.
" assimilis " " 23.
" ater I Bucc. 88.
" auratus I Cuc. 31.
" basalis " " 33.
" brasiliensis cristatus " " 43.
" bronzinus " " 26.
" canorinus " " 7.
" canoroides " " 7.
" canorus " " 4.
" canorus indicus " " 6.
" capensis " " 6, 9.
" cayanensis minor " " 59.
" cayanensis naevius " " 42.
" cayanus " " 58, 59.
" ceramensis " " 19.
" chalcites " " 33.
" chlorophaeus " " 51.
" chrysogaster " " 55.
" cineraceus " " 26.
" cinerascens " " 26.
" cinereus " " 26.
" cinerosus " " 37.
" clamosus " " 16.
" coeruleus " " 46.
" concretus " " 13.
" coromandus " " 43.
" crassirostris " " 17.
" cristatus " " 46.
" cupreus " " 29, 31.
" discolor " " 36.
" dominicus " " 37.
" dumetorum " " 23.
" erythrophthalmus " " 37.
" erythrorhynchus " " 55.
" fasciatus " " 21, 63.
" fasciolatus " " 23.
" flabelliformis " " 26.
" flavirostris " " 50.
" flavus " " 21.
" flindersi " " 20.
" fucatus " " 8.
" fugax " " 13, 15.
" gabonensis " " 11.
" galeritus " " 42.
" glandarius " " 44.
" guineensis viridis " " 76.
" guira " " 43.
" gularis " " 6.
" heuglini " " 11.
" himalayanus " " 7.

Cuculus hodgsoni I Cuc. 32.
" honoratus " " 16.
" hyperythrus " " 14.
" incertus " " 26.
" indicus " " 6, 17.
" insperatus " " 23.
" jacobinus " " 45.
" jamaicensis " " 39.
" klasii " " 30.
" lanceolatus " " 21.
" lepidus " " 8.
" leptodetus " " 6.
" leucolophus " " 16.
" lineatus " " 6, 8.
" lucidus " " 33, 35.
" lugubris " " 28.
" malayanus " " 33.
" macrourus " " 41.
" macrurus " " 44.
" megarhynchus " " 32.
" melanogaster " " 59.
" melanoleucus " " 45.
" melanorhynchus " " 20, 65.
" melissophanes " " 44.
" merulinus " " 21.
" mesites " " 8.
" metallicus " " 33.
" mexicanus " " 57.
" micropterus " " 12.
" neglectus " " 35.
" niger " " 27.
" nigrorufus " " 64.
" nisicolor " " 15.
" optatus " " 8.
" orientalis " " 16.
" palliodus " " 26.
" palliolatus " " 34.
" passerinus " " 27.
" persa " " 76.
" pica " " 45.
" pisanus " " 44.
" plagosus " " 33.
" pluvialis " " 39.
" poliocephalus " " 12.
" poliogaster " " 26.
" punctatus " " 16.
" punctulatus " " 42.
" pyrrhocephalus " " 53.
" pyrrhophanes " " 26.
" regulus " " 35.
" rubeculus " " 11.
" ruficollis " " 6.
" rufinus " " 68.
" rutilus " " 59.
" saturatus " " 7.
" scolopaceus " " 16.
" seniculus " " 38.
" sepulcralis " " 23.
" serratus " " 45.
" simus " " 27.
" sinensis I Cor. 69.
" smaragdineus I Cuc. 29.
" stoliarius " " 11.
Cuculus sonnerati I Cuc. 23.
" sonneratii " " 12.
" sparveroides " " 15.
" strenuus " " 15.
" striatus " " 7, 12.
" sumatranus " " 53.
" sumatrensis " " 52.
" swinhoei " " 7.
" taitensis " " 21.
" telephonus " " 7.
" tenebrosus I Bucc. 90.
" tenuirostris I Cuc. 7, 8, 23, 27.
" tolu " " 65.
" tranquillus I Bucc. 88.
" tymbonomus I Cuc. 23.
" vagans " " 15.
" variegatus " " 26.
" variolosus " " 26.
" varius " " 14.
" versicolor " " 33.
" vetula " " 39.
" viaticus " " 40.
" xanthorhynchus I Cuc. 32.
Cucupicus cafer I Bucc. 65.
culminata (Diomedea) VI Proc. 35.
culminatus (Corvus) I Cor. 16, 22.
cultratus (Buceros) I Buc. 18.
Cultrides geoffroyi I Cuc. 60.
Cultrunguis flavipes II Oti. 18.
cumingi (Dasylophus) I Cuc. 51.
" (Lepidogrammus) " " 51.
" (Phoenicophaës) " " 51.
cumingii (Megapodius) VIII Ti. 71.
Cuncuma aguia II Ase. 6.
cuneata (Columba) IV Col. 133.
" (Geopelia) " " 133.
" (Stictopelia) " " 133.
cuneicaudatus (Cracticus) I Cor. 123.
cunicularia (Athene) II Str. 30; II Noc. 27.
" (Noctua) " " 30; " " 27.
" (Strix) " " 30.
Cunio VIII Ti. 49
cuntur (Sarcorhamphus) II Vul. 1.
cuprea (Anas) VI A. 62.
" (Columba) IV Col. 165.
" (Parra) V Ra. 67.
" (Starnoenas) IV Col. 165.
cupreus (Cuculus) I Cuc. 29, 31.
curilicus (Puffinus) VI Proc. 26.
curonicus (Charadrius) IV Cur. 28.
Cursores " " 1.
Cursorius " " 11.
Cursorius aegyptius " " 14.
" asiaticus " " 13.
" bicinctus " " 11.
" burchellii " " 13.
" chalcopterus " " 12.
" charadrioides " " 14.
" cinctus " " 11.
" collaris " " 11.
" coromandelicus " " 13.
" europaeus " " 12.
" (Falcinellus) V Sc. 31.

Cursorius frenatus IV Cur. 13.
" gallicus IV Cur. 12.
" isabellinus " " 12.
" senegalensis " " 13.
curulco-barbatus (Conurus) III P. 94.
curuleus (Coccyzus) I Cuc. 46.
curvirostra (Columba) IV Col. 52.
" (Treron) " " 52.
curvirostris (Corvus) I Cor. 3.
" (Nothoprocta) VIII Ti. 41.
" (Nothura) " " 41.
" (Phoenicophaës) I Cuc. 49.
" (Rhynchaea) V Sc. 18.
" (Vanga) I Cor. 129.
cuvieri (Falco) II Acc. 39.
" jobiensis (Tallegallus) VIII Ti. 82.
" (Merops) III Me. 5.
" (Tallegallus) VIII Ti. 53, 80.
" (Rallus) V Ra. 13.
Cyanauchen cyanoptera VI A. 96.
" (Lorius) III P. 118; IIIP.R.54.
" (Psittacus) III P. 119.
cyanicollis (Capito) I Bucc. 16.
" (Eclectus) IIIP.44; IIIP.R.18,22.
" (Eurystomus) I Cor. 139.
" (Geoffroyus) III P. 44.
" (Psittacus) " " 44.
cyanipectus (Alcedo) III Al. 17; IIIAl.R.11.
" (Alcyone) " " 18; " " 11.
" (Merops) III Me. 10.
cyaniventris (Alcedo) III Al. R. 18.
" (Dacelo) " " 18.
cyanea (Ceyx) III Al. 17.
" (Crax) I Cuc. 77.
" (Cyanopica) I Cor. 42.
" (Pica) " " 41.
" (Pitta) III Pit. 2; III Pit. R. 4.
cyaneus (Circus) II Cir. 1; II Acc. 48.
" (Corvus) I Cor. 41.
" (Falco) II Cir 1, 2.
" hudsonius (Circus) II Cir. 2; II Acc. 48.
" (Psittacus) III P. 117.
cyanocapilla (Xanthocitta) I Cor. 53.
cyanocephala (Columba) IV Col. 166.
" (Starnoenas) " " 166.
cyanocephalus (Bucco) I Bucc. 30.
" (Dacelo) III Al. 24.
" (Palaeornis) III P. R. 35.
" (Psittacus) III P. 81.
cyanochlora (Psittacula) " " 31; III P. R. 8.
Cyanocitta beachii I Cor. 44.
" californica " " 64.
" crassirostris " " 44.
" floridana " " 64.
" galeata " " 63.
" ornata " " 47.
" sieberi " " 64.
" sordida " " 64.
" turcosa " " 48.
" ultramarina " " 64.
" woodhousei " " 64.
Cyanocorax I Cor. 44.
Cyanocorax affinis I Cor. 53.
" armillatus " " 48.
" azureus " " 46.
" beecheyi " " 44.
" bellus " " 50.
" cayanus " " 51.
" coeruleus " " 46.
" concolor " " 49.
" cyanoleucus " " 50.
" cyanomelas " " 47.
" cyanopogon " " 51.
" diesingii " " 52.
" geoffroyi " " 44.
" harrisii " " 46.
" heckelii " " 46.
" luxuosus " " 54.
" melanocyaneus " " 45.
" mystacalis " " 51.
" nanus " " 49.
" ornatus " " 47.
" pileatus " " 52.
" turcosus " " 48.
" unicolor " " 49.
" violaceus " " 46.
" yncas " " 53.
Cyanogarrulus cristatus I Cor. 62.
" diadematus " " 63.
cyanogaster (Amazona) IIIP.66; IIIP.R.30.
" (Baryphonus) III Mo. 6.
" (Coracias) I Cor. 136.
" (Galgulus) " " 136.
" (Merops) III Me. 8.
" (Psittacus) III P. 66.
cyanogastra (Triclaria) " " 66.
cyanogenia (Eos) " " 128.
" (Lorius) IIIP.128; IIIP.R.56,58.
cyanogrammus (Trichoglossus) III P. 109.
cyanogula (Psittacus) " " 60.
cyanogularis (Aratinga) " " 23.
cyanoleuca (Halcyon) III Al. R. 21.
cyanoleucus (Corvus) I Cor. 50.
" (Cyanocorax) " " 50.
Cyanolyseos patagonicus III P. 9.
" (Psittacus) " " 9.
cyanoliseus (Conurus) III P. 9; III P.R. 3.
cyanomelas (Cyanocorax) I Cor. 47.
" (Pica) " " 47.
" (Psittacus) III P. 94.
cyanonota (Pitta) III Pit. 8; III Pit. R. 1 3.
cyanopectus (Ceyx) III Al. 18.
Cyanopica cookii I Cor. 42.
" cyanea " " 42.
" melanocephala " " 42.
cyanopileata (Psittacula) III P. 131.
cyanopis (Psittacus) " " 50.
cyanopogon (Corvus) I Cor. 51.
" (Cyanocorax) " " 51.
Cyanops asiatica I Bucc. 17.
" (Bucco) " " 16.
" (Conurus) III P. 11; III P. R. 3.
" (Sula) VI Pe. 39.
cyanopsis (Cacatua) III P. 135.

cyanoptera (Anas) VI A. 51, 62.
" (Bernicla) " " 96.
" (Cyanauchen) " " 96.
" (Pitta) III Pit. 9; III Pit. R. 15.
" (Pterocyanea) VI A. 62.
cyanopterus (Anser) " " 96.
" (Conurus) III P. 25; III P. R. 6.
" discors VI A. 50.
" (Psittacus) III P. 25, 30.
cyanopus (Numenius) V Sc. 91.
cyanopygia (Psittacula) III P. 33.
cyanopygius (Platycercus) III P. R. 37.
" (Psittaculus) III P. 33; III P. R. 9.
Cyanorhamphus novae guineae III P. 106.
cyanorhyncha (Amazona) III P. 50; III P. R. 16.
" (Erismatura) VI A. 10.
cyanorhynchus (Psittacus) III P. 50.
cyanorrhos (Merops) III Me. 2.
cyanostigma (Alcedo) III Al. 11; III Al. R. 6.
" (Corythornis) III Al. 11.
cyanostriata (Eos) III P. 128.
cyanotis (Bucco) I Bucc. 28.
" (Dacelo) III Al. 22; III Al. R. 14.
" (Halcyon) III Al. 16.
" (Ispidina) " " 16.
" (Psittacus) III P. 57.
Cyanotreron cyanovirens IV Col. 30.
cyanovirens (Columba) " " 23, 30.
" (Cyanotreron) " " 30.
Cyanura macrolophus I Cor. 63.
" (Pitta) III Pit. 13; III Pit. R. 16.
Cyanurus bullockii I Cor. 43.
" colliei " " 43.
" (Psittacus) III P. 61.
" (Turdus) III Pit. 13.
cyclops (Strix) II Str. 6.
Cyclopsitta coxenii III P. R. 34.
" desmarestii III P. 75.
cygnoides (Anas) VI A. 106.
" (Anser) " " 106.
" (Cygnopsis) " " 106.
Cygnopsis cygnoides " " 106.
Cygnus " " 78.
Cygnus altumii " " 82.
" americanus " " 82.
" (Anas) " " 78, 81.
" anatoïdes " " 83.
" atratus " " 80.
" bewickii " " 82.
" buccinator " " 83.
" canadensis " " 105.
" chionis " " 83.
" coscoroba " " 83.
" ferus " " 81, 82.
" gibbus " " 78.
" immutabilis " " 78.
" islandicus " " 82.
" major " " 81.
" mansuetus " " 78.
" melanocephalus " " 79.
" melanorhinus " " 82.
Cygnus melanorhynchos VI A. 81.
" minor " " 82.
" musicus " " 81.
" nigricollis " " 79.
" novae hollandiae " " 80.
" olor " " 78, 81, 82.
" sibilus " " 78.
" xanthorinus " " 81.
cylindricus (Buceros) I Buc. 17.
Cymindis II Per. 7; II Acc. 136.
" cayanensis " " 9; " " 136.
" uncinatus " " 8; " " 136.
cyphos (Capito) I Bucc. 81.
" macrodactylus " " 81.
" macrorhynchos " " 76.

D.

Dacelo III Al. 18; III Al. R. 11.
Dacelo albicilla " " 42; " " 32.
" albiventris " " 31; " " 21.
" amauroptera " " 14.
" badia " " 28; III Al. R. 19.
" buccoides " " 21.
" cajeli III Al. R. 34.
" cervina III Al. 19; " " 11.
" chelicuti " " 32; " " 21.
" chloris " " 32; " " 21.
" cinereifrons " " 29; " " 20.
" cinnamomina " " 39; " " 29.
" concreta " " 26; " " 18.
" coromanda " " 16.
" coromandeliana III Al. 25; " " 16.
" " minor III Al. 25; III Al. R. 16.
" coronata III Al. R. 30.
" cyaniventris " " 18.
" cyanocephalus III Al. 24.
" cyanotis III Al. 22; III Al. R. 14.
" dea " " 43; " " 34.
" dillwynni " " 33.
" diops III Al. 41; " " 30.
" dryas " " 30; " " 20.
" fallax " " 32.
" forsteni III Al. 37; " " 21.
" fulgidus " " 24; " " 16.
" funebris " " 40; " " 30.
" fusca " " 28; " " 18.
" fuscicapilla " " 31.
" gaudichaudii " " 20; III Al. R. 11.
" gigas " " 19; " " 11.
" grayi " " 37; " " 28.
" gularis " " 19.
" hydrocharis III Al. 46; " " 41.
" lazuli " " 42; " " 31.
" leachii " " 20; " " 11.
" lepida " " 48; " " 34.
" lindsayi " " 23; " " 15.
" mac leayii " " 40; " " 30.
" macrorhina " " 22; " " 13.
" macrorhinus " " 22.
" madagascariensis III Al. R. 32.
" malimbica " " 20.

Dacelo melanops III Al. 21; III Al. R. 13.
" melanoptera " " 27; " " 18.
" melanura " " 49; " " 33.
" monachus " " 24.
" nigrocyanea III Al. R. 31.
" occidentalis " " 11.
" omnicolor III Al. 27.
" pileata " " 27; III Al. R. 18.
" princeps " " 24; " " 16.
" pulchella " " 21; " " 13.
" pygmaea " " 32.
" pyrrhopygia " " 39; III Al. R. 28.
" recurvirostris " " 29.
" reichenbachii " " 29.
" rubra III Al. 49; " " 33.
" rufidorsa " " 48; " " 33.
" sabrina " " 46; " " 34.
" sacra " " 38; " " 28.
" sancta " " 35; " " 26.
" sanghirensis " " 14.
" semicoerulea III Al. 29; " " 19.
" senegalensis " " 30; " " 21.
" striolata " " 31; " " 21.
" sylvia " " 47; " " 42.
" syma " " 23.
" torotoro " " 23; III Al. R. 15.
" tridactyla " " 33.
" tuta " " 29.
" tyro III Al. 20; " " 13.
" vagans " " 28.
" wallacei " " 34.
dactylatra (Sula) VI Pe. 39.
Dafila acuta VI A. 37.
" " americana " " 37.
" bahamensis " " 55.
" cristata " " 39.
" marmorata " " 63.
" spinicauda " " 38.
dalmatinus (Falco) II Cir. 4.
damacensis (Totanus) V Sc. 48.
" (Tringa) " " 48.
damarensis (Turtur) IV Col. 124.
Daption VI Proc. 8.
Daption capensis VI Proc. 14.
Daptrius ater II Pol. 7.
darwinii (Rhea) IV St. 7.
Dasylophus cumingi I Cuc. 51.
" superciliosus " " 51.
Dasyptilus fulgidus III P. 157.
" pecquetii " " 157.
Dasyrhamphus VI U. 1.
Dasyrhamphus adelia " " 4.
dauricus (Corvus) I Cor. 35.
dea (Alcedo) III Al. 43.
" (Dacelo) " " 43; III Al. R. 34.
" (Tanysiptera) III Al. 43; " " 34.
decussata (Ephialtes) II Oti. 21.
defresnianus (Psittacus) III P. 52.
degener (Falco) II Pol. 5.
deglandii (Melanetta) VI A. 17.
deiroleucos (Falco) II Fal. 24.
delalandei (Coccyzus) I Cuc. 46.
" (Cochlothraustes) " " 46.
delalandei (Cua) I Cuc. 46.
" (Hydrochelidon) VI Ster. 33.
" (Phalacotreron) IV Col. 49.
" (Serisoma) I Cuc. 46.
" (Treron) IV Col. 49.
delamottei (Scolopax) V Sc. 4.
" (Sterna) VI Ster. 32.
delawarensis (Larus) VI L. 22.
delicata (Scolopax) V Sc. 6.
delicatula (Strix) II Str. 4; II Noc. 16.
demersa (Diomedea) VI U. 8, 10.
demersus (Phaëton) VI U. 8, 10.
" (Spheniscus) VI U. 10.
Demiegretta concolor V Ar. 25.
Demi-egrettes V Ar. 20.
Dendrocitta I Cor. 74.
Dendrocitta albirostris " " 75.
" formosae " " 76.
" frontalis " " 75.
" leucogaster " " 74.
" occipitalis " " 75.
" pallida " " 77.
" rufa " " 77.
" sinensis " " 76.
" vagabunda " " 77.
Dendrocygna VI A. 84.
Dendrocygna affinis VI A. 76.
" arborea " " 84.
" arcuata " " 88, 89.
" " gouldii " " 88.
" " vagans " " 88.
" autumnalis " " 92.
" eytonii " " 87.
" fulva " " 87.
" guttata " " 85.
" guttulata " " 85.
" javanica " " 89.
" minor " " 89.
" vagans " " 88.
" viduata " " 90.
Dendrotreron hodgsonii IV Col. 71.
denhami (Otis) IV Cur. 7.
denisea (Columba) IV Col. 67.
derbyana (Chauna) V Ra. 72.
" (Palamedea) V Ra. 72.
derbyanus (Ischyornis) " " 72.
" (Palaeornis) III P. 85.
Derotypus accipitrinus " " 67.
desertorum (Buteo) II But. 5; II Acc. 106.
desolata (Aestrelata) VI Proc. 13.
" (Procellaria) " " 13.
" rostrata (Procellaria) " " 13.
desmarestii (Carbo) VI Pe. 18.
" (Cyclopsitta) III P. 75.
" (Graculus cristatus) VI Pe. 18.
" (Psittacula) III P. 75; III P. R. 32.
desmursii (Aquila) II Acc. 115.
destructor (Falco) II Ass. 25.
" (Harpyia) " " 25.
" (Vanga) I Cor. 129.
diabolica (Aestrelata) VI Proc. 11, 13.
diadema (Amazona) III P. R. 26, 27.

diadema (Psittacus) III P. 51; III P.R. 27.
diademata (Columba) IV Col. 8, 11.
" (Thouarsitreron) " " 11.
diadematus (Cyanogarrulus) I Cor. 63.
" (Eudyptes) VI U. 8.
" (Indicator) I Cuc. 2.
" (Laimodon) I Bucc. 9.
" (Pogonorhynchus) " " 9.
" (Ptilopus) IV Col. 11.
" (Spheniscus) VI U. 8.
diardi (Melias) I Cuc. 54.
" (Phoenicophaës) " " 54.
" (Zanclostomus) " " 54.
dicruroides (Pseudornis) " " 28.
didric (Coucou) " " 31.
Didunculus IV Col. 167.
Didunculus strigirostris " " 167.
Didus IV St. 3.
Didus borbonicus " " 3.
" ineptus " " 3.
diemensis (Alcedo) III Al. 17.
" (Alcyone) III Al. R. 9.
diesingii (Cyanocorax) I Cor. 52.
dillwynii (Ceyx) III Al. R. 33.
dillwynni (Dacelo) " " 33.
dilopha (Columba) IV Col. 74.
dilophus (Carbo) VI Pe. 22.
" (Phalacrocorax) " " 22.
dimidiata (Crex) V Ra. 27.
" (Gallinula) V Ra. 27.
" (Ortygometra) V Ra. 27.
dimidiatus (Carbo) VI Pe. 15.
" (Centropus) I Cuc. 68.
Dinornis IV St. 5.
diodon (Falco) II Fal. 34; II Acc. 47.
Diomedea VI Proc. 31.
Diomedea adusta " " 31.
" brachyura " " 32, 33.
" cauta " " 34.
" chilensis VI U. 10.
" chiloënsis " " 10.
" chlororhyncha VI Proc. 35.
" culminata " " 35.
" demersa VI U. 8, 10.
" epomophora VI Proc. 32.
" exulans " " 31.
" fuliginosa " " 35.
" melanophrys " " 33.
" nigripes " " 33.
diophthalma aruensis (Psittacula) III P. R. 33.
" (Psittacula) III P. 75; " " 32.
diophthalmorufo-ventro (Alcedo) III Al. 41.
diops (Alcedo) III Al. 41.
" (Dacelo) " " 41; III Al. R. 30.
" (Halcyon) " " 41.
Diphyllodes magnifica I Cor. 86.
" respublica " " 87.
" seleucides " " 86.
" speciosa " " 86.
Diplopterus chochi I Cuc. 42.
" excellens " " 42.
" naevius " " 42.
" phasianellus " " 41.
discolor (Cuculus) I Cuc. 36.
" (Leptosomus) " " 36.
" (Nanodes) III P. 114; III P.R. 53.
" (Psittacus) " " 114.
discors (Anas) VI A. 50.
" (Cyanopterus) " " 50.
" (Pterocyanea) " " 50.
" (Querquedula) " " 50.
discurus (Prioniturus) III P. 45.
dispar (Anas) VI A. 15.
" (Bernicla) " " 99.
" (Falco) II Mil. 8.
" (Fuligula) VI A. 15.
" (Stelleria) " " 15.
docilis (Palaeornis) III P. R. 35.
doeringii (Nothura) VIII Ti. 41.
Domicella atricapilla III P. 120.
" (Lorius) III P. 120; III P. R. 55.
" (Psittacus) III P. 120.
" schlegeli III P. R. 56.
domingensis (Megaceryle) III Al. 3.
dominica (Anas) VI A. 9.
" (Biziura) " " 9.
" (Erismatura) " " 9.
Dominicanus antipodum VI L. 13.
" azarae " " 13.
" fritzei " " 13.
" (Larus) " " 12.
" marinus " " 10.
" pelagicus " " 13.
" vetula " " 13.
dominicensis (Athene) II Str. 30; II Noc. 27.
" (Coccygus) I Cuc. 40.
" (Noctua) II Str. 14.
" (Pluvialis) IV Cur. 23.
" (Psittacus) III P. 58.
" (Querquedula) VI A. 9.
" (Saurothera) I Cuc. 40.
" (Strix) II Str. 30.
" (Tringa) V Sc. 39.
dominicus (Colymbus) VI U. 47.
" (Coccyzus) I Cuc. 37.
" (Cuculus) " " 37.
" (Podiceps) VI U. 47.
doreya (Macropygia) IV Col. 115.
doris (Tanysiptera) III Al. 46; III Al. R. 39.
dorsalis (Platycercus) III P. 91; III P. R. 37.
" (Psittacus) " " 91.
dougalli (Sterna) VI Ster. 24.
douglasii (Scolopax) V Sc. 6.
" (Sterna) VI Ster. 24.
" (Tringa) V Sc. 54.
douraca (Turtur) IV Col. 123.
Drepanoptera holosericea " " 41.
Drepanoptila holos ricea " " 41.
Dromajus IV St. 5, 7.
" irroratus " " 7.
" novae hollandiae " " 7.
Dromas VI Ster. 41.
" ardeola " " 41.
Dromiceius lessoni IV Cur. 47.
Dromococcyx mexicanus I Cuc. 41.
" phasianellus " " 41.

drummondi (Scolopax) V Sc. 6.
dryas (Coriphilus) III P. 117.
" (Dacelo) III Al. 30; III Al. R. 20.
" (Halcyon) " " 30.
dubia (Ardea) V Cic. 13.
" (Argala) " " 13.
" (Uria) VI U. 26.
dubius (Bucco) I Bucc. 1, 3.
" (Pogonorhynchus) " " 1.
dubusii (Leptopila) IV Col. 159.
duchaillui (Barbatula) I Bucc. 39.
" (Buccanodon) " " 39.
" (Megalaima) " " 39.
ducorpsii (Cacatua) III P. 142.
Dues II Noc. 1.
Ducula basilis IV Col. 96.
" cineracea " " 91.
" lacernulata " " 95.
" rosacea " " 88.
dufresniana (Amazona) IIIP.52; IIIP.R.27.
dumetorum (Cuculus) I Cuc. 23.
duperreyi (Megapodius) VIII Ti. 54, 57.
du petit thouarsii (Columba) IV Col. 13.
" (Ptilinopus) " " 14.
" (Ptilopus) " " 13.
" (Thouarsitreron) IV Col. 14.
dussumieri (Columba) IV Col. 120.
" (Falco) II Ass. 48.
" (Turtur) IV Col. 120.
duvauceli (Bubutus) I Cuc. 52.
" (Bucco) I Bucc. 28.
" (Megalaima) " " 28.
dysoni (Bucco) " " 77.
dysonymus (Cacomantis) I Cuc. 21.
Dysporus bassanus VI Pe. 37.
" parvus " " 41.
" sula " " 41.
Dytes cornutus VI U. 36.

E.

earli (Ocydromus) V Ra. 73.
eburnea (Pagophila) VI L. 6.
eburneus (Larus) " " 6.
écaillé (Lori) III P. 124.
ecaudatus (Circaëtus) IIBut.28; IIAcc.115.
" (Falco) " " 28; II Aq. 1.
" (Helotarsus) " " 28.
écaudé (Barbacou) I Bucc. 91.
Eclectus IIIP.38;IIIP.R.11.
" affinis " " 48; " " 25.
" cardinalis " " 39; " " 13.
" ceylanensis " " 39.
" corneliae III P. R. 17.
" cyanicollis IIIP.44;IIIP.R.18,22.
" flavicans " " 45; " " 23.
" grandis " " 38; " " 13.
" intermedius " " 41; " " 16.
" linnaei " " 38; " " 11.
" lucioniensis " " 48; " " 26.
" megalorhynchus III P. 46; III P. R. 23.
Eelectus mülleri IIIP.48;IIIP.R.25.
" personatus " " 42; " " 18.
" " aruensis " " 43; " " 18.
" platurus " " 45; " " 22.
" polychlorus " " 40; " " 14.
" rhodops " " 43; " " 18.
" setarius " " 22.
" westermanni IIIP.42; " " 16.
Ectopistes migratoria IV Col. 142.
edolius (Oxylophus) I Cuc. 45.
edwardii (Choriotis) IV Cur. 8.
" (Otis) " " 8.
edwardsii (Psittacus) III P. 103.
Egretta alba V Ar. 16.
" (Ardea) " " 16, 17.
" egrettoides " " 19.
" flavirostris " " 17.
" (Garzetta) " " 12.
" (Ibis) V I. 12.
" intermedia V Ar. 19.
" leuce " " 17.
" melanopus " " 19.
" melanorhyncha " " 16.
" modesta " " 17.
" pealii " " 21.
" plumifera " " 19.
" syrmatophora " " 17.
" thalassina " " 42.
Egrette intermediaire " " 19.
egrettoides (Ardea) V Ar. 16, 19.
" (Egretta) V Ar. 19.
Elanoides II Mil. 5.
Elanoides furcatus IIMil.5;IIAcc.129.
" leucurus " " 8.
" riocourii " " 5; IIAcc.129.
Elanus " " 6; " " 129.
Elanus axillaris " " 7,8; " " 130.
" caesius " " 6.
" hypoleucus " " 7; IIAcc.130.
" intermedius " " 7; " " 130.
" leucurus " " 8; " " 130.
" melanopterus " " 6; " " 130.
" minor " " 6.
" notatus " " 8.
" swainsonii " " 9; IIAcc.131.
" torquatus " " 9.
elatus (Buceros) I Buc. 18.
elegans (Bucco) I Bucc. 63.
" (Buteo) II Acc. 108.
" (Charadrius) IV Cur. 32.
" (Eubucco) I Bucc. 63.
" (Eudromia) VIII Ti. 48.
" (Euphema) III P. 103; III P.R. 41.
" (Gallinula) V Ra. 26.
" (Peristera) IV Col. 154.
" (Phaps) " " 154,
" (Pitta) III Pit. 11, 14; III Pit.R.17.
" (Psittacus) III P. 96.
" (Rallus) V Ra. 12.
" (Sterna) VI Ster. 7.
" (Thalasseus) VI Ster. 7.
eleonorae (Cacatua) III P. 135.
" (Falco) II Fal. 25; II Acc. 40.

elliotii (Tanysiptera) III Al. R. 40.
elongatus (Phoenicophaës) I Cuc. 55.
" (Rhopodytes) " " 55.
" (Zanclostomus) " " 55.
eloroides (Tringa) V Sc. 49.
elphinstonii (Lepidoenas) IV Col. 70.
" (Palumbus) " " 70.
" (Ptilinopus) " " 70.
eluta (Strix) II Str. 32.
emeu (Casuarius) IV St. 9.
emiliae (Tanysiptera) III Al. R. 39.
emiliana (Macropygia) IV Col. 109.
empusa (Actitis) V Sc. 80.
enca (Corvus) I Cor. 29.
Enicognathus leptorhynchus III P. 22.
Eniconetta stelleri VI A. 15.
Eos bernsteini III P. 124.
" bornea " " 128.
" cyanogenia " " 128.
" cyanostriata " " 128.
" fuscata " " 122.
" guttatus " " 128.
" indica " " 128.
" (Plyctolophus) " " 145.
" (Psittacus) " " 145.
" riciniata " " 125.
" rubiginosa " " 129.
" rubrifrons " " 122.
" scintillatus " " 122.
" semilarvata " " 124.
" torrida " " 122.
" wallacei III P. R. 57.
Épervier océanien II Ass. 43.
Ephialtes argentina II Oti. 21.
" decussata " " 21.
" flammeola " " 27.
" latipennis " " 20.
" lempyi " " 23.
" leucospila " " 23; II Noc. 11.
" longipennis " " 19.
" ocreata " " 26.
" sagittatus " " 23; II Noc. 9.
" scops " " 19.
" sylvicola II Noc. 8.
" watsonii II Oti. 21.
ephippiorhyncha (Ciconia) V Cic. 7.
" senegalensis V Cic. 7.
Epimachus I Cor. 93.
Epimachus albus " " 95.
" ater " " 96.
" magnificus " " 96.
" magnus " " 94.
" niger " " 94.
" paradiseus " " 97.
" regius " " 97.
" speciosus " " 94.
" superbus " " 94.
epomidis (Centropus) I Cuc. 71.
epomorpha (Diomedea) VI Proc. 32.
eques (Psittacus) III P. 81.
eremita (Megapodius) VIII Ti. 65.
Ereunetes petrificatus V Sc. 55.
" pusillus V Sc. 55.
Erismatura australis VI A. 11.
" cyanorhyncha " " 10.
" dominica " " 9.
" ferruginea " " 10.
" leucocephala " " 12.
" maccao " " 10.
" ortygoides " " 9.
" rubida " " 11.
" unifasciata " " 9.
Erodia amphilensis VI Ster. 41.
Erolia varia V Sc. 31.
" variegata V Sc. 31.
erythacus (Psittacus) III P. 37; III P. R. 10.
erythorhyncha (Anas) VI A. 56.
Erythra cinerea V Ra. 32.
" " media " " 32.
" " minima " " 32.
" leucomelana " " 42.
" phoenicura " " 41.
erythraeus (Phoenicopterus) VI A. 116.
Erythrauchaena humeralis IV Col. 130.
erythrauchen (Accipiter) II Acc. 78.
" (Nisus) II Ass. 39; " " 76, 78.
erythrina (Gallinula) V Ra. 41.
erythrocephala (Anas) VI A. 62.
erythrocephalus (Bucco) I Bucc. 53.
" (Capito) " " 63.
" (Eubucco) " " 63.
" (Psittacus) III P. 30, 81, 84.
" (Ptilinopus) IV Col. 33.
" (Turtur) " " 118.
erythrochlorus (Conurus) III P. 12.
erythrocnemia (Accipiter) II Ass. 31.
" (Nisus) II Acc. 70.
erythrocnemius (Accipiter) " " 70.
" (Nisus) II Ass. 46; II Acc. 70.
Erythroena pulcherrima IV Col. 44.
erythrofrons (Stylorhynchus) III P. 22.
erythrogaster (Alcedo) III Al. 29; III Al. R. 19.
" (Pitta) III Pit. 8; III Pit. R. 12.
" (Psittacus) III P. 23.
" (Conurus) " " 12; III P. R. 3.
" (Palaeornis) III P. 84.
" (Psittacara) " " 12.
erythrognathus (Phoenicophaës) I Cuc. 49.
Erythrogonys cinctus IV Cur. 59.
erythrolopha (Cacatua) III P. 142.
" (Musophaga) I Cuc. 75.
erythrolophus (Opaëthus) " " 75.
erythromelas (Ardeola) V Ar. 39.
" (Pogonia) I Bucc. .
erythronotus (Bucco) " " 42.
" (Buteo) II But. 12.
" (Poëcilopternis) " " 12.
erythrophrys (Turtur) IV Col. 121.
erythrophthalmus (Coccygus) I Cuc. 37.
" (Corvus) I Cor. 33.
" (Cuculus) I Cuc. 37.
erythropis (Psittacus) III P. 57.
erythrops (Psittacus) " " 59.
erythroptera (Columba) IV Col. 162.
" (Leptopila) " " 162.

erythroptera (Phlegoenas) IV Col. 162.
" (Strix) II Str. 34.
erythropterus (Mellitophagus) III Me. 10.
" (Merops) " " 10,11.
" (Platycercus) III P. 92; III P. R. 38.
" (Psittacus) III P. 92.
Erythropus amurensis II Acc. 46.
" (Anas) VI A. 104, 110.
" (Anser) " " 110, 111.
" (Colius) I Cuc. 79.
" (Crypturus) VIII Ti. 34.
" (Lymnicorax) V Ra. 35.
" (Nisus) II Ass. 35; II Acc. 77.
" (Porphyrio) V Ra. 54.
" (Tinamus) VIII Ti. 34.
erythropyga (Coccyzes) I Cuc. 42.
" (Lypornix) I Bucc. 67.
erythropygius (Colius) I Cuc. 79.
" (Geococcyx) " " 42.
" (Morococcyx) " " 42.
erythropygos (Tamatia) I Bucc. 67.
erythrorhyncha (Anas) VI A. 61.
" (Cissa) I Cor. 69.
" (Falcinellus) V I. 4.
" (Poëcilonetta) VI A. 56.
" (Querquedula) " " 56,61.
erythrorhynchus (Accipiter) II Ass. 48.
" (Buceros) I Buc. 14.
" (Corvus) I Cor. 69.
" (Cuculus) I Cuc. 55.
" (Pelecanus) VI Pe. 35.
Erythrosceles fuscus V Sc. 64.
" ocellatus V Sc. 64.
erythrothorax (Columba) IV Col. 160.
" (Euryzona) V Ra. 21.
" (Gallinula) " " 21.
" (Leptopila) IV Col. 160.
" (Rallina) V Ra. 21.
erythrurus (Psittacus) III P. 70.
Esacus recurvirostris IV Cur. 23.
etorques (Rallus) V Ra. 23.
Eubucco aurantiicollis I Bucc. 60.
" elegans " " 63.
" erythrocephalus " " 63.
" hartlaubi " " 61.
" richardsoni " " 59.
Eudocimus albus V I. 5.
" longirostris " " 5.
" ruber " " 6.
Eudromia VIII Ti. 46.
" elegans " " 48.
" pentlandii " " 47.
Eudromias australis IV Cur. 47.
" morinella " " 46.
Eudynamis I Cuc. 16.
Eudynamis australis " " 20.
" ceylonensis " " 17.
" chinensis " " 17.
" malayana " " 18.
" melanorhyncha " " 20.
" mindanensis " " 18.
" nigra " " 17.
Eudynamis orientalis I Cuc. 17, 19.
" picatus " " 19.
" punctatus " " 19, 20.
" ransomi " " 18.
" taitensis " " 21.
Eudyptes VI U. 1.
Eudyptes antarctica " " 5.
" antipoda " " 9.
" chrysocome " " 7.
" chrysolophus " " 7.
" diadematus " " 8.
" nigrivestis " " 6.
" pachyrhynchus " " 6.
Eudyptula " " 1.
Eudyptula undina " " 10.
eugeniae (Jotreron) IV Col. 22.
Euliga bartramia V Sc. 79.
eulophotes (Ardea) V Ar. 29.
" (Herodias) V Ar. 29.
Eulophus roseicapillus III P. 145.
" (Vultur) II Vul. 8.
Eumomota superciliaris III Mo. 7.
Eunetta bimaculata VI A. 54.
" falcata " " 72.
" formosa " " 54.
eupatria (Psittacus) III P. 76.
Euphema " " 100; III P. R. 40.
" aurantia " " 104.
" auriceps " " 106; III P. R. 42.
" bourkii " " 102; " " 41.
" chrysogaster " " 104; " " 41.
" chrysostoma " " 103; " " 41.
" elegans " " 103; " " 41.
" formosa " " 106; " " 42.
" haematogaster III P. 102; III P. R. 41.
" haematonota III P. 101; III P. R. 41.
" multicolor III P. 100; III P. R. 40.
" novae zeelandiae III P. 105; III P. R. 42.
" petrophila III P. 104; III P. R. 42.
" pulchella " " 103; " " 41.
" pulcherrima " " 101; " " 41.
" splendida " " 102; " " 41.
" undulata " " 105; " " 42.
euphrosiae (Melidora) III Al. 22.
Eupodotis caffra IV Cur. 7.
" ludwigii " " 7.
europaea (Corvus) I Cor. 39.
" (Pica) " " 39.
europaeus (Cursorius) IV Cur. 12.
" (Haematopus) " " 70.
" (Oedicnemus) " " 20.
eurycercus (Centropus) I Cuc. 66.
Eurynorhynchus V Sc. 50.
" pygmaeus V Sc. 50.
Eurypyga V Ra. 73.
Eurypyga helias V Ra. 73.
" major " " 74.
Eurystomus I Cor. 138.
" afer " " 142.
" azureus " " 141.

Eurystomus calornis I Cor. 139.
„ collaris „ „ 143.
„ cyanicollis „ „ 139
„ fuscicapillus „ „ 139.
„ gularis „ „ 139,143.
„ madagascariensis „ „ 143.
„ orientalis „ „ 139.
„ rubescens „ „ 142.
„ violaceus „ „ 143.
euryzona (Alcedo) III Al. 10; III Al. R. 5.
„ canningi V Ra. 19.
„ erythrothorax „ „ 21.
„ fasciata „ „ 19.
„ (Gallinula) „ „ 19.
„ isabellina „ „ 16.
„ rubiginosa „ „ 20.
euryzonoides (Gallinula) V Ra. 19.
euteles (Coriphilus) III P. 112.
„ (Nanodes) „ „ 112; IIIP.R.50.
„ (Psittacus) „ „ 112.
eutolmus (Hierax) II Fal. 33.
ewingii (Ptilinopus) IV Col. 5.
„ (Ptilopus) „ „ 5.
exaratus (Buceros) I Buc. 10.
excellens (Diplopterus) I Cuc. 42.
exiguus (Crypturus) VIII Ti. 22.
exilis (Ardea) V Ar. 39.
„ (Ardeola) V Ar. 39.
„ (Falco) II Ass. 30.
„ (Laterirallus) V Ra. 35.
„ (Loriculus) III P. R. 60.
„ (Porzana) V Ra. 35.
„ (Rallus) „ „ 35.
eximius (Platycercus) III P. 96; IIIP.R.39.
„ (Psittacus) „ „ 96.
exulans (Diomedea) VI Proc. 31.
eytoni (Leptotarsus) VI A. 87.
„ (Radja) „ „ 69.
eytonii (Dendrocygna) „ „ 87.

F.

faiostriatus (Bucco) I Bucc. 36.
faiostrictus (Bucco) „ „ 36.
falcaria (Anas) VI A 72.
falcata (Anas) „ „ 72.
„ (Eunetta) „ „ 72.
falcinella (Trynga) V Sc. 31.
Falcinellus bengalensis V I. 3.
„ cursorius V Sc. 31.
„ erythrorhyncha V I. 4.
„ guarauna „ „ 4.
„ (Ibis) „ „ 2.
„ igneus „ „ 2.
„ magnificus I Cor. 96.
„ mexicanus V I. 4.
„ ordii „ „ 4.
„ poregrinus „ „ 3.
„ (Tantalus) „ „ 2.
Falco abbreviatus II But. 11.
„ aegypius II Acc. 126.
„ aegyptius II Mil. 3.
„ aequinoctialis II But. 18.
Falco aeruginosus II Cir. 10.
„ aesalon II Fal. 19; II Acc. 37.
„ aguia II Ase. 5.
„ albescens II Ass. 3.
„ albicollis II Ase. 9.
„ albidus II But. 25.
„ albifrons „ „ 10.
„ albus II Ass. 20.
„ aldrovandi II Fal. 23.
„ alopex II Acc. 45.
„ americanus II Pol. 9.
„ angolensis II Aq. 18.
„ anthracinus II Ase. 8.
„ apivorus II Per. 1.
„ apoxypterus II Ass. 15.
„ aquilinus II Pol. 9.
„ arcadicus II Fal. 25.
„ ardosiacus II Fal. 21, 25; II Acc. 38.
„ armiger II Ass. 5.
„ ater II Mil. 2.
„ aterrimus II Pol. 7.
„ atricapillus II Ass. 14, 17.
„ augur II But. 16.
„ aurantius II Fal. 24; II Acc. 40.
„ australis „ „ 35; II Pol. 3.
„ axillaris II Mil. 8.
„ babylonicus II Fal. 15; II Acc. 35.
„ bacha II But. 26.
„ badius II Ass. 48.
„ barbarus II Fal. 5; II Acc. 34.
„ bellicosus II Ass. 5.
„ bengalensis II Fal. 33; II Acc. 47.
„ berigora „ „ 36; „ „ 47.
„ „ occidentalis II Fal. 36; II Acc. 47
„ beskii II Ass. 19, 30.
„ biarmicus II Fal. 16; II Acc. 36.
„ bidentatus „ „ 35; „ „ 47.
„ bido II But. 26.
„ binotatus II Ass. 34.
„ bonelli II Aq. 9.
„ borealis II But. 8.
„ boschii II Fal. 23; II Acc. 39.
„ brachypterus II Ass. 52.
„ brasiliensis II Pol. 2.
„ brunneus II Fal. 35.
„ busarellus II But. 17.
„ buson „ „ 17, 18.
„ buteo „ „ 3.
„ cachinnans II Ass. 26.
„ calidus II Acc. 32.
„ caligatus II Ass. 6; II Acc. 52.
„ canadensis II Aq. 1.
„ candicans II Fal. 7; II Acc. 34.
„ candicans islandicus II Fal. 14; II Acc. 34.
„ cayanensis II Per. 9.
„ cenchris II Fal. 29; II Acc. 45.
„ cenchroides „ „ 29; „ „ 45.
„ cervicalis „ „ 16; „ „ 36.
„ cheela II But. 25.
„ chiquera II Fal. 20; II Acc. 38.
„ chrysaëtos II Aq. 1.
„ cinerascens II Cir. 3.

Falco cinnamomeus II Fal. 30.
" cirratus II Acc. 52.
" coerulescens II Fal. 33; II Acc. 46.
" " bengalensis II Fal. 33; II Acc. 47
" columbarius II Fal. 19; II Acc. 37.
" communis " " 1; " " 32.
" communis indicus II Fal. 5.
" communis minor " " 4; II Acc. 33.
" concentricus II Ass. 51; II Acc. 98.
" concolor II Fal. 21, 25; " " 40.
" connivens II Str. 39.
" cooperi II Ass. 19.
" coronatus " " 3; II Ase. 12.
" cristatellus " " 7.
" cuculoides " " 44; II Acc. 97.
" cuvieri " " 39.
" cyaneus II Cir. 1, 2.
" dalmatinus " " 4.
" degener II Pol. 5.
" deiroleucos II Fal. 24.
" destructor II Ass. 25.
" diodon II Fal. 34; II Acc. 47.
" dispar II Mil. 8.
" dussumieri II Ass. 48.
" ecaudatus II But. 28; II Aq. 1.
" eleonorae II Fal. 25; II Acc. 40.
" exilis II Ass. 30.
" femoralis II Fal. 20; II Acc. 38.
" ferox II But. 9.
" ferrugineocauda " " 8.
" ferrugineus " " 2.
" formosus II Pol. 9.
" forskålii II Mil. 3.
" frontatus II Fal. 22; II Acc. 39.
" fulvus II Aq. 1.
" furcatus II Mil. 5.
" fuscus II Ass. 30.
" gabar " " 48.
" gallicus II But. 23.
" gentilis II Ass. 16.
" gironnieri II Fal. 34.
" gracilis II Ass. 53.
" griseiceps " " 23; II Acc. 66.
" guianensis " " 25.
" gularis II Ase. 4; II Acc. 101.
" gymnogenys II Ass. 54.
" gyrfalco II Fal. 11; II Acc. 34.
" " groenlandicus II Fal. 13; II Acc. 35.
" " islandicus II Fal. 14; II Acc. 34, 35.
" " norwegicus II Fal. 12; II Acc. 34.
" haliaëtus II Aq. 22; II Acc. 123.
" hamatus II Pol. 8.
" harpe II Fal. 35.
" hemidactylus II Ass. 53.
" hemilasius II But. 3.
" hendersoni II Acc. 36.
" hiogaster II Ass. 43; II Acc. 89.
" histrionicus II Cir. 5.
Falco hudsonius II Cir. 2.
" hydrophilus II But. 16.
" hyemalis " " 20.
" hypoleucos II Fal. 17; II Acc. 37.
" hypoxanthus II Ass. 16.
" ichthyaëtus II Aq. 17.
" imperialis " " 2.
" indicus II But. 22.
" indicus cirratus II Ass. 6; II Acc. 52.
" indus II Aq. 19; " " 119.
" insectivorus " " 100.
" islandicus II Fal. 7, 13.
" jackal II But. 14.
" jugger II Fal. 17; II Acc. 36.
" lacernulatus II Ase. 11.
" lagopus II But. 1, 2.
" lanarius II Fal. 14, 16; II Acc. 35.
" " capensis II Fal. 16; II Acc. 35.
" " graecus " " 15; " " 35.
" " nubicus " " 15; " " 35.
" latissimus II But. 20.
" leucaëtos II Ass. 20.
" leucauchen " " 50; II Acc. 98.
" leucocephalus II Aq. 12.
" leucogaster " " 14.
" leucopygus II Pol. 8.
" leucorrhous II Ase. 5.
" limnaëtus II Ass. 6.
" lineatus II But. 20.
" lithofalco II Fal. 19.
" liventer II But. 21.
" lophotes II Per. 4.
" lunulatus II Fal. 22; II Acc. 39.
" macei II Aq. 16.
" maculatus " " 6.
" macrocelides II Ass. 47.
" magnirostris II Ase. 3.
" malayensis II Aq. 11.
" maurus II Cir. 7.
" melanogenys II Fal. 3; II Acc. 32.
" melanoleucos II Cir. 7.
" melanops II Ase. 10.
" melanopterus II Mil. 6, 8.
" melanotis II Aq. 16.
" meridionalis II But. 17.
" mexicanus II Fal. 18.
" milvus II Mil. 1.
" minullus II Ass. 34.
" missisippensis II Mil. 10.
" mogilnik II Aq. 2.
" moluccensis II Fal. 28; II Acc. 42.
" monogrammicus II Ass. 24.
" musicus " " 20.
" naevioides II Aq. 3.
" naevius " " 6.
" neglectus II Acc. 43.
" newtonii " " 43.
" niger II But. 2.
" nigriceps II Acc. 32.
" nigricollis II But. 17.
" nisus II Ass. 28.
" nitidus II Ase. 1.
" novae hollandiae II Ass. 20.

Falco novae zeelandiae II Fal. 35; II Acc. 47; II Pol. 3.
" nudicollis II Pol. 9.
" occipitalis II Ass. 1.
" orientalis II Acc. 32.
" ornatus II Ass. 2.
" ossifraga II Aq. 11.
" ossifragus " " 12.
" palliatus II Per. 9.
" palumbarius II Ass. 16.
" palustris II Cir. 8.
" parasiticus II Mil. 3.
" pectoralis II Ass. 18.
" pennatus II Aq. 8.
" pennsylvanicus II But. 20; II Ass. 30.
" peregrinator II Fal. 5.
" peregrinoides " " 4, 15.
" peregrinus " " 1, 4.
" picatus II Ase. 10.
" pileatus II Ass. 35.
" piscator II Per. 6.
" plagiatus II Ase. 1.
" plumbeus II Mil. 10.
" poecilonatus II Ase. 10.
" poliogaster II Ass. 35, 43; II Acc. 71.
" poliogenys II But. 22.
" polyagrus II Fal. 18.
" polyzonus II Ass. 46.
" pondicerianus II Aq. 19; II Acc. 119.
" pterocles II But. 13.
" ptilonorhynchus II Per. 2.
" punctatus II Fal. 28; II Acc. 44.
" puniceus " " 5.
" radiatus II Acc. 79; II Ass. 15.
" rapax II Aq. 3.
" regalis II Ass. 17.
" religiosus II Acc. 39.
" rhadama " " 32.
" riocourii II Mil. 5.
" ruber II Fal. 5; II Acc. 34.
" " indicus II Fal. 5.
" ruficollis II Fal. 20.
" rufifrons II Mil. 9.
" rufigularis II Fal. 24.
" rufinus II But. 10.
" rufipes II Fal. 32.
" rupicola " " 27; II Acc. 41.
" rupicoloides II Fal. 29; II Acc. 43.
" rutilans II But. 17.
" saker II Fal. 16; II Acc. 36.
" sancti johannis II But. 2.
" scotopterus II Ase. 11.
" senegallus II Aq. 3.
" sericeus II Fal. 34; II Acc. 47.
" severus " " 23; " " 39.
" shahin " " 5.
" smithii " " 29; II Acc. 43.
" soloënsis II Ass. 44; " " 97.
" sparverius II Fal. 30; " " 45.
" sparveroides II Fal. 30.
" subbuteo " " 22.
" " frontatus II Fal. 22; II Acc. 39.
" subniger II Fal. 17; II Acc. 37.
Falco sultaneus II Fal. 5.
" tachiro II Ass. 46.
" tanypterus II Fal. 16; II Acc. 36.
" tibialis " " 16.
" tinnunculoides II Fal. 29.
" tinnunculus " " 25; II Acc. 41.
" tinus II Ass. 33.
" torquatus II Ass. 39; II Acc. 91.
" trinotatus " " 45; " " 90.
" trivirgatus " " 22.
" tyrannus " " 2.
" uliginosus II Cir. 2.
" unduliventer II Ass. 46.
" uncinatus II Per. 8.
" unicinctus II Ase. 2.
" urubitinga " " 6.
" velox II Ass. 30.
" vespertinus II Fal. 32; II Acc. 46.
" vespertinus amurensis " " 46.
" virgatus II Ass. 32; " " 74.
" vitticaudus II Per. 8.
" vocifer II Aq. 16.
" vulturinus II Aq. 9.
" wilsonii II But. 20.
" xanthonyx II Fal. 29.
" xanthothorax II Ass. 50; II Acc. 98.
" zonarius " " 47.
" zoniventris II Acc. 37.
Falcones II Fal. 1; " " 32.
falklandicus (Charadrius) IV Cur. 36.
fallax (Ceycopsis) III Al. R. 32.
" (Chloroenas) IV Col. 80.
" (Dacelo) III Al. R. 32.
" (Turtur) IV Col. 124.
familiaris (Tadorna) VI A. 67.
farinosa (Amazona) III P. 52; III P. R. 27.
farinosus (Psittacus) " " 52.
fasciata (Anas) VI A. 36.
" (Ardea) V Ar. 53.
" (Chloroenas) IV Col. 67.
" (Columba) " " 67.
" (Cryptura) VIII Ti. 42.
" (Euryzona) V Ra. 19.
" (Ortygometra) V Ra. 30.
" (Rallina) V Ra. 19.
" (Strix) II Str. 14.
" (Tigrisoma) V Ar. 52.
" (Tringa) IV Cur. 58.
" (Ulula) II Str. 13; II Noc. 19.
fasciatus (Circaëtus) II Acc. 112.
" (Astur) " " 79.
" (Bucéros) I Buc. 12.
" (Cúculus) I Cuc. 21, 63.
" (Ibicter) II Acc. 137.
" (Palaeornis) III P. R. 36.
" (Ptilinopus) IV Col. 6.
" (Ptilopus) " " 6.
" (Rallus) V Ra. 19.
" (Rhynchotus) VIII Ti. 35.
fasciolata (Scolopax) V Sc. 6.
fasciolatus (Bubo) II Oti. 15; II Noc. 6.
" (Circaëtus) II Acc. 112.
" (Cúculus) I Cuc. 23.

fasciolatus (Spizaetus) II Ass. 9.
Faucon à culotte noire II Fal. 16.
„ pêcheur II Per. 6.
„ huppé „ „ 6.
fedoa (Limicola) V Sc. 23.
„ (Limosa) „ „ 23.
„ (Scolopax) „ „ 23.
„ tereckensis „ „ 77.
feliciae (Chizaerrhis) I Cuc. 78.
femoralis (Amaurornis) V Ra. 50.
„ (Bidens) II Fal. 34.
„ (Crex) V Ra. 49.
„ (Falco) II Fal. 20; II Acc. 38.
„ (Numenius) V Sc. 94.
ferina (Anas) VI A. 23.
„ (Aythyia) VI A. 23.
„ (Fuligula) „ „ 23.
„ (Nyroca) „ „ 23.
feroënsis (Corvus) I Cor. 13.
ferox (Buteo) II But. 9; II Acc. 107.
„ (Falco) „ „ 9.
„ (Otis) IV Cur. 4.
„ (Strix) II Str. 32.
ferrago (Columba) IV Col. 118.
ferruginea (Anas) IV A. 30.
„ (Athene) II Str. 30.
„ (Biziura) IV A. 10.
„ (Columba) IV Col. 57.
„ (Erismatura) VI A. 10.
„ (Lophophaps) IV Col. 155.
„ (Noctua) II Str. 30; II Noc. 29.
„ (Strix) „ „ 30.
„ (Tringa) V Sc. 29.
ferrugineocauda (Falco) II But. 8.
ferrugineus (Falco) „ „ 2.
„ (Nisus) II Ass. 31; II Acc. 70.
ferus (Anser) VI A. 109.
„ (Cygnus) „ „ 81, 82.
„ (Turtur risorius) IV Col. 123.
festiva (Amazona) III P. 57; III P. R. 28.
festivus (Psittacus) „ „ 57.
fiber (Pelecanus) VI Pe. 41.
„ (Sula) „ „ 41.
fimbriata (Anas) VI A. 55.
fimbriatus (Phalaropus) V Sc. 60.
fissipes (Hydrochelidon) VI Ster. 29.
„ (Sterna) „ „ 29, 31.
fistulans (Gallinula) V Ra. 45.
„ (Totanus) V Sc. 61.
fistularis (Anas) VI A. 44.
fistulator (Buceros) I Buc. 16.
fitzroyi (Columba) IV Col. 67.
flabelliformis (Cacomantis) I Cuc. 26.
„ (Cuculus) „ „ 26.
flammea americana (Strix) II Str. 4; II Noc. 16.
„ (Strix) „ „ 1; „ „ 15.
flammeola (Ephialtes) II Oti. 27.
„ (Scops) „ „ 27; II Noc. 14.
flammipes (Psittacus) III P. 33.
flava (Ardea) V Ar. 52.
flaveolus (Platycercus) III P. 95; III P. R. 39.
flavicans (Eclectus) „ „ 45; „ „ 23.
„ (Prioniturus) „ „ 45.
flavicincta (Mimeta) I Cor. 110.
flavicinctus (Oriolus) „ „ 110.
flavicollis (Ardea) V Ar. 45, 46.
„ (Ardetta) „ „ 46.
flavicollis australis (Ardea) V Ar. 46.
„ (Bucco) I Bucc. 24.
„ (Micropogon) I Bucc. 55.
„ (Ptilonopus) IV Col. 5.
„ (Ptilopus) „ „ 5.
flavifrons (Bucco) I Bucc. 23.
„ (Megalaima) I Bucc. 23.
„ (Pionus) III P. 35.
„ (Psittacus) „ „ 35; III P. R. 9.
flavigaster (Columba) IV Col. 11.
„ (Platycercus) III P. 98; III P. R. 40.
„ (Psittacus) „ „ 98.
flavigula (Bucco) I Bucc. 24.
„ (Megalaima) I Bucc. 24.
flavilarvata (Aptenodytes) VI U. 9.
flavimentum (Barbatula) I Bucc. 44.
flavinuchus (Psittacus) III P. 52.
flavipectus (Ptilonopus) IV Col. 5.
flavipes (Bubo) II Oti. 18; II Noc. 7.
„ (Cultrunguis) II Oti. 18.
„ (Gallinula) V Ra. 45.
„ (Gambetta) IV Sc. 69.
„ (Ketupa) II Oti. 18.
„ (Platalea) V Cic. 24.
„ (Plateibis) V Cic. 24.
„ (Scolopax) IV Sc. 69.
„ (Spatherodia) V Cic. 24.
„ (Totanus) V Sc. 69.
„ (Vanellus) IV Cur. 59.
flavipunctatus (Tricholaema) I Bucc. 11.
flavirostra (Gallinula) V Ra. 34.
„ (Porphyrio) „ „ 39.
flavirostris (Anas) VI A. 44, 59.
„ (Ardea) V Ar. 17.
„ (Buceros) I Buc. 14.
„ (Chloroenas) IV Col. 78.
„ (Cissa) I Cor. 70.
„ (Coccystes) I Cuc. 37.
„ (Columba) IV Col. 78.
„ (Cuculus) I Cuc. 50.
„ (Egretta) V Ar. 17.
„ (Fulica) V Ra. 34, 39.
„ (Halcyon) III Al. 23.
„ (Monasa) I Bucc. 89.
„ (Phaëton) VI Pe. 43.
„ (Phoenicophaës) I Cuc. 50.
„ (Psittacus) III P. 61.
„ (Rhynchops) VI Ster. 40.
„ (Sima) III Al. R. 15.
„ (Urocissa) I Cor. 70.
„ (Zanclostomus) I Cuc. 50.
flavisquamata (Barbatula) I Bucc. 47.
flaviventer (Porzana) V Ra. 31.
„ (Rallus) „ „ 31.
flaviventris (Aratinga) III P. 21.
„ (Indicator) I Cuc. 1.
„ (Oriolus) I Cor. 116.
„ (Platycercus) III. P. 98.
„ (Sphecotheres) I Cor. 116.

flavocinctus (Mimetes) I Cor. 110.
flavogularis (Osmotreron) IV Col. 52.
flavoscapulatus (Psittacus) III P. 36.
flavoviridis (Trichoglossus) III P. R. 49.
flavus (Cuculus) I Cuc. 21.
flindersi (Cuculus) „ „ 20.
florensis (Athene) II Noc. 23.
„ (Ptilopus cinctus) IV Col. 34.
florentis (Psittacula) III P. 115.
floresiana (Pelargopsis) III Al. R. 7.
floridana (Cyanocitta) I Cor. 64.
floridanus (Corvus) „ „ 24.
„ (Garrulus) „ „ 64.
„ (Glottis) IV Sc. 61.
„ (Graculus) VI Pe. 23.
„ (Phalacrocorax) „ „ 23.
floris (Treron) IV Col. 59.
fluminea (Porzana) V Ra. 30.
fluviatilis (Charadrius) IV Cur. 28.
„ (Colymbus) VI U. 43, 47.
„ (Sterna) VI Ster. 17, 33.
foetens (Cathartes) II Vul. 3.
Fou intermédiaire VI Pe. 38.
formosa (Anas) VI A. 54.
„ (Barbatula) I Bucc. 39.
„ (Carpophaga) IV Col. 40.
„ (Eunetta) VI A. 54.
„ (Euphema) III P. 106; III P.R.42.
„ (Pica) I Cor. 43.
„ (Querquedula) VI A. 54.
formosae (Dendrocitta) I Cor. 76.
„ (Glaucopis) „ „ 76.
formosana (Chalcophaps) IV Col. 146.
formosus (Falco) II Pol. 9.
„ (Pezoporus) III P. 106.
„ (Psittacus) „ „ 106.
„ (Ptilinopus) IV Col. 30.
forskålii (Falco) II Mil. 3.
forsteni (Brachyurus) III Pit. 4.
„ (Carpophaga) IV Col. 93.
„ (Dacelo) III Al. 37; III Al. R. 21.
„ (Halcyon) III Al. 37.
„ (Hemiphaga) IV Col. 93.
„ (Merops) III Me. 8.
„ (Mimeta) I Cor. 112.
„ (Oriolus) „ „ 112.
„ (Psittacus) III P. 111.
„ (Trichoglossus) III P. 111; III P. R. 46.
forstenii (Megapodius) VIII Ti. 70.
„ (Meropogon) III Me. 8.
forsteri (Aptenodytes) VI U. 3.
„ (Columba) IV Col. 8.
„ (Sterna) VI Ster. 19.
„ (Strix) II Noc. 16.
fortis (Athene) II Str. 39.
francesii (Accipiter) II Acc. 94.
„ (Nisus) „ „ 94.
francisci (Centropus) I Cuc. 71.
franklini (Chroicocephalus) VI L. 37.
„ (Larus) „ „ 36.
franklinii (Bucco) I Bucc. 20.
„ (Megalaima) „ „ 20.
fransenii (Noctua) II Noc. 31.
frantzii (Trachytelmus) VIII Ti. 18.
fraseri (Pelargopsis) III Al. R. 7.
„ (Tympanistria) IV Col. 143.
Fratercula VI U. 28.
fratercula (Mormon) VI U. 28.
fraterculus (Grus) V Ra. 2.
Fregata VI Pe. 1.
Fregata aquila „ „ 2.
„ minor „ „ 3.
„ (Pelagodroma) VI Proc. 5.
„ (Procellaria) „ „ 5.
Fregatta melanogastra „ „ 6.
„ tropica „ „ 4.
Fregilus graculus I Cor. 55.
„ himalayanus „ „ 55.
frenata (Anas) VI A. 26.
„ (Gallinago) V Sc. 9.
„ (Marila) VI A. 26.
„ (Scolopax) V Sc. 9.
„ (Sterna) VI Ster. 23.
„ (Tringa) V Sc. 49.
frenatus (Cursorius) IV Cur. 13.
„ (Merops) III Me. 8.
„ (Oedicnemus) IV Cur. 18.
„ (Phalaropus) V Sc. 60.
fretensis (Anas) VI A. 57.
freti hudsonis (Ardea) V Ar. 49.
„ (Botaurus) V Ar. 49.
freycinetii (Megapodius) VIII Ti. 66.
fringillaceus (Coriphilus) III P. 117.
„ (Nanodes) „ „ 117; III P. R. 53.
„ (Psittacus) III P. 117.
fringillarius (Accipiter) II Ass. 28.
„ (Nisus) II Ass. 28; II Acc. 68.
fringilloides (Accipiter) „ „ 69.
fritzei (Dominicanus) VI L. 13.
frontalis (Anser) VI A. 110.
„ (Athene) II Str. 8.
„ (Bucco) I Bucc. 28.
„ (Charadrius) IV Cur. 34, 63.
„ (Dendrocitta) I Cor. 75.
„ (Glaucopis) „ „ 76.
„ (Oriolus) „ „ 105.
„ (Psittacus) III P. 24.
„ (Sterna) VI Ster. 24.
„ (Strix) II Noc. 18.
„ (Thalassea) VI Ster. 24.
frontata (Fulica) V Ra. 63.
„ (Gallinula) V Ra. 44.
frontatus (Falco) II Fal. 22; II Acc. 39.
„ (Falco subbuteo) II Fal. 22; II Acc. 39.
frugilegus (Corvus) I Cor. 25.
fucatus (Cuculus) I Cuc. 8.
fucosa (Aquila) II Aq. 10.
fugax (Cuculus) I Cuc. 13, 15.
fulgidus (Dacelo) III Al. 24; III Al. R. 16.
„ (Dasyptilus) III P. 157.
„ (Halcyon) III Al. 24.
„ (Psittacus banksianus) III P. 157.
Fulica V Ra. 58.
Fulica alaï V Ra. 61, 63.

Fulica alba V Ra. 52.
" americana " " 63.
" ardesiaca " " 63.
" armillata " " 63.
" aterrima " " 60.
" atra " " 60, 63.
" australis " " 62.
" cayennensis " " 14, 17.
" chilensis " " 63.
" chinensis " " 41.
" chloropoides " " 63.
" cinerea " " 39.
" cinereicollis " " 62.
" (Colymbus) VI U. 48.
" cornuta V Ra. 59.
" crassirostris " " 49.
" cristata " " 59.
" flavirostris " " 34, 39.
" frontata " " 63.
" gallinuloides " " 64.
" gigantea " " 59.
" (Heliornis) VI U. 48.
" leucoptera V Ra. 64.
" leucopyga " " 63, 64.
" lugubris " " 62.
" martinica " " 38.
" martinicensis " " 38.
" novaeboracensis " " 26.
" parva " " 39.
" porphyrio " " 54, 55.
" purpurea " " 38.
" ruficollis " " 15.
" rufifrons " " 64.
" stricklandii " " 63.
" wilsonii " " 63.
fulicarius (Heliornis) VI U. 49.
" (Phalaropus) V Sc. 58.
" (Tringa) " " 58.
fuliginosa (Anas) VI A. 16.
" (Coronica) I Cor. 125.
" (Diomedea) VI Proc. 35.
" (Gambetta) V Sc. 74.
" (Gymnobucco) I Bucc. 51.
" (Halyplana) VI Ster. 25.
" (Nectris) VI Proc. 8, 26.
" (Phoebetria) VI Proc. 35.
" (Procellaria) " " 8.
" (Sterna) VI Ster. 25, 26.
" (Strepera) I Cor. 125.
fuliginosus (Buteo) II Acc. 107.
" (Calorhamphus) I Bucc. 73.
" (Cracticus) I Cor. 125.
" (Haematopus) IV Cur. 75.
" (Larus) VI L. 9.
" (Leucophaeus) " " 9.
" (Micropogon) I Bucc. 73.
" (Puffinus) VI Proc. 26.
" (Totanus) V Sc. 74.
Fuligula VI A. 13.
Fuligula affinis " " 28.
" albeola " " 22.
" americana " " 19.
" (Anas) " " 28.
Fuligula australis VI A. 30.
" capensis " " 31.
" cinerea " " 13.
" clangula " " 20.
" collaris " " 26.
" cristata " " 28.
" dispar " " 15.
" ferina " " 23.
" fusca " " 16.
" gesneri " " 26.
" glacialis " " 23.
" histrionica " " 22.
" islandica " " 21.
" labradoria " " 19.
" marila " " 26.
" mariloides " " 28.
" melanocephala " " 32.
" metopias " " 32.
" minor " " 28.
" mitrata V Ra. 59.
" mollissima VI A. 14.
" nigra " " 18.
" novae zeelandiae " " 29.
" nyroca " " 30.
" peposaca " " 31.
" perspicillata " " 16.
" rufina " " 25.
" spectabilis " " 13.
" (Sterna) VI Ster. 26.
" valisneriana VI A. 25.
" viola VI A. 73.
Fulix collaris " " 26.
" marila " " 26.
Fulmarus VI Proc. 18.
Fulmarus auduboni " " 21.
" glacialis " " 21.
" minor " " 21.
fulva (Anas) VI A. 87.
" (Aquila) II Aq. 1; II Acc. 115.
" (Dendrocygna) VI A. 87.
" (Otis) IV Cur. 10.
" (Rhynchops) VI Ster. 39.
fulvescens (Aquila) II Acc. 115.
" (Syrnium) II Noc. 19.
" (Ulula) " " 19.
fulvicollis (Columba) IV Col. 57.
" (Treron) " " 57.
fulvus americanus (Pluvialis) IV Cur. 53.
" (Charadrius) " " 50.
" (Falco) II Aq. 1.
" (Gyps) II Vul. 6.
" indicus (Vultur) II Vul. 7; II Acc. 140.
" kolbei (Vultur) " " 7; " " 140.
" occidentalis (Vultur) " " 6; " " 140.
" orientalis (Vultur) " " 6; " " 140.
" (Pluvialis) IV Cur. 50.
" rüppellii (Vultur) II Vul. 7; II Acc. 140.
" (Vultur) " " 6; " " 140.
funebris (Dacelo) III Al. 40; III Al. R. 30.
" (Halcyon) III Al. 40.
" (Todirhamphus) " " 40.
funerea (Nyctale) II Str. 8.
" (Strix) " " 8, 42.

funerea (Surnia) II Str. 42.
" (Ulula) " " 8; II Noc. 18.
funereus (Calyptorhynchus) III P. 155; P. R. 70.
" (Circaëtus) II But. 25.
" (Psittacus) III P. 155.
Funingus madagascariensis IV Col. 42.
" sganzini " " 43.
furcata (Oceanodroma) VI Proc. 3.
" (Procellaria) " " 3.
" (Stix) II Str. 5.
furcatus (Creagrus) VI L. 44.
" (Elanoides) II Mil. 5; IIAcc. 129.
" (Falco) " " 5.
" (Larus) VI L. 44.
" (Nauclerus) II Mil. 5; II Acc. 129.
" (Ptilinopus) IV Col. 15.
fusca (Alcedo) III Al. 28.
" (Anas) VI A. 16.
" (Athene) II Noc. 27.
" canadensis (Grus) V Ra. 2.
" (Dacelo) III Al. 28; III Al. R. 18.
" (Fuligula) VI A. 16.
" (Gallinula) V Ra. 45.
" (Malacoptila) I Bucc. 85.
" (Melanetta) VI A. 16.
" (Monasa) I Bucc. 86.
" (Ortygometra) V Ra. 21.
" (Rallina) " " 20.
" (Scolopax) IV Sc. 64.
" (Sterna) VI Ster. 36.
" (Sula) VI Pe. 41.
" (Tringa) V Sc. 58.
" (Upupa) I Cor. 94.
fuscata (Eos) III P. 122.
fuscatus (Lorius) " " 122; III P. R. 55.
fuscescens (Bucco) I Bucc. 6.
" (Clupeilarus) VI L. 14.
" (Ptynx) II Str. 11.
" (Strix) " " 11.
" (Ulula) " " 11; II Noc. 18.
fuscicapilla (Dacelo) III Al. 31.
" (Halcyon) " " 31.
fuscicapillus (Bucco) I Bucc. 31.
" (Corvus) I Cor. 2, 20, 22.
" (Eurystomus) I Cor. 139.
" (Pionias) III P. R. 9.
" (Psittacus) " " " 9, 43.
fuscicollis (Actodromus) V Sc. 48.
" (Psittacus) III P. 34; III P. R. 9.
fuscirostris (Aptenodytes) VI U. 10.
fuscocapillus (Totanus) V Sc. 69.
fuscus (Bucco) I Bucc. 85.
" (Capito) " " 85.
" (Charadrius) IV Cur. 39.
" (Clupeilarus) VI L. 14.
" (Erythroscelus) IV Sc. 64.
" (Falco) II Ass. 30.
" (Gallirallus) V Ra. 73.
" (Larus) VI L. 14.
" (Leptopelecanus) VI Pe. 28.
" (Lestris cephus) VI L. 49.
" (Lestris pomarinus) VI L. 47.
fuscus (Monastes) I Bucc. 85.
" (Nisus) II Ass. 30; II Acc. 69.
" (Onocrotalus) VI Pe. 28.
" (Pelecanus) " " 28.
" (Rallus) V Ra. 20.
" (Rallus philippensis) V Ra. 20.
" (Totanus) V Sc. 64.

G.

gabar (Falco) II Ass. 48.
" (Nisus) " " 48; II Acc. 96.
Gabianus georgii VI L. 8.
" pacificus " " 7.
gabonensis (Cuculus) I Cuc. 11.
gaimardii (Carbo) VI Pe. 22.
" (Graculus) " " 22.
" (Sticticarbo) VI Pe. 22.
" (Turtur) IV Col. 120.
gala (Psittacus) III P. 48.
Galachrysia lactea IV Cur. 17.
galbula (Oriolus) I Cor. 99.
galbuloides (Oriolus) I Cor. 101.
galeata (Cacatua) III P. 142; III P. R. 70.
" (Cyanocitta) I Cor. 63.
" (Gallinula) V Ra. 49.
" (Tanysiptera) III Al. 43; III Al. R. 35.
galeatus (Buceros) I Buc. 1.
" (Callocephalon) III P. 142.
" (Calyptorhynchus) " " 70, 142.
" (Casuarius) IV St. 9.
" (Psittacus) III P. 48, 142.
galericulata (Aix) VI A. 70.
" (Anas) " " 70.
" (Lophocitta) I Cor. 66.
" (Phaetusa) VI Ster. 7.
" (Sterna) " " 7, 11.
galericulatus (Corvus) I Cor. 66.
" (Garrulus) " " 66.
" (Vultur) II Vul. 8.
galerita (Cacatua) III P. 134; III P. R. 63.
galeritus (Buceros) I Buc. 8.
" (Cuculus) I Cuc. 42.
" (Psittacus) III P. 34.
Galgulum melanocephalum I Cor. 54.
Galgulus caudatus " " 134.
" cyanogaster " " 136.
" (Loriculus) III P. 131; III P. R. 62.
" naevius I Cor. 135.
" pacificus " " 139.
" (Psittacus) III P. 131.
" sinensis I Cor. 68.
Gallicolumbae IV Col. 167.
Gallicrex cristatus V Ra. 40.
gallicus (Charadrius) IV Cur. 12.
" (Circaëtus) II But. 23, 24, 25; II Acc. 112.
" (Cursorius) IV Cur. 12.
" (Falco) II But. 23.
gallina linearis (Columbi-) IV Col. 164.
gallinacea (Parra) V Ra. 68.
gallinaceus (Hydralector) V Ra. 68.
" (Metopidius) " " 68.

gallinaceus (Vanellus) IV Cur. 67.
Gallinago V Sc. 3.
Gallinago aequatorialis V Sc. 10.
" australis " " 10.
" burka " " 4.
" capitis bonae spei V Sc. 16.
" caspia " " 4.
" frenata " " 9.
" gallinula " " 14.
" gigantea " " 8.
" hyemalis " " 7.
" japonica " " 4.
" latipennis " " 4.
" longirostris " " 9.
" macrodactyla " " 10.
" maderaspatana " " 16.
" magellanica " " 11.
" major " " 7.
" megala " " 12.
" nemoricola " " 16.
" nigripennis " " 10.
" nilotica " " 4.
" nobilis " " 9.
" paludosa " " 8.
" paraguaiae " " 11.
" paraguayae " " 9.
" sakhalina " " 4.
" scolopacina " " 4.
" scolopacinus " " 4.
" (Scolopax) " " 4, 6, 13.
" solitaria " " 15.
" stenura " " 12.
" stricklandii " " 15.
" uniclavata " " 4.
" wilsoni " " 6.
gallinagoides (Scolopax) " " 6.
gallinaria (Scolopax) " " 4.
Gallinula V Ra. 37.
Gallinula albifrons V Ra. 35.
" alleni " " 38.
" angulata " " 49.
" ardosiaca " " 48.
" bailloni " " 30.
" burnesii " " 45.
" caesia " " 8.
" carolina " " 28.
" cayana " " 39.
" chloropus " " 45, 49.
" cinerea " " 40.
" crassirostris " " 42.
" cristata " " 39, 59.
" dimidiata " " 27.
" elegans " " 26.
" erythrina " " 41.
" erythrothorax " " 21.
" euryzona " " 19.
" euryzonoides " " 19.
" fistulans " " 45.
" flavipes " " 45.
" flavirostra " " 34.
" frontata " " 44.
" fusca " " 45.
" galeata " " 49.
gallinula (Gallinago) V Sc. 14.
" gigas V Ra. 14.
" gularis " " 40.
" haematopus " " 44.
" immaculata " " 36.
" isabellina " " 16.
" jardinii " " 27.
" javanica " " 41.
" leucomelana " " 42.
" leucosoma " " 32.
" lugubris " " 40.
" maculata " " 45.
" mangle " " 15.
" martinica " " 38.
" montieri " " 50.
" mystacina " " 32.
" naevia " " 40.
" novaeboracensis " " 26.
" oculea " " 20.
" olivacea " " 43.
" orientalis " " 48.
" parva " " 39.
" parvifrons " " 45.
" phoenicura " " 41.
" pileata " " 17.
" plumbea " " 40.
" porphyrio " " 38.
" porphyrioides " " 40.
" rubiginosa " " 20.
" rufescens " " 40.
" ruficeps " " 14.
" ruficollis " " 17.
" sarracura " " 15.
" (Scolopax) V Sc. 14.
" supersiliosa V Ra. 32.
" tenebrosa " " 44.
" ventralis " " 51.
gallinuloides (Fulica) " " 64.
Gallinulopha cristata " " 40.
Gallirallus brachypterus V Ra. 73.
" fuscus " " 73.
Gallirex anais I Cuc. 75.
" giganteus " " 77.
gallopagoensis (Peristera) IV Col. 140.
" (Zenaida) " " 140.
galopagoensis (Brachyotus) II Oti. 3.
" (Otus) " " 3.
gama (Nectris) VI Proc. 26.
gambelli (Anser) VI A. 110.
gambensis (Anas) " " 93.
" (Anser) " " 93.
" (Plectropterus) VI A. 93.
Gambetta brevipes V Sc. 74.
" calidris " " 65.
" flavipes " " 69.
" fuliginosa " " 74.
" griseopygia " " 74.
" melanoleuca " " 63.
" oceanica " " 74.
" pulverulenta " " 74.
" (Tringa) V Sc. 65.
Gampsonyx swainsonii II Mil. 9.
gangeticus (Tantalus) V Cic. 17.

gardeni (Ardea) V Ar. 56.
„ (Nycticorax) V Ar. 56.
garnoti (Halodroma) VI Proc. 37.
garnotii (Puffinuria) „ „ 37.
Garrula gubernatrix I Cor. 43.
Garrulus „ „ 56.
Garrulus atricapillus „ „ 59.
„ bispecularis „ „ 60.
„ brachyrhynchus „ „ 65.
„ brandtii „ „ 59.
„ canadensis „ „ 65.
„ cayanensis „ „ 51.
„ cervicalis „ „ 59.
„ (Coracias) „ „ 133.
„ coronatus „ „ 63.
„ cristatus „ „ 62.
„ floridanus „ „ 64.
„ galericulatus „ „ 66.
„ glandarius „ „ 57.
„ glandarius japonicus I Cor. 60.
„ glandarius melanocephalus I Cor. 58.
„ gularis I Cor. 61.
„ infaustus „ „ 65.
„ japonicus „ „ 60.
„ krynicki „ „ 58.
„ lanceolatus „ „ 61.
„ lidthii „ „ 61.
„ (Lorius) III P. 120; III P. R. 55.
„ luxuosus I Cor. 54.
„ melanocephalus „ „ 59.
„ minor „ „ 57.
„ ornatus „ „ 60.
„ (Psittacus) III P. 120.
„ rufulus I Cor. 66.
„ sinensis „ „ 60.
„ sordidus „ „ 64.
„ stelleri „ „ 62.
„ ultramarinus „ „ 64.
„ vigorsi „ „ 61.
garzetta (Ardea) V Ar. 12.
„ candidissima „ „ 15.
„ egretta „ „ 12.
„ nigripes „ „ 14.
„ ohula „ „ 15.
gaudichaudii (Alcedo) IIIAl.20.
„ (Dacelo) „ „ 20; IIIAl.R.11.
gavia (Charadrius) IV Cur. 56.
„ glaucotis VI L. 42.
„ melanocephala „ „ 43.
Gavina audouini „ „ 22.
„ zonorhyncha „ „ 22.
Gazzola typica I Cor. 6.
geelvinkiana (Carpophaga) IV Col. 86.
„ (Nasiterna) IIIP.R.71.
„ (Nasiterna pygmaea) „ „ 71.
„ (Ptilopus viridis stirps) IV Col. 23.
geelvinkianus (Megapodius) VIII Ti. 63.
„ (Ptilopus viridis) IV Col. 23.
gelastes (Columba) IV Col. 118.
„ columbinus VI L. 28.
„ lambruschini „ „ 28.
Gelastes schimperi VI L. 40.
Gélinotte IV St. 4.
Gennaia polyagrus II Fal. 18.
gentilis (Falco) II Ass. 16.
Geococcyx I Cuc. 40.
Geococcyx affinis „ „ 41.
„ californianus „ „ 40.
„ erythropygius „ „ 42.
„ guira „ „ 43.
„ mexicanus „ „ 41.
„ naevius „ „ 42.
„ phasianellus „ „ 41.
„ variegata „ „ 40.
„ velox „ „ 41.
geoffroyanus (Psittacus) III P. 42, 43.
geoffroyi (Charadrius) IV Cur. 39.
„ (Cirrepidesmos) „ „ 39.
„ (Coccyzus) I Cuc. 60.
„ (Columba) IV Col. 139.
„ (Cultrides) I Cuc. 60.
„ (Cyanocorax) I Cor. 44.
„ (Neomorphus) I Cuc. 60.
„ (Peristera) IV Col. 139.
„ (Psittacus) III P. 43.
Geoffroyus cyanicollis „ „ 44.
„ pucherani III P. R. 20.
Geopelia IV Col. 130.
Geopelia cuneata „ „ 133.
„ humeralis „ „ 130.
„ inca „ „ 133.
„ maugei „ „ 132.
„ placida „ „ 131.
„ squamosa „ „ 133.
„ striata „ „ 131.
„ tranquilla „ „ 131.
Geophaps plumifera IV Col. 155.
„ scripta „ „ 155.
„ smithii „ „ 155.
Geopsittacus occidentalis III P. 106.
georgii (Gabianus) VI L. 8.
„ (Larus) „ „ 8.
Geotacco macrourus I Cuc. 41.
Geotrygon albifacies IV Col. 164.
„ cristata „ „ 164.
„ linearis „ „ 164.
„ martinica „ „ 165.
„ montana „ „ 165.
„ mystacea „ „ 164.
„ violacea „ „ 165.
Geranus paradiseus V Ra. 6.
Geranospiza gracilis II Ass. 53.
Gerfaut II Fal. 11.
gerini (Psittacus) III P. 59.
Geronticus calvus V I. 11.
„ papillatus „ „ 11.
„ strictipennis „ „ 14.
gerontodes (Amazona) III P. R. 29.
„ (Pionias) „ „ 29.
gesneri (Fuligula) VI A. 26.
geversii (Ptilopus) IV Col. 36.
ghiesbrechtii (Asturina) IIAse.11; IIAcc.104.
„ (Buteo) „ „ 11; „ „ 104.
gibbera (Tadorna) VI A. 67.

gibberifrons (Anas) VI A. 58.
gibbus (Cygnus) „ „ 78.
gigantea (Ardea) V Ra. 5.
„ (Chizaerhis) I Cuc. 77.
„ (Fulica) V Ra. 59.
„ (Gallinago) V Sc. 8.
„ (Ispida) III Al. 3.
„ (Lequatia) IV St. 2; V Ra. 52.
„ (Musophaga) I Cuc. 77.
„ (Ossifraga) VI Proc. 18.
„ (Phalaria) V Ra. 59.
„ (Procellaria) VI Proc. 18.
„ (Scolopax) V Sc. 6, 8.
„ (Xylocota) „ „ 8.
giganteus (Bucco) I Bucc. 77.
„ (Coridonyx) I Cuc. 63.
„ (Gallirex) „ „ 77.
„ (Leucogeranos) V Ra. 5.
„ (Oedicnemus) IV Cur. 22.
„ (Phimus) I Cuc. 77.
„ (Rallus) V Ra. 7.
„ (Turacus) I Cuc. 77.
gigantodes (Ardea) V Ar. 3.
gigas (Alcedo) III Al. 19.
„ (Aramides) V Ra. 14.
„ (Charadrius) IV Cur. 38.
„ (Centropus) I Cuc. 63.
„ (Gallinula) V Ra. 14.
„ (Dacelo) III Al. 19; III Al. R. 11.
„ (Pitta) III Pit. 1.
„ (Rallus) V Ra. 7.
gilbertii (Megapodius) VIII Ti. 73.
gingalensis (Buceros) I Buc. 12.
ginginiana (Psittaca) III P. 76.
ginginianus (Buceros) I Buc. 11.
gironieri (Palaeornis) III P. 83.
gironnieri (Falco) II Fal. 34.
„ (Leucotreron) IV Col. 36.
girra (Anas) VI A. 76.
glacialis (Anas) VI A. 23.
„ (Colymbus) VI U. 30.
„ (Fuligula) VI A. 23.
„ (Fulmarus) VI Proc. 21.
„ (Harelda) VI A. 23.
„ (Larus) VI L. 4, 5.
„ (Mergus) VI A. 6.
„ (Mormon) VI U. 28.
„ pacifica (Procellaria) VI Proc. 22.
„ (Procellaria) „ „ 21, 22.
„ (Tringa) V Sc. 58.
„ (Uria) VI U. 18.
glacialoides (Procellaria) VI Proc. 22.
„ (Thalassoica) „ „ 22.
glandarius (Coccystes) I Cuc. 44.
„ (Corvus) I Cor. 57.
„ (Cuculus) I Cuc. 44.
„ (Garrulus) I Cor. 57.
„ japonicus (Garrulus) I Cor. 60.
„ melanocephalus (Garrulus) I Cor. 58.
Glareola IV Cur. 14.
Glareola australis IV Cur. 18.
„ austriaca „ „ 15.
Glareola cinerea IV Cur. 17.
„ grallaria „ „ 18.
„ isabella „ „ 18.
„ lactea „ „ 17.
„ limbata „ „ 15.
„ megapodia „ „ 15.
„ melanoptera „ „ 15.
„ naevia „ „ 15.
„ nordmannii „ „ 15.
„ orientalis „ „ 16, 17.
„ pallasii „ „ 15.
„ pratincola „ „ 15.
„ (Rhynchophilus) V Sc. 71.
„ (Scolopax tringa) V Sc. 74.
„ senegalensis IV Cur. 15.
„ torquata „ „ 15.
„ (Totanus) V Sc. 71, 73.
„ (Tringa) V Sc. 71.
glareoloides (Totanus) V Sc. 71.
glauca (Ara) III P. 2.
„ (Arara) „ „ 2; III P. R. 1.
glaucescens (Larus) VI L. 6.
„ (Leucus) „ „ 5.
Glaucestes parva V Ra. 39.
Glaucidium gnoma II Str. 31.
„ passerimum „ „ 41.
glaucion (Anas) VI A. 20, 30.
Glaucococcyx coeruleus I Cuc. 46.
glaucogularis (Capito) I Bucc. 64.
Glaucopis I Cor. 71.
Glaucopis aterrima „ „ 72.
„ (Charadrius) IV Cur. 50.
„ cinerea I Cor. 73.
„ cucullata „ „ 74.
„ formosae „ „ 76.
„ frontalis „ „ 75.
„ leucogaster „ „ 74.
„ leucopterus „ „ 72.
„ occipitalis „ „ 75.
„ rufa „ „ 77.
„ senegalensis „ „ 77.
„ sinensis „ „ 69, 76.
„ struthidea „ „ 73.
„ temnurus „ „ 72.
„ varians „ „ 73.
„ wilsoni „ „ 73.
glaucotis (Gavia) VI L. 42.
„ (Larus) „ „ 42.
glaucus (Graculus) VI Pe. 17.
„ (Larus) VI L. 4.
„ (Leucus) „ „ 4.
„ (Macrocercus) III P. 2.
Globicera rubricera IV Col. 81.
„ tumida „ „ 81.
glocitans (Anas) VI A. 54.
gloriosus (Psittacus) III P. 96.
Glottis canescens V Sc. 61.
„ chloropus „ „ 61.
„ floridanus „ „ 61.
„ (Limosa) „ „ 23.
„ niveigula „ „ 61.
„ (Scolopax) „ „ 61.
„ (Totanus) „ „ 61.

Glottis vigorsi V Sc. 61.
Gnathodon strigirostris IV Col. 167.
gnoma (Glaucidium) II Str. 31.
godinae (Talpacotia) IV Col. 136.
Goëlands VI L. 4.
goensis (Lobivanellus) IV Cur. 68.
" (Parra) " " 68.
" (Sarcogrammus) IV Cur. 68.
goffini (Lophochroa) IIIP.144; IIIP.R.67.
goffinii (Capito) I Bucc. 72.
goisagi (Ardea) V Ar. 54.
" (Nycticorax) V Ar. 54.
Gold-winged woodpecker I Bucc. 66.
goliath (Ardea) V Ar. 3.
" (Ardeomega) V Ar. 3.
" (Carpophaga) IV Col. 95.
" (Centropus) I Cuc. 61.
" (Nesocentor) " " 61.
" (Phaenorhina) IV Col. 95.
" (Psittacus) III P. 148.
gouldi (Ardetta) V Ar. 46.
gouldiae (Caloenas) IV Col. 170.
gouldii (Bruchigavia) VI L. 30.
" (Circus) II Cir. 8; II Acc. 51.
" (Dendrocygna arcuata) VI A. 88.
" (Megapodius) VIII Ti. 57.
" (Nanucodia) I Cor. 120.
" (Pelargopis) III Al. R. 7.
" (Sterna) VI Ster. 25.
gouphili (Coriphilus) III P. 117.
Goura IV Col. 167.
Goura coronata IV Col. 168.
" victoriae " " 169.
govinda (Milvus) II Mil. 2; II Acc. 126.
gracilis (Anous) VI Ster. 38.
" (Carbo) VI Pe. 22.
" (Coccyzusa) I Cuc. 59.
" (Falco) II Ass. 53.
" (Geranospiza) " " 53.
" (Graculus brasilianus) VI Pe. 22.
" (Ischnoscelis) II Ass. 53.
" (Sterna) VI Ster. 19.
Gracula I Cor. 1.
Gracula anaïs I Cor. 98.
" pectoralis " " 98.
" strepera " " 124.
" viridis " " 110.
graculina (Strepera) " " 124.
graculinus (Corvus) " " 124.
" (Cracticus) " " 124.
Graculus VI Pe. 4.
Graculus africanus VI Pe. 15.
" americanus " " 8.
" bilophus " " 22.
" brasilianus " " 22.
" brasilianus gracilis " " 22.
" brevirostris " " 16.
" capensis " " 19.
" (Carbo) VI Pe. 6, 22, 23.
" carunculatus VI Pe. 20.
" cincinnatus " " 22.
" (Corvus) I Cor. 55.
" cristatus VI Pe. 18.
Graculus cristatus demarestii VI Pe. 18.
" floridanus " " 23.
" (Fregilus) I Cor. 55.
" gaimardii VI Pe. 22.
" glaucus " " 17.
" leucogaster " " 20.
" lucidus " " 12.
" macrorhynchus " " 8.
" magellanicus " " 21.
" melanoleucus " " 15.
" mexicanus " " 23.
" novae zeelandiae " " 8.
" (Pelecanus) " " 18.
" penicillatus " " 18.
" perspicillatus " " 17.
" punctatus " " 21.
" pygmaeus " " 13.
" (Pyrrhocorax) I Cor. 55.
" sinensis VI Pe. 8.
" sulcirostris " " 13.
" varius " " 20.
" violaceus " " 17.
graecus (Falco lanarius) IIFal.15; IIAcc.35.
grallaria (Glareola) IV Cur 18.
" (Procellaria) VI Proc. 5.
" (Stiltia) IV Cur. 18.
grallarius (Oedicnemus) " " 18.
" (Vanellus) " " 59.
gramineus (Psittacus) III P. R. 25.
granatina (Chamaepelia) IV Col 135.
" (Pitta) III Pit. 5; III Pit. R. 9.
Grand barbu de la Chine I Bucc. 13.
Grand vasa III P. 37.
Grande tourterelle de la Chine IV Col. 127.
grandis (Anas) VI A. 114.
" (Anser) " " 114.
" (Bucco) I Bucc. 13.
" (Eclectus) III P. 38; III P. R. 13.
" (Misaëtus) II Aq. 9.
" (Psittacus) III P. 38.
Grands-hérons V Ar. 2.
Graucalus viridis I Cor. 115.
Graydidascalus viridissimus III P. 66.
grayi (Ardea) V Ar. 35.
" (Ardea leucoptera) V Ar. 35.
" (Dacelo) III Al. 37; III Al. R. 28.
grec (Lanier) II Fal. 15.
gregaria (Chettusia) IV Cur. 58.
" (Limosa) V Sc. 23.
gregarius (Charadrius) IV Cur. 58.
" (Psittaculus) III P. 31.
" (Psittacus) " " 31.
" (Vanellus) IV Cur. 58.
Grenouillard II Cir. 11.
greyi (Herodias) V Ar. 21, 25.
" (Ptilinopus) IV Col. 7.
" (Ptilonopus) " " 7.
" (Ptilopus) " " 7.
Griffard II Ass. 5.
grillii (Centropus) I Cuc. 68.
grisea (Arenaria) V Sc. 55.
" (Carpophaga) IV Col. 103.
" (Carvanaca) IV Cur. 23.

grisea (Limosa) V Sc. 26.
" (Procellaria) VI Proc. 12.
" (Scolopax) V Sc. 26.
" (Sterna) VI Ster. 33.
" (Tringa) IV Cur. 54; V Sc. 29.
griseata (Strix) II Oti. 16.
griseicauda (Treron) IV Col. 53.
griseiceps (Astur) II Ass. 23; II Acc. 66.
" (Falco) II Acc. 66; II Ass. 23.
griseigena (Colymbus) VI U. 38.
" (Podiceps) " " 38.
griseipectus (Carpophaga) IV Col. 88.
grisella (Ciccaba) II Str. 9.
griseogularis (Accipiter) II Ass. 41; II Acc. 80.
" (Astur) II Acc. 80.
" (Janthoenas) IV Col. 75.
griseola (Chamaepelia) " " 135.
" (Columba) " " 135.
" (Peristera) " " 135.
griseopectus (Rallus) V Ra. 24.
griseopygia (Gambetta) V Sc. 74.
" (Totanus) " " 74.
griseus (Ardea) V Ar. 56.
" (Buceros) I Buc. 11.
" (Macrorhamphus) V Sc. 26.
" (Nycticorax) V Ar. 56.
" semipalmatus (Macrorhamphus) V Sc. 26.
" (Vanellus) IV Cur. 53.
groenlandica (Columba) VI U. 18.
" (Uria) " " 18.
groenlandicus (Colymbus medius) VI U. 28.
" (Falco gyrfalco) II Fal. 13; II Acc. 35.
Grus V Ra. 1.
Grus americana V Ra. 4.
" antigone " " 3.
" (Ardea) " " 1.
" australasiana " " 3.
" balearica " " 7.
" canadensis " " 2.
" capensis " " 6.
" carunculata " " 5.
" cinerea " " 1.
" cinerea longirostris V Ra. 2.
" clamator " " 4.
" fraterculus " " 2.
" fusca canadensis " " 2.
" hoyanus " " 4.
" leucauchen " " 3.
" leucogeranos " " 5.
" longirostris " " 2.
" monacha " " 4.
" montignesia " " 4.
" numidica " " 6.
" orientalis indica " " 3.
" paradisea " " 6.
" pavonina " " 7.
" stanleyana " " 6.
" struthio " " 4.
" torquata " " 3.
" vipio " " 3.
" virgo " " 6.
grylle (Alca) VI U. 17.
" (Colymbus) " " 17.
" (Uria) " " 18.
grylloides (Uria) " " 18.
gryphus (Cathartes) II Vul. 1; II Acc. 138.
" (Vultur) " " 1.
gryseatus (Bubo) II Oti. 16.
guajana (Pitta) III Pit. R. 16.
guarauna (Falcinellus) V I. 4.
" (Nothorodius) V Ra. 7.
" (Rallus) " " 7.
guarouba (Psittacus) III P. 17.
" (Psittacus mexicanus) III P. 17.
guatemalae (Amazona) III P. R. 27.
" (Chrysotis) " " 27.
guatemalensis (Xanthoura) I Cor. 53.
guazu (Cryptura) VIII Ti. 35.
" (Ynambu) " " 35.
gubernatrix (Garrula) I Cor. 43.
guebiensis (Lorius) III P. 123.
" (Psittacus) " " 123, 124.
guenbiensis (Psittacus) " " 125.
guenbyensis (Psittacus) " " 125.
Guêpier sonnini III Me. 10.
guerilla (Micrastur) II Acc. 98.
guianensis (Astur) II Ass. 25; II Acc. 67.
" (Conurus) III P. 12.
" (Falco) II Ass. 25.
" (Morphnus) " " 25.
" (Psittacus) III P. 12.
" (Pyrrhococcyx) I Cuc. 58.
Guifso-balito I Bucc. 5.
guildingi (Amazona) III P. 49; III P.R. 26.
" (Psittacus) " " 49.
guilielmi III (Psittacula) III P. R. 34.
guinea (Columba) IV Col. 72.
" (Stictoenas) " " 72.
guineensis (Buceros carunculatus) I Buc. 20.
" viridis (Cuculus) I Cuc. 76.
guinetta (Tringa) V Sc. 68.
Guira cristata I Cuc. 43.
" (Cuculus) " " 43.
" (Geococcyx) " " 43.
" (Octopteryx) " " 43.
gularis (Alcedo) III Al. 28; III Al. R. 19.
" (Ardea) V Ar. 23.
" (Astrapia) I Cor. 94.
" (Asturina) II Ass. 4; II Acc. 101.
" (Bucco) I Bucc. 30.
" (Charadrius) IV Cur. 41.
" (Colius) I Cuc. 81.
" (Columba) IV Col. 37.
" (Cuculus) I Cuc. 6.
" (Dacelo) III Al. R. 19.
" (Eurystomus) I Cor. 139, 143.
" (Falco) II Ass. 4; II Acc. 101.
" (Gallinula) V Ra. 40.
" (Garrulus) I Cor. 61.
" (Herodius) V Ar. 23.
" (Hylomanes) III Mo. 7.
" (Leucotreron) IV Col. 37.
" (Mellitophagus) III Me. 12.
" (Merops) " " 12.

gularis (Momotus) III Mo. 7.
" (Nisus) II Ass. 33; II Acc. 74.
" (Podiceps) VI U. 43, 45.
" (Ptilopus) IV Col. 37.
" (Rallus) V Ra. 13, 24, 34.
" (Rougetius) V Ra. 13.
" (Rupornis) II Asc. 4; II Acc. 101.
" (Tamatia) I Bucc. 81.
gulielmi (Pionus) III P. 34.
" (Psittacus) " " 34; III P. R. 9.
gundlachii (Astur) II Acc. 73.
gurial (Halcyon) III Al. 14; III Al. R. 7.
" (Rhamphalcyon) III Al. 14.
gurneyi (Aquila) II Aq. 11; II Ass. 14; II Acc. 60.
" (Heteropus) II Ass. 14.
" (Spizaëtus) II Aq. 11.
" (Spizaetus) II Ass. 14; II Acc. 60.
guteruhi (Athene) II Str. 26.
" (Noctua) " " 26; II Noc. 23.
" (Strix) " " 26.
guttata (Alcedo) III Al. 1; III Al. R. 1.
" (Anas) VI A. 49, 85.
" (Ceryle) III Al. 1, 2.
" (Chlamydodera) I Cor. 120.
" (Dendrocygna) VI A. 85.
" (Sterna) VI Ster. 25.
guttatus (Crypturus) VIII Ti. 12.
" (Eos) III P. 128.
" (Micronisus) II Acc. 93.
" (Nisus) " " 71.
" (Psittacus) III P. 128.
" (Tinamus) VIII Ti. 12.
guttifera (Terekia) V Sc. 77.
guttulata (Dendrocygna) VI A. 85.
gutturalis (Ardea) V Ar. 45.
" (Ardeiralla) V Ar. 45.
" (Ardetta) " " 45.
" (Bucco) I Bucc. 28.
gutture luteo (Psittacus) III P. 29.
guyanensis (Conurus) III P. 9; III P. R. 4.
" (Psittacus) " " 9.
Gygis candida VI Ster. 35.
" napoleonis " " 35.
Gymnobucco bonapartei I Bucc. 51.
" calvus " " 49.
" peli " " 49.
gymnocephala (Barita) I Cor. 130.
" (Pityriasis) " " 130.
gymnocephalus (Corvus) " " 54.
" (Cracticus) " " 130.
" (Ibicter) II Acc. 138.
" (Picathartes) I Cor. 54.
Gymnocorvus senex " " 36.
" tristis " " 36.
gymnocyclus (Columba) IV Col. 65.
Gymnogenys II Ass. 54.
" (Falco) " " 54.
gymnophthalmus (Crossophthalmus) IV Col. 69.
gymnopodus (Scops) II Oti. 20.
Gymnops strigilatus II Pol. 5.
Gymnorhina anaphonensis I Cor. 123.
Gymnorhina hypoleuca I Cor. 126.
" leuconota " " 126.
" organicum " " 126.
" tibicen " " 125.
gymnostoma (Parra) V Ra. 66.
Gypaëtos angolensis II Aq. 18.
Gypaëtus II Vul. 10; II Acc. 141.
Gypaëtus barbatus " " 10; " " 141.
" " meridionalis II Vul. 10 II Acc. 141.
" meridionalis II Vul. 11.
" nudipes " " 11.
Gypogeranus secretarius II Ass. 28; II Acc. 68.
" serpentarius II Ass. 28.
Gypohierax II Aq. 18.
Gypoictinia melanosternon II But. 19.
Gypopsitta III P. 63.
Gypopsitta vulturina " " 66.
Gyps II Vul. 6.
" fulvus " " 6
" magnificus " " 7.
" occidentalis " " 6.
" vulgaris " " 7.
gyrfalco (Falco) II Fal. 11; II Acc. 34.
" groenlandicus (Falco) II Fal. 13; II Acc. 35.
" islandicus (Falco) II Fal. 14; II Acc. 34, 35
" norwegicus (Falco) II Fal. 12; II Acc. 34.

H.

habroptilus (Strigopsis) III P. 107; III P. R. 43.
haematodus (Trichoglossus) III P. 109.
haematogaster (Euphema) III P. 102; III P. R. 41
" (Platycercus) III P. 102.
" (Psephotus) " " 102.
haematonota (Euphema) III P. 101; III P. R. 41.
haematonotus (Platycercus) III P. 101.
" (Psephotus) " " 101.
haematops (Pogonias) I Bucc. 5.
Haematopus IV Cur. 70.
Haematopus arcticus " " 74.
" ater " " 76.
" australasianus " " 73.
" bachmannii " " 76.
" balthicus " " 70.
" brasiliensis " " 74.
" europaeus " " 70.
" fuliginosus " " 75.
" (Gallinula) V Ra. 44.
" (Himantornis) " " 28.
" hypoleuca IV Cur. 70.
" leucopus " " 74.
" longirostris " " 70, 73.
" luctuosus " " 74.
" niger " " 76.
" " africanus " " 76.
" " americanus IV Cur. 76.
" " australasianus " " 75.

Haematopus niger oceanicus IV Cur. 75
" orientalis " " 70.
" ostralegus " " 70
" palliatus " " 74.
" picatus " " 73.
" townsendii " " 76.
" unicolor " " 75.
haematorhynchus (Larus) VI L. 33.
" (Leucophaeus) " " 33.
Haematornis undulatus II But. 25.
haematorrhous (Psephotus) III P. 102.
haematotis (Amazona) III P.65; IIIP.R.29.
" (Pionus) " " 65.
haematotus (Psittacus) " " 109.
" (Trichoglossus) III P. 109; III P. R. 43.
haemorrhous (Aratinga) III P. 11.
haesitata (Procellaria) VI Proc. 11, 13, 23.
haesitatus (Numenius) V Sc. 93.
hagedasch (Ibis) V I. 10.
Hagedashia capensis " " 10.
" olivacea " " 9.
hahnii (Arara) III P. 8; III P. R. 3.
" (Psittacara) " " 9.
Halcyon albicilla III Al. 42.
" amauroptera III Al. R. 8.
" badius III Al. 28.
" chelicuti " " 32.
" chloris " " 32.
" cinereifrons " " 29.
" cinnamominus " " 39.
" collaris " " 32.
" concreta " " 26.
" coromanda major " " 25.
" coromanda minor " " 25.
" coromandeliana " " 25.
" coronata " " 37, 38.
" cyanoleuca III Al. R. 21.
" cyanotis III Al. 16.
" diops " " 41.
" dryas " " 30.
" flavirostris " " 23.
" forsteni III Al. 37.
" fulgidus " " 24.
" funebris " " 40.
" fuscicapilla " " 31.
" gurial III Al. 14; III Al. R. 7.
" incinctus III Al. 41.
" juliae III Al. R. 29.
" lazuli III Al. 42.
" leucocephala " " 13.
" lilacina " " 25.
" lindsayi " " 23.
" mac leayii " " 40.
" malimbica III Al. R. 20.
" melanopterus III Al. 27.
" melanorhyncha III Al. 15.
" nigrocyanea III Al. R. 31.
" pileatus III Al. 27.
" pulchella III Al. 21.
" pyrrhopygia " " 39.
" reichenbachii III Al. R. 29.
" sacra III Al. 38; " " 29.
Halcyon sanctus III Al. 35.
" saurophaga " " 42.
" schlegeli III Al. 25.
" senegalensis III Al. 30; III Al. R. 21.
" smyrnensis " " 18.
" sordidus III Al. 32; " " 21.
" striolata " " 31.
" torotoro " " 22.
" torquatus " " 29.
" vagans III Al. R. 28.
Halcyone III Al. 17.
Halcyone azurea " " 17.
" solitaria " " 17.
Haliaëtus II Aq. 11; II Acc. 117.
Haliaëtus aguia II Asc. 5.
" albicilla II Aq. 11; II Acc. 117.
" angolensis " " 18; " " 119.
" (Aquila) " " 22.
" canorus " " 21.
" (Falco) " " 22; II Acc. 123.
" humilis " " 18; " " 119.
" ichthyaëtus " " 17; " " 118.
" indus " " 19; " " 119.
" leucocephalus II Aq. 12; II Acc. 117.
" leucogaster " " 14; " " 117.
" leucoryphus " " 15; " " 118.
" leucosternus " " 19.
" lineatus II Mil. 2.
" (Pandion) II Aq. 22; II Acc. 123.
" pelagicus " " 14; " " 117.
" plumbeus " " 17.
" sphenurus " " 14, 21; II Acc. 123.
" unicolor II Aq. 15.
" vocifer " " 16; II Acc. 118.
" washingtonii II Aq. 12.
Haliaeus africanus VI Pe. 15.
" brevirostris " " 16.
" javanicus " " 13.
" lucidus " " 12.
" melanognathus VI Pe. 13.
" melanoleucus " " 15.
" niger " " 13.
" pygmaeus " " 13.
" " algeriensis VI Pe. 13.
" stictocephalus " " 13.
" sulcirostris " " 13.
Haliastur II Aq. 19.
Haliastur indus " " 19.
" leucosternus II Acc. 119.
halmaherae (Janthoenas) IV Col. 76.
Halobaena typica VI Proc. 18.
Halodroma " " 36.
Halodroma berardi " " 37, 38.
" garnoti " " 37.
" urinatrix " " 37.
Halyplana fuliginosa VI Ster. 25.
hamatus (Falco) II Pol. 8.
haplochrous (Accipiter) II Acc. 91.
" (Nisus) " " 91.
hardwickii (Columba) IV Col. 45.
" (Limosa) V Sc. 51.
" (Scolopax) V Sc. 10.

hardwickii (Strix) II Oti. 19.
hardyi (Lestris) VI L. 49.
Harelda glacialis VI A. 23.
harpe (Falco) II Fal. 35.
harpiprion cayennensis V I. 8.
harpyia (Astur) II Ass. 25; II Acc. 67.
" braccata " " 2.
" coronatus II Asc. 12.
" destructor II Ass. 25.
" (Thrasaëtus) " " 25.
" (Vultur) " " 25.
harrisii (Buteo) II Asc. 2.
" (Cyanocorax) I Cor. 46.
" (Nyctale) II Str. 9.
" (Ulula) " " 9; II Noc. 18.
hartlaubi (Capito) I Bucc. 61.
" (Eubucco) " " 61.
" (Micropogon) " " 61.
hartlaubii (Capito) " " 61.
" (Larus) VI L. 37.
" (Otis) IV Cur. 9.
haskeri (Megapodius) VIII Ti. 65.
hastata (Aquila) II Aq. 7.
hastatus (Buceros) I Buc. 13.
" (Numenius) V Sc. 92.
havanensis (Athene) II Str. 32.
" (Psittacus) III P. 50.
havelli (Sterna) VI Ster. 29.
hawaaïensis (Anser) VI A. 106.
hayi (Psilopus) I Bucc. 74.
hayii (Bucco) " " 73.
hebridicus (Colymbus) VI U. 43.
heckelii (Cyanocorax) I Cor. 46.
heermanii (Larus) VI L. 9.
heermanni (Adelarus) VI L. 9.
heinii (Larus) " " 26.
Heleornis nipalensis III Pit. 2.
Heliaptex arcticus II Oti. 10.
helias (Ardea) V Ra. 73.
" (Eurypyga) " " 73.
Heliornis VI U. 48.
Heliornis fulica " " 48.
" fulicarius " " 49.
" personata " " 49.
" senegalensis " " 49.
" surinamensis " " 49.
heliosylos (Ardea) V Ar. 51.
" (Botaurus) " " 51.
Helodromus leucurus V Sc. 70.
" ochropus " " 70.
Helotarsus II But. 28.
" ecaudatus " " 28.
" leuconotus II Acc. 115.
helvetica (Squatarola) IV Cur. 54.
" (Tringa) " " 54.
helveticus (Vanellus) " " 54.
helviventris (Coccyzus) I Cuc. 38.
hemidactylus (Falco) II Ass. 53.
" (Ischnoscelis) " " 53.
" (Nisus) II Ass. 53; II Acc. 99.
hemilasius (Buteo) II But. 3; " " 107.
" (Falco) " " 3.
Hemipalama audubonii V Sc. 54.
Hemipalama himantopus V Sc. 54.
" multistriata " " 54.
Hemiphaga forsteni IV Col. 93.
" novae zealandiae " " 98.
" poliocephala " " 92.
" spadicea " " 98.
hemirhynchus (Numenius) V Sc. 101.
hemprichii (Adelarus) VI L. 32.
" (Larus) " " 32.
hendersoni (Falco) II Acc. 36.
henicogrammus (Astur) " " 80.
Henicopernis longicauda " " 132.
Henicophaps IV Col. 156.
" albifrons " " 156.
henrici (Bucco) I Bucc. 21.
" (Megalaima) " " 21.
henstii (Astur) II Acc. 62.
herbertii (Pezophaps) IV St. 4.
Herodias albolineata V Ar. 27.
" (Ardea) " " 4.
" ardesiaca " " 10.
" coerulea " " 22.
" eulophotes " " 29.
" greyi " " 21, 25.
" gularis " " 23.
" immaculata " " 12.
" leucogaster " " 9.
" leucoprymna " " 9.
" novaehollandiae " " 28.
" pannosa " " 25.
" picata " " 10.
" plumifera " " 19.
" poucheti " " 22.
" rufescens " " 21.
" schistaceus " " 23.
" syrmatophora " " 17.
hérons (Grands-) " " 3.
" (Petits-) " " 9.
" -rales " " 31.
Herpetotheres brachypterus II Ass. 52.
" cachinnans " " 26.
" sociabilis II Pol. 8.
" xanthothorax II Ass. 50.
Hetaerodus I Cuc. 35.
Heteroaëtus aguia II Asc. 6.
Heteropoda mauri V Sc. 55.
Heteropus gurneyi II Ass. 14.
Heteropygia bonapartei V Sc. 42.
" cooperi " " 39.
Heteroscelis brevipes " " 74.
heterura (Scolopax) " " 13.
heuglinii (Cuculus) I Cuc. 11.
heywoodii (Charadrius) IV Cur. 35.
Hians asiaticus V Cic. 15.
" capensis " " 15.
Hiaticula IV Cur. 23.
Hiaticula bicincta " " 37.
" (Charadrius) " " 26, 28, 29, 30.
" torquata " " 26.
" tricollaris " " 24.
hiaticuloides (Charadrius) " " 26.
Hiator lamelligerus V Cic. 15.
Hieraspiza tinus II Ass. 33.

Hierax eutolmus II Fal. 33.
hilarea (Rhynchaea) V Sc. 18.
hiliaca (Aquila) II Aq. 2.
himalayana (Columba palumbus) IV Col. 66.
" (Otis) IV Cur. 10.
himalayanus (Conurus) III P. 82.
" (Cuculus) I Cuc. 7.
" (Fregilus) I Cor. 55.
Himantopus V Sc. 104.
Himantopus albicollis " " 105.
" atropterus " " 105.
" brasiliensis " " 107.
" candidus " " 105.
" (Charadrius) " " 105.
" (Hemipalama) " " 54.
" intermedius " " 106.
" leucocephalus " " 106.
" leucurus " " 107.
" major " " 105.
" melanopterus " " 105.
" melas " " 108.
" mexicanus " " 107.
" (Micropalama) " " 54.
" nigricollis " " 107.
" novae zeelandiae " " 108.
" palmatus " " 108.
" pectoralis " " 108.
" rufipes " " 105.
" (Tringa) " " 54.
" vulgaris " " 105.
Himantornis V Ra. 28.
Himantornis haematopus V Ra. 28.
hina (Anas) VI A. 52.
hiogaster (Falco) II Ass. 43; II Acc. 89.
Hiracoccyx leucolophus I Cuc. 16.
Hiracococcyx pectoralis " " 15.
" sparverinus " " 15.
" strenuus " " 15.
hirsuta (Athene) II Str. 25.
" borneoensis (Noctua) II Str. 25; II Noc. 24.
" japonica (Noctua) II Str. 25; II Noc. 23.
" japonica (Strix) II Str. 25.
" minor (Noctua) II Noc. 24.
" (Noctua) II Str. 25; II Noc. 23.
" philippensis (Noctua) II Str. 26; II Noc. 22.
" (Strix) II Str. 25.
hirsutus (Pogonias) I Bucc. 11.
" (Pogonorhynchus) " " 11.
hirundinaceus (Merops) III Me. 11.
Hirundo pratincola IV Cur. 15.
" (Sterna) VI Ster. 15, 17.
histrio (Amazona) III P. 64; III P. R. 29.
" (Psittacus) " " 64
histrionica (Anas) VI A. 22.
" (Clangula) " " 22.
" (Fuligula) " " 22.
" (Lophocitta) I Cor. 66.
" (Phaps) IV Col. 154.
histrionicus (Falco) II Cir 5.
" torquatus VI A. 22.
hodgsoni (Chrysococcyx) I Cuc. 32.
hodgsoni (Cuculus) I Cuc. 32.
" (Megalaima) I Bucc. 34.
hodgsonii (Columba) IV Col. 71.
" (Dendrotreron) " " 71.
" (Palaeornis) III P. R. 35.
" (Stictoenas) IV Col. 71.
hoedtii (Leptopila) " " 163.
" (Noctua) II Noc. 24.
hoffmannii (Conurus) III P. R. 6.
hollböllii (Podiceps) VI U. 38.
holochlorus (Conurus) III P. 13; III P.R. 4.
Holopodius wilsonii V Sc. 60.
holosericea (Columba) IV Col. 41.
" (Drepanoptera) " " 41.
" (Drepanoptila) " " 41.
" (Kitta) I Cor. 117.
" (Lamprotreron) IV Col. 41.
holosericeus (Calyptomenaenas) " " 41.
" (Ptilinopus) " " 41.
" (Ptilopus) " " 41.
" (Ptilorhynchus) I Cor. 117.
" (Trygon) IV Col. 41.
holospilus (Buteo) II But. 28.
" (Circaëtus) II But. 28; II Acc. 114.
hombroni (Chalcophaps) IV Col. 151.
honoratus (Cuculus) I Cuc. 16.
Hoplopterus speciosus IV Cur. 62.
" spinosus " " 61.
" ventralis " " 61.
Hoploxypterus cayanus " " 62.
hornotina (Avis) I Cor. 133
horsfieldii (Scolopax) V Sc. 13.
" (Spilura) " " 13.
" (Totanus) " " 61.
hottentota (Anas) VI A. 60.
" (Querquedula) " " 60.
hoya (Spilornis) II Acc. 113.
hoyanus (Grus) V Ra. 4.
Hubara macqueenii IV Cur. 3.
" (Otis) " " 3.
" undulata " " 3.
hudsonica (Limosa) V Sc. 22.
" (Perdix) V Ra. 26.
" (Pica) I Cor. 39.
" (Scolopax) V Sc. 22.
hudsonicus (Numenius) " " 100.
hudsonis (Botaurus freti) V Ar. 49.
hudsonius (Circus cyaneus) II Cir. 2; II Acc 48.
" (Falco) II Cir. 2.
hueti (Psittacula) III P. 69; III P. R. 0.
" (Psittacus) " " 69.
hugonianus (Ptilopus) IV Col. 36.
Huhua nipalensis II Noc. 5.
huhula (Strix) II Str. 17.
" (Ulula) " " 17; II Noc. 20.
humboldtii (Spheniscus) VI U. 10.
humeralis (Anas) VI A. 49.
" (Columba) IV Col. 48, 130.
" (Erythrauchaena) " " 130.
" (Geopelia) " " 130.
" iobensis (Ptilopus) " " 16.
" (Psittacus) III P. 114.

humeralis (Pterocyanea) VI A. 49.
" (Ptilinopus) IV Col. 16.
" (Ptilopus) " " 16.
humilis (Columba) " " 125.
" (Haliaetus) II Aq. 18; II Acc. 119.
" (Pandion) " " 18.
" (Turtur) IV Col. 125.
Huppard II Ass. 1.
huppé (Faucon) II Per. 6.
hutchinsii (Anser) VI A. 105.
" (Berniela) " " 105.
hyacinthina (Ara) III P. 2.
" (Arara) " " 2; III P. R. 1.
" (Sittace) " " 2.
hyacinthinus (Coronideus) I Cor. 46.
" (Corvus) " " 46.
" (Macrocercus) III P. 2.
" (Porphyrio) V Ra. 52, 54.
" (Psittacus) III P. 2.
hybernus (Larus) VI L 23.
hybrida (Anas) VI A. 98.
" (Hydrochelidon) VI Ster. 33.
" (Sterna) " " 32.
Hydralector cristatus V Ra. 68.
" gallinaceus " " 68.
Hydrobates lobatus VI A. 7.
hydrocharis (Dacelo) III Al. 46; III Al. R. 41.
" (Tanysiptera) " " 46; " " 41.
Hydrochelidon VI Ster. 29.
Hydrochelidon albigena " " 20.
" delalandei " " 33.
" fissipes " " 29.
" hybrida " " 33.
" melanogastra " " 21.
" nigra " " 31.
Hydrocicca V Ra. 50.
Hydrocoloeus minutus VI L. 42.
hydrocorax (Buceros) I Buc. 2.
hydrogallina (Rallus) V Ra. 14.
Hydrophasianus sinensis " " 71.
hydrophilus (Falco) II But. 16.
Hydrornia porphyrio V Ra. 38.
hyemalis (Anas) VI A. 20, 23.
" (Buteo) II But. 20.
" (Falco) " " 20.
" (Gallinago) V Sc 7.
" (Poëcilopternis) II But. 20.
Hyetornis pluvialis I Cuc. 39.
hygsinus (Psittacus) III P. 88; III P. R. 37.
Hylomanes III Mo. 6.
Hylomanes gularis " " 7.
" momotula " " 7.
hylophila (Strix) II Str. 13, 14.
" (Ulula) " " 13; II Noc. 19.
hyogaster (Ptilinopus) IV Col. 20.
hyogastra (Columba) " " 20.
" (Jotreron) " " 20.
hyperborea (Anas) VI A. 107.
hyperboreus (Anser) " " 107, 108.
" (Lobipes) V Sc. 58.
" (Phalaropus) " " 58.
" (Tringa) " " 58.
hyperrhynchus (Bucco) I Bucc. 77.
hyperythrus (Cuculus) I Cuc. 14.
Hypnodes cristatus V Ra. 40.
hypochondricus (Chrysotis) III P. 57.
hypoglaucus (Merops) III Me. 3.
hypogramma (Athene) II Noc. 25.
" (Noctua) " " 25.
hypoinochroa (Janthoenas) IV Col. 77.
hypoleuca (Gymnorhina) I Cor. 126.
" (Haematopus) IV Cur. 70.
hypoleucos (Actitis) V Sc. 80.
" (Cracticus) I Cor. 126.
" (Falco) II Fal. 17; II Acc. 37.
" (Polyborus) II Aq. 18.
" (Totanus) V Sc. 80.
" (Tringa) " " 80.
" (Tringoides) " " 80.
Hypoleucus cirrhatus VI Pe. 20.
" (Elanus) II Mil. 7; II Acc. 130.
" leucogaster VI Pe. 20.
" (Phalacrocorax) " " 20.
" varius " " 20.
hypomelaena (Parra) V Ra. 65.
hypomelas (Charadrius) IV Cur. 51.
hypomorphnus anthracinus II Asc. 8.
" ardesiacus " " 9.
" urubitinga " " 6.
hypophonius (Platycercus) III P. 91; III P. R. 38.
" (Psittacus) III P. 91.
hypopinarus (Coccystes) I Cuc. 44.
hypopolius (Nestor) III P. 156.
" (Psittacus) " " 156.
Hypotaenidia V Ra. 21.
Hypotaenidia celebensis " " 22.
" philippensis " " 23.
" striata " " 24.
" torquata " " 22.
hypoxanthus (Astur) II Ass. 16.
" (Falco) " " 16.
hypugaea (Athene) II Str. 30; II Noc. 27.
Hytiopus caffer II Acc. 133.

I.

Ibicter II Pol. 7; II Acc. 137.
Ibicter americanus " " 9; " " 133.
" ater " " 7; " " 137.
" fasciatus " " 137.
" gymnocephalus " " 138.
" leucogaster II Pol. 9.
" leucopygus " " 8; II Acc. 138.
" sociabilis " " 7; " " 138.
Ibidorhynchus IV Cur. 70.
Ibidorhynchus struthersii V Sc. 102.
Ibis V I. 1.
Ibis alba " " 5.
" (Ardea) V Ar. 31.
" (Bubulcus) " " 31.
" calva V I. 11.
" carunculata " " 10.
" cayennensis " " 8.
" chalcoptera " " 4.
" coerulescens " " 9.

Ibis comata V I. 9.
„ cristata „ „ 6.
„ egretta „ „ 12.
„ falcinellus „ „ 2.
„ hagedasch „ „ 10.
„ infuscata „ „ 8.
„ leucon „ „ 14.
„ longirostris „ „ 5.
„ macei „ „ 14.
„ melanocephala „ „ 14.
„ melanopis „ „ 7.
„ mexicanus „ „ 5.
„ nippon „ „ 9.
„ nudifrons „ „ 8.
„ (Numenius) V Cic. 18.
„ olivacea V I. 9.
„ ordii „ „ 5.
„ oxycerca „ „ 8.
„ papillosa „ „ 11.
„ peregrina „ „ 3.
„ plumbea „ „ 9.
„ religiosa „ „ 12.
„ rubra „ „ 6.
„ spinicollis „ „ 12.
„ strictipennis „ „ 14.
„ (Tantalus) V Cic. 18.
Ichthyaëtus II Aq. 17
Ichthyaëtus bicolor „ „ 17.
„ bucarius „ „ 17.
„ (Chroicocephalus) VI L. 34.
„ (Falco) II Aq. 17.
„ (Haliaetus) IIAq. 17; IIAcc. 118.
„ (Larus) VI L. 34.
„ minor (Larus) „ „ 34.
„ nanus II Aq. 18.
„ pallasii VI L. 34.
Ichthyoborus II But. 17.
icterotis (Conurus) III P. 97; III P.R. 4.
„ (Platycercus) „ „ 97; „ „ 40.
„ (Psittacus) „ „ 97.
Ictinia IIMil. 9; IIAcc. 131.
Ictinia missisippensis „ „ 10; „ „ 131.
„ ophiophaga „ „ 10.
„ plumbea „ „ 10; IIAcc. 131.
idiotis (Anas) VI A. 36.
Ieracidea II Fal. 35.
Ieracidea berigora „ „ 36.
„ occidentalis „ „ 36.
Ierax coerulescens „ „ 33.
igneus (Falcinellus) V I. 2.
igniceps (Bucco) I Bucc. 20.
„ (Corythaix) I Cuc. 75.
ignipalliatus (Phoenicopterus) VI A. 117.
ignobiles (Musophagae) I Cuc. 78.
iliacus carolinensis (Turdus) I Bucc. 79.
illiceti (Corvus) I Cor. 59.
illigeri (Macrocercus) III P. 7.
immaculata (Gallinula) V Ra. 36.
„ (Herodias) V Ar. 12.
„ (Porzana) V Ra. 36.
immaculatus (Rallus) „ „ 8.
immer (Colymbus) VI U. 30.
immutabilis (Cygnus) VI A. 78.
impennis (Alca) VI U. 13.
„ (Pinguinus) „ „ 13.
imperator (Aptenodytes) „ „ 3.
imperialis (Aphanapteryx) IV St. 4.
„ (Aquila) II Aq. 2; II Acc. 115.
„ (Falco) „ „ 2.
„ (Mergus) VI A. 2.
„ (Vultur) II Vul. 9.
impudiens (Corvus) I Cor. 10.
Inamb a tao VIII Ti. 8.
inca (Anous) VI Ster. 39.
„ (Chamaepelia) IV Col. 133.
„ (Geopelia) „ „ 133.
„ (Naenia) VI Ster. 39.
„ (Scardafella) IV Col. 133.
„ (Sterna) VI Ster. 39.
incana (Scolopax) V Sc. 74.
incanus (Lobipes) „ „ 60.
„ (Totanus) „ „ 74.
incerta (Procellaria) VI Proc. 9.
„ (Psittacula) III P. 73; III P. R. 32.
„ (Psittacus) „ „ 73.
incertus (Cacomantis) I Cuc. 26.
„ (Cuculus) „ „ 26.
„ (Psittacus) III P. 73.
incinctus (Halcyon) III Al. 41.
inconspicuus (Charadrius) IV Cur. 41.
indiana (Limosa) V Sc. 77.
indica (Anas) VI A. 114.
„ (Ardea) V Cic. 7.
„ (Buceros rhinoceros) I Buc. 6.
„ (Chalcophaps) IV Col. 145.
„ coccinea (Psittaca) III P. 128.
„ (Columba) IV Col. 145.
„ (Coracias) I Cor. 135.
„ (Eos) III P. 128.
„ (Grus orientalis) V Ra. 3.
„ (Mycteria) V Cic. 7.
„ (Parra) V Ra. 67.
„ (Rhynchaea) V Sc. 17.
„ (Scolopax) „ „ 2, 13.
„ (Sterna) VI Ster. 33.
„ (Strix) II Noc. 15.
indicus (Anser) VI A. 114.
„ (Astur trivirgatus) II Ass. 22; II Acc. 65.
„ (Bucco) I Bucc. 24.
„ (Charadrius) IV Cur. 24, 25.
„ cirratus (Falco) II Ass. 6; IIAcc. 52.
„ (Colius) I Cuc. 80.
„ (Cuculus) „ „ 6, 17.
„ (Cuculus canorus) „ „ 6.
„ (Falco) II But. 22.
„ (Falco communis) II Fal. 5.
„ (Falco ruber) „ „ 5.
„ (Lobivanellus) IV Cur. 68.
„ (Lophotes) II Per. 4.
„ (Loriculus) III P. 132; III P.R. 60.
„ (Metopidius) V Ra. 67.
„ (Oriolus) I Cor. 102.
„ (Poliornis) II But. 22.
„ (Porhyrio) V Ra. 53, 55.
„ (Psittacus) III P. 128, 132.

indicus (Rallus) V Ra. 24.
„ (Tantalus) V Cic. 17.
„ (Totanus) V Sc. 51.
„ (Vanellus) IV Cur. 68.
„ (Vultur) II Vul. 7; II Acc. 140.
„ (Vultur fulvus) II Vul. 7; II Acc. 140.
Indicator I Cuc. 1.
Indicator albirostris „ „ 2.
„ archipelagicus „ „ 2.
„ diadematus „ „ 2.
„ flaviventris „ „ 1.
„ levaillantii „ „ 2.
„ maculatus „ „ 2.
„ maculicollis „ „ 2.
„ major „ „ 1, 2.
„ minimus „ „ 2.
„ minor „ „ 2.
„ proditor „ „ 1.
„ regulus „ „ 35.
„ sparrmannii „ „ 2.
„ variegatus „ „ 2.
indranee (Strix) II Str. 19.
indrani (Ulula) „ „ 19; II Noc. 20; II Oti. 12.
indus (Falco) II Aq. 19; II Acc. 119.
„ (Haliaetus) „ „ 19; „ „ 119.
„ (Haliastur) „ „ 19.
ineptus (Didus) IV St. 3.
inexpectata (Procellaria) VI Proc. 12.
infaustus (Cacomantis) I Cuc. 23.
„ (Garrulus) I Cor. 65.
„ (Lanius) „ „ 65.
„ (Perisorius) „ „ 65.
infuscata (Athene) II Str. 31.
„ (Ibis) V I. 8.
„ (Noctua) II Str. 31; II Noc. 29.
„ (Phalaenopsis) „ „ 29.
„ (Sterna) VI Ster. 25, 26.
„ (Strix) II Str. 31.
„ (Thalassipora) VI Ster. 26.
infuscatus (Phimosis) V I. 8.
Inocotis papillosa „ „ 11.
inornata (Bernicla) VI A. 101, 102.
„ (Chloroenas) IV Col. 78.
„ (Columba) „ „ 78.
„ (Malacoptila) I Bucc. 85.
„ (Monasa) „ „ 85.
„ (Pitta) III Pit. 7.
„ (Querquedula) VI A. 50.
inornatus (Anas) „ „ 101.
„ (Charadrius) IV Cur. 39, 63.
„ (Cuculus) I Cuc. 26.
„ (Lobivanellus) IV Cur. 69.
„ (Sarcogrammus) „ „ 69.
„ (Vanellus) „ „ 63, 69.
insectivorus (Falco) II Acc. 100.
insignatus (Buteo) II Acc. 107.
insolitus (Ptilopus) IV Col. 16.
insperatus (Cuculus) I Cuc. 23.
intermediaire (Egrette) V Ar. 19.
intermedia (Ardea) „ „ 19.
„ (Columba) IV Col. 64.
„ (Egretta) V Ar. 19.
intermedius (Anser) VI A. 110.
„ (Charadrius) IV Cur. 28.
„ (Chrysococcyx) I Cuc. 29.
„ (Corvus) I Cor. 2, 16.
„ (Eclectus) III P. 41; III P. R. 16.
„ (Elanus) II Mil. 7; II Acc. 130.
„ (Himantopus) V Sc. 106.
„ (Numenius) „ „ 100.
„ (Psittacodis) III P. 41.
interpres (Cinclus) IV Cur. 43.
„ (Strepsilas) „ „ 43.
„ (Tringa) „ „ 43.
iobensis (Ptilopus humeralis) IV Col. 16.
iogaster (Nisus) II Ass. 43; II Acc. 76, 89.
„ (Ptilopus) IV Col. 20.
iozonus (Ptilinopus) „ „ 17.
„ (Ptilopus) „ „ 17.
ipecutiri (Anas) VI A. 61.
irena (Pitta) III Pit. 11.
iriditorques (Columba) IV Col. 69.
iris (Coriphilus) III P. 116.
„ (Nanodes) III P. 116; III P. R. 53.
„ (Pitta) III Pit. 6; III Pit. R. 16.
„ (Psittacus) III P. 116.
„ (Tanysiptera) III Al. 43.
irroratus (Dromajus) IV St. 7.
isabella (Glareola) IV Cur. 18.
isabellina (Euryzona) V Ra. 16.
„ (Gallinula) „ „ 16.
„ (Rallina) „ „ 16.
isabellinus (Charadrius) IV Cur. 34.
„ (Cursorius) „ „ 12.
„ (Turtur) IV Col. 117.
Ischnoscelis II Ass. 52.
Ischnoscelis aterrimus „ „ 53.
„ gracilis „ „ 53.
„ hemidactylus „ „ 53.
„ nigra „ „ 53.
Ischyornis derbyanus V Ra. 72.
isiurus (Milvus) II Mil. 4; II Acc. 129.
islandica (Anas) VI A. 21.
„ (Bucephala) „ „ 21.
„ (Clangula) „ „ 21.
„ (Fuligula) „ „ 21.
„ (Limosa) V Sc. 19.
„ (Tringa) „ „ 29.
islandicus (Cygnus) VI A. 82.
„ (Falco) II Fal. 7, 13.
„ (Falco candicans) II Fal. 14; II Acc. 34.
„ (Falco gyrfalco) II Fal. 14; II Acc. 34, 35.
isodori (Bubutus) I Cuc. 52.
ispida (Alcedo) III Al. 6; III Al. R. 2.
„ bengalensis „ „ 7.
„ bengalensis minor „ „ 7.
„ bicincta „ „ 2.
„ bitorquata „ „ 2.
„ brasiliensis naevia I Bucc. 84.
„ gigantea III Al. 3.
„ senegalensis „ „ 7.
Ispidina cyanotis „ „ 16.

Ispidina madagascariensis III Al. R. 32.
" picta III Al. 16.
" ruficeps III Al. R. 9.

J.

jabiru (Ciconia) V Cic. 8.
Jacana V Ra. 71.
iackal (Buteo) II But. 14; II Acc. 110.
" (Falco) " " 14.
jacobinus (Coccystes) I Cuc. 44.
" (Cuculus) " " 45.
jamaicensis (Ara) III P. 3.
" (Charadrius) IV Cur. 23.
" (Columba) IV Col. 158.
" (Corvus) I Cor. 25, 33.
" (Cuculus) I Cuc. 39.
" (Leptopila) IV Col. 153.
" (Ortygometra) V Ra. 36.
" (Porzana) " " 36.
" (Rallus) " " 36.
" (Saurothera) I Cuc. 39.
jambu (Columba) IV Col. 36.
" (Ptilinopus) " " 36.
" (Ptilopus) " " 36.
" (Rhamphiculus) " " 36.
jamesoni (Larus) VI L. 28.
" (Xylocota) V Sc. 8.
jamesonii (Bruchigavia) VI L. 28.
jandaya (Conurus) III P. 18; III P. R. 5.
" (Psittacus) " " 18.
janthina (Columba) IV Col. 74.
" (Janthoenas) " " 74.
" kittlitzii " " 74.
Janthoenas " " 74.
Janthoenas albigularis " " 75.
" castaneiceps " " 77.
" griseogularis " " 75.
" halmaherae " " 76.
" hypoinochroa " " 77.
" janthina " " 74.
" leucosoma " " 76.
" luzoniensis " " 74, 75.
" metallica " " 74, 75.
" vitiensis " " 77.
japonensis (Corvus) I Cor. 15.
japonica (Athene) II Str. 25.
" (Gallinago) V Sc. 4.
" (Noctua hirsuta) II Str. 25; II Noc. 23.
" (Pica) I Cor. 39.
" (Spilura solitaria) V Sc. 15.
" (Strix hirsuta) II Str. 25.
japonicus (Buteo) II But. 7; II Acc. 106.
" (Buteo vulgaris) II But. 7.
" (Garrulus) I Cor. 60.
" (Garrulus glandarius) " " 60.
" (Otus) II Oti. 20.
" (Psittacus) III P. 130.
" (Scops) II Oti. 20.
japura (Pezus) VIII Ti. 21, 28.
jardinii (Circus) II Cir. 9; II Acc. 50.
" (Crex) V Ra. 27.
jardinii (Gallinula) V Ra. 27.
" (Noctua) II Noc. 29.
" (Phalaenopsis) " " 29.
jassana (Parra) V Ra. 66.
javana (Anas) VI A. 72.
javanensis (Bubo) II Oti. 18; II Noc. 6.
" (Ketupa) " " 18.
" (Querquedula) VI A. 72.
javanica (Ardea) V Ar. 43.
" (Argala) V Cic. 13.
" (Butorides) V Ar. 43.
" (Chalcophaps) IV Col. 145.
" (Ciconia) V Cic. 13.
" (Dendrocygna) VI A. 89.
" (Gallinula) V Ra. 41.
" (Mycteria) V Cic. 13.
" (Scolopax) V Sc. 3.
" (Sterna) VI Ster. 21.
" (Strix) II Str. 4; II Noc. 15.
javanicus (Haliaeus) VI Pe. 13.
" (Leptopilus) V Cic. 13.
" (Merops) III Me. 2.
" (Palaeornis) III P. 79, 86; III P. R. 36.
" (Phoenicophaës) I Cuc. 55.
" (Psittacus) III P. 86.
" (Totanus) V Sc. 77.
" (Zanclostomus) I Cuc. 55.
javensis (Bucco) I Bucc. 19.
" (Chotorea) " " 19.
" (Megalaima) " " 19.
jerdonii (Treron) IV Col. 46.
jeridius (Ninox) II Str. 25.
jobiensis (Carpophaga pinon) IV Col. 95.
" (Tallegallus) VIII Ti. 82.
" (Tallegallus cuvieri) " " 82.
Jonornis martinica V Ra. 38.
jonquillaceus (Psittacus) III P. 92.
jota (Vultur) II Vul. 2, 3.
Jotreron eugeniae IV Col. 22.
" hyogastra " " 20.
" melanocephala " " 28.
" nana " " 21.
" rivoli " " 24.
" virens " " 30.
" viridis " " 22.
jubata (Anas) VI A. 95, 97.
" (Chenalopex) " " 95.
" (Chlamydauchen) " " 97.
jubatus (Anser) " " 97.
jugger (Falco) II Fal. 17; II Acc. 36.
jugularis (Ardea) V Ar. 25.
" (Charadrius) IV Cur. 38.
" (Conurus) III P. 29.
" (Psittaculus) III P. 29; III P. R. 7.
jukesii (Psittacus) " " 42.
juliae (Halcyon) III Al. R. 29.
julius (Nothocercus) VIII Ti. 18.
" (Tinamus) " " 18.

K.

Kakadoe temminckii III P. 153.
Kakatua tenuirostris " " 146.

kamtschatica (Alca) VI U. 25.
Kanakamo VI A. 67.
kaupii (Casuarius) IV St. 10.
keptuschka (Tringa) IV Cur. 58.
keraudreni (Phonygama) I Cor. 120.
keraudrenii (Chalybaeus) " " 120.
ketupa (Bubo) II Oti. 18.
" ceylonensis " " 19.
" javanensis " " 18.
" flavipes " " 18.
" (Strix) " " 18.
kieneri (Psittacus) III P 83.
" (Spizaetus) II Ass. 7; II Acc. 58.
kienerii (Spizaetus) " " 11.
kiolo (Rallus) V Ra. 17.
kirtlandii (Strix) II Noc. 18.
Kitta buccoides I Cor. 118.
" holosericea " " 117.
" speciosa " " 68.
" thalassina " " 67.
" venatoria " " 68.
" virescens " " 117.
kittlitzii (Charadrius) IV Cur. 34.
" (Janthina) IV Col. 74.
" (Larus) VI L. 37, 40.
" (Leucopolius) IV Cur. 34.
" (Uria) VI U. 21.
klasii (Cuculus) I Cuc. 30.
" (Lamprococcyx) " " 30.
kleei (Tinamus) VIII Ti. 8.
kogolka (Anas) VI A. 44.
kolbei (Vultur fulvus) II Vul. 7; II Acc. 140.
kolbi (Vultur) " " 7; " " 140.
kori (Otis) IV Cur. 8.
korthalsii (Sphenocercus) IV Col. 60.
" (Treron) " " 60.
" (Vinago) " " 60.
kotorea (Barbu) I Bucc. 19, 34.
" (Bucco) " " 19.
kotzebui (Rissa) VI L. 30.
krynicki (Garrulus) I Cor. 58.
kuhli (Asturina) II Ase. 12; II Acc. 104.
" (Leucopternis) " " 104.
kuhlii (Puffinus) VI Proc. 24.
kundoo (Oriolus) I Cor. 101.
Kurotreron oopa IV Col. 15.
Kurukuru clementinae " " 6.
" (Columba) " " 15.
" purpureo-leucocephalus " 14.
" samoensis " " 10.
Kurutreron chrysogaster " " 14.
" coralensis " " 14.

L.

labradora (Alca) VI U. 26.
labradoria (Anas) VI A. 19.
" (Fuligula) " " 19.
labradorica (Alca) VI U. 28.
labradorius (Camptolaimus) VI A. 19.
lacernulata (Carpophaga) IV Col. 95.
" (Columba) " " 95.
" (Ducula) " " 95.
lacernulatus (Falco) II Ase. 11.
lacrymans (Uria) VI U. 15.
lacrymosus (Larus) VI L. 35.
lactea (Galachrysia) IV Cur. 17.
" (Glareola) " " 17.
" (Strix) II Oti. 11.
lacteola (Cephus) VI U. 18.
lacteus (Bubo) II Oti. 11; II Noc. 5; II Str. 19.
" (Tantalus) V Cic. 18.
laevirostra (Crotophaga) I Cuc. 47.
laevirostris (Pogonia) I Bucc. 3.
lafresnayi (Merops) III Me. 11.
lagopus (Buteo) II But. 1; II Acc. 104.
" (Falco) " " 1, 2.
Laimodon I Bucc. 1.
Laimodon albiventris " " 6.
" diadematus " " 9.
" leucocephalus " " 4.
" undatus " " 8.
lalandei (Circus) II Cir. 7.
lamarckii (Merops) III Me. 6.
lambruschini (Gelastes) VI L. 28.
" (Larus) " " 28.
lamelligerus (Anastomus) V Cic. 15.
" (Hiator) " " 15.
Lamprococcyx chrysites I Cuc. 31.
" chrysochloris " " 31.
" klasii " " 30.
" resplendens " " 30.
Lamprococcocyx smaragdinus " " 32.
Lampromorpha amethystina " " 32.
" chalcopepla " " 31.
lampronotus (Charadrius) IV Cur. 57.
Lamprotreron holosericea IV Col. 41.
" porphyrea " " 33.
" superba " " 30.
lanarius capensis (Falco) II Fal. 16; II Acc. 35.
" (Falco) II Fal. 14, 16; " " 35.
" graecus (Falco) II Fal. 15; " " 35.
" nubicus (Falco) " " 15; " " 35.
lanceolatus (Cacomantis) I Cuc. 21.
" (Cuculus) " " 21.
" (Garrulus) I Cor. 61.
Lanier II Fal. 1.
Lanier aephanet II Fal. 15.
" grec " " 15.
Lanius infaustus I Cor. 65.
" macrurus I Cuc. 80.
" torquatus I Cor. 129.
lansbergi (Coccygus) I Cuc. 39.
lansbergii (Peristera) IV Col. 139.
lantzii (Accipiter) II Acc. 72.
" (Nisus) " " 72.
lanuginosus (Anser) VI A. 14.
Laomedontia australasiana V Ra. 3.
" carunculata " " 5.
la perousii (Megapodius) VIII Ti. 57.
la peyrousii (Megapodius) " " 65.
lapponica (Limosa) V Sc. 23.
" (Strix) II Str. 9.
Lari VI L. 1.
Lari cucullati " " 31.

Lari marini VI L. 4.
Lark heeled cuckow I Cuc. 67.
Laroides borealis VI L. 15.
" occidentalis " " 15.
Larus " " 1.
Larus albipennis " " 42.
" andersoni " " 28.
" arcticus " " 4.
" argentaceus " " 16.
" argentatoides " " 16.
" argentatus " " 15, 16.
" atricilla " " 44.
" audouini " " 22.
" bathyrhynchus " " 8.
" belcheri " " 9.
" bonapartei " " 41.
" borealis " " 15, 16.
" brachyrhynchus " " 22, 30.
" brevirostris " " 30.
" bridgesi " " 44.
" brunnicephalus " " 35.
" cachinnans " " 15, 16.
" californicus " " 16.
" canus " " 23, 26.
" canus major " " 26.
" capistratus " " 37.
" catarractes " " 45.
" cirrhocephalus " " 36.
" citrirostris " " 23.
" crassirostris " " 8, 32.
" cucullatus " " 36.
" delawarensis " " 22.
" dominicanus " " 12.
" eburneus " " 6.
" franklini " " 36.
" fuliginosus " " 9.
" furcatus " " 44.
" fuscus " " 14.
" georgii " " 8.
" glacialis " " 4, 5.
" glaucescens " " 6.
" glaucotis " " 42.
" glaucus " " 4.
" haematorhynchus " " 33.
" hartlaubii " " 37.
" heermanii " " 9.
" heinii " " 26.
" hemprichii " " 32.
" hybernus " " 23.
" ichthyaëtus " " 34.
" " minor " " 34.
" jamesoni " " 28.
" kittlitzii " " 37, 40.
" lacrymosus " " 35.
" lambruschini " " 28.
" leucophaeus " " 16.
" leucophthalmus " " 32.
" leucopterus " " 5.
" maculipennis " " 36.
" major " " 29.
" marinus " " 10.
" melanocephalus " " 43.
" melanorhynchus " " 41.
Larus melanurus VI L. 8.
" michahellesii " " 16.
" minutus " " 41, 42.
" modestus " " 44.
" niveus " " 26.
" occidentalis " " 15, 22.
" pacificus " " 7.
" parasiticus " " 47.
" personatus " " 35, 44.
" plumbeiceps " " 36.
" pomare " " 28, 29.
" pomarinus " " 47.
" ridibundus " " 37.
" risorius " " 37.
" sabinei " " 44.
" schimperi " " 40.
" scopulinus " " 28.
" scopulinus major " " 29.
" scoresbyi " " 33.
" serranus " " 35, 44.
" suckleyi " " 27.
" tenuirostris " " 28.
" tridactylus " " 30.
" zonorhynchus " " 22.
" " bruchi " " 22.
" " mexicanus VI L. 22.
larvata (Anas) VI A. 60.
" (Aplopelia) IV Col. 161.
" (Columba) " " 161.
" (Leptopila) " " 161.
" (Pica) I Cor. 51.
" (Querquedula) VI A. 60
" (Strix) II Str. 17.
larvatus (Charadrius) IV Cur. 37.
" (Oriolus) I Cor. 107.
lateralis (Crex) V Ra. 35.
" (Lobivanellus) IV Cur. 68.
" (Vanellus) " " 68.
Laterirallus albifrons V Ra. 35.
" exilis " " 35.
lathami (Bucco) I Bucc. 73.
" (Psittacus) III P. 114.
" (Sagmathorina) VI U. 26.
" (Totanus) V Sc 68.
lathamii (Tallegallus) VIII Ti. 53, 79.
Lathamus azureus III P. 103.
" rubrifrons " " 114.
latipennis (Ephialtes) II Oti. 20.
" (Gallinago) V Sc. 4.
latirostris (Anas) VI A. 28.
" (Nyroca) " " 28.
latissimus (Falco) II But. 20.
latrans (Carpophaga) IV Col. 91.
layardi (Megapodius) VIII Ti. 65.
" (Palaeornis) III P. R. 35.
" (Psittacus) III P. 81.
lazuli (Alcedo) III Al. 10, 42.
" (Dacelo) " " 42; III Al. R. 31.
" (Halcyon) " " 42.
leachii (Calyptorhynchus) III P. 153.
" (Dacelo) III Al. 20; III Al. R. 11.
" (Procellaria) VI Proc. 3.
" (Psittacus) III P. 152, 153,

leachii (Thalassidroma) VI Proc. 3.
leadbeateri (Cacatua) IIIP.141; IIIP.R.66.
" (Plyctocophus) III P. 141.
leari (Lophochroa) " " 144.
lecontei (Alcedo) III Al. 16; III Al.R. 9.
lefeburii (Merops) III Me. 11.
lefevri (Sula) VI Pe. 38.
Leguatia gigantea IV St. 2; V Ra. 52.
Leipoa VIII Ti. 54, 83.
Leipoa ocellata " " 83.
lempyi (Ephialtes) II Oti. 23.
" (Scops) II Oti. 24; II Noc. 10.
" (Strix) " " 23, 24.
lentiginosa (Ardea) V Ar. 49.
lepida (Ardea) " " 40.
" (Ceyx) III Al. 48; III Al. R. 34.
" (Dacelo) " " 48; " " 34.
" (Tanysiptera) III Al. 48.
Lepidoenas IV Col. 69.
Lepidoenas elphinstonii " " 70.
" loricata " " 69.
" plumbea " " 70.
" pulchricollis " " 71.
" speciosa " " 70.
" torringtoni " " 71.
Lepidogenys subcristatus II Per. 4.
Lepidogrammus cumingi I Cuc. 51.
lepidus (Centropus) " " 68.
" (Cuculus) " " 8.
leptodetus (Cuculus) " " 6.
leptogrammica (Ciccaba) II Str. 20.
" (Coccyzura) IV Col. 108.
" (Columba) " " 107.
" (Macropygia) " " 107.
" (Strix) II Str. 20.
" (Ulula) " " 20; II Noc. 21.
Leptopelecanus fuscus VI Pe. 28.
Leptopila IV Col. 158.
Leptopila albifrons " " 160.
" brachyptera " " 160.
" brasiliensis " " 159.
" brevipennis " " 158.
" cassinii " " 159
" cerviniventris " " 159.
" dubusii " " 159.
" erythroptera " " 162.
" erythrothorax " " 160.
" hoedtii " " 163.
" jamaicensis " " 158.
" larvata " " 161.
" pampusan " " 162.
" picata " " 163.
" plumbeiceps " " 160.
" rufaxilla " " 160.
" stairii " " 162.
" verreauxii " " 158.
Leptopilos argala V Cic. 13.
" crumenifera " " 12.
Leptopilus javanicus " " 13.
leptorhyncha (Psittacara) III P. 22.
leptorhynchus (Conurus) " " 22; III P. R. 6.
leptorhynchus (Enicognathus) III P. 22.
" pectoralis V Sc. 108.
" ruficaudus III P. 22.
Leptosomus I Cuc. 36.
Leptosomus crombus " " 36.
" discolor " " 36.
" viridis " " 36.
Leptotarsus eytoni VI A. 87.
Lepturus candidus VI Pe. 43.
leschenaltii (Merops) III Me. 9.
" (Strix) II Oti. 19.
leschenaultii (Charadrius) IV Cur. 39.
lessoni (Dromiceius) " " 47.
" (Momotus) III Mo. 4.
lessonii (Alcyone) III Al. 17; III Al. R. 9.
" (Phonygamia) I Cor. 120.
" (Prionites) III Mo. 4.
Lestris antarcticus VI L. 46.
" catarractes " " 45.
" cephus " " 49.
" " fuscus " " 49.
" hardyi " " 49.
" parasitica " " 47.
" " coprotheres " " 47.
" pomarinus " " 47.
" " fuscus " " 47.
" richardsoni " " 47.
" spinicauda " " 49.
lettia (Scops) II Oti. 23; II Noc. 9.
" (Strix) " " 23.
lettiensis (Ptilopus cinctus) IV Col. 35.
leuce (Ardea) V Ar. 17.
" (Egretta) " " 17.
leucaëtos (Falco) II Ass. 20.
Leucarbo magellanicus VI Pe. 21.
" purpurascens " " 20.
leucauchen (Falco) II Ass. 50; II Acc. 98.
" (Grus) V Ra. 3.
leucocapilla (Sterna) VI Ster. 37.
leucocapillus (Anous) " " 37.
Leucocarbo carunculatus VI Pe. 20.
leucocephala (Alcedo) III Al. 13; III Al.R. 7.
" (Amazona) IIIP.59; IIIP.R.28.
" (Anas) VI A. 11.
" (Aquila) II Aq. 12.
" (Ardea) V Cic. 9.
" (Biziura) VI A. 51.
" (Ciconia) V Cic. 9.
" (Columba) IV Col. 68.
" (Erismatura) VI A. 12.
" (Halcyon) III Al. 13.
" (Procellaria) VI Proc. 12.
leucocephalus (Buteo) II But. 3.
" (Falco) II Aq. 12.
" (Haliaetus) II Aq. 12; II Acc. 117.
" (Himantopus) V Sc. 106.
" (Laimodon) I Bucc. 4.
" (Melanopelargos) V Cic. 9.
" (Pandion) II Acc. 123.
" (Pogonorhynchus) I Bucc. 4.
" (Psittacus) III P. 58, 59.
" (Ptilinopus) IV Col. 14.

leucocephalus (Tantalus) V Cic. 17.
leucoceps (Sterna) VI Ster. 36.
leucocrissus (Bucco) I Bucc. 77.
leucogaster (Alcedo) III Al 15; III Al.R.8.
" (Amazona) IIIP.63; IIIP.R.29.
" (Ardea) V Ar. 9.
" (Centropus) I Cuc. 63.
" (Coridonyx) " " 63.
" (Dendrocitta) I Cor. 74.
" (Falco) II Aq. 14.
" (Glaucopis) I Cor. 74.
" (Graculus) VI Pe. 20.
" (Haliaetus) IIAq.14; IIAcc.117.
" (Herodias) V Ar. 9.
" (Hypoleucus) VI Pe. 20.
" (Ibicter) II Pol. 9.
" (Phalacrocorax) VI Pe. 20.
" (Phoenicophaës) I Cuc. 53.
" (Psittacus) III P. 63.
" (Ptilinopus) IV Col. 30.
" (Schizaerhis) I Cuc. 78.
leucogastra (Musophaga) " " 78.
" (Sula) VI Pe. 41.
" (Thalassidroma) VI Proc. 5.
leucogenys (Merganetta) VI A. 12.
" (Sterna) VI Ster. 32.
Leucogeranos giganteus V Ra. 5.
" (Grus) " " 5.
leucognaphalus (Corvus) I Cor. 32, 33.
leucolaima (Barbatula) I Bucc. 46.
" (Megalaima) " " 46.
" (Phalaenopsis) II Noc. 29.
leucolopha (Ardea) V Ar. 50.
leucolophum (Tigrisoma) " " 50.
leucolophus (Botaurus) " " 50.
" (Cacatua) III P. 143.
" (Caliechthrus) I Cuc. 16.
" (Cuculus) " " 16.
" (Hiracococcyx) " " 16.
" (Simotes) " " 16.
Leucomelaena norfolciensis IV Col. 103.
leucomelana (Erythra) V Ra. 42.
" (Gallinula) V Ra. 42.
leucomelanura (Ceryle) III Al. 2.
leucomelas (Anas) VI A. 69.
" (Bucco) I Bucc. 7.
" (Corvus) I Cor. 13.
" (Pogonorhynchus) I Bucc. 7.
" (Procellaria) VI Proc. 24.
" (Puffinus) " " 24.
leucon (Ibis) V I. 14.
leuconota (Biziura) VI A. 8.
" (Clangula) " " 8.
" (Columba) IV Col. 69.
" (Gymn rhina) I Cor. 126.
" (Thalassornis) VI A. 8.
leuconotus (Ardea) V Ar. 60.
" (Bucco) I Bucc. 3.
" (Colius) I Cuc. 79.
" (Corvus) I Cor. 3.
" (Helotarsus) II Acc. 115.
" (Nycticorax) V Ar. 60.
" (Vultur) II Vul. 8.
leucopareia (Sterna) VI Ster. 32.
leucopareius (Anser) VI A. 105.
leucophaea (Ardea) V Ar. 5.
" (Limosa) V Sc. 23.
" (Scolopax) " " 26.
Leucophaeus belcheri VI L. 9.
" (Corvus) I Cor. 13.
" fuliginosus VI L. 9.
" haematorhynchus VI L. 33.
" (Larus) " " 16.
leucophrys (Anas) VI A. 42.
" (Columba) IV Col. 162.
" (Porzana) V Ra. 32.
leucophthalma (Nyroca) VI A. 30.
" (Psittacula) III P. 69.
leucophthalmos (Anas) VI A. 30.
" (Uria) VI U. 15.
leucophthalmus (Adelarus) VI L. 32.
" (Larus) " " 32.
leucopolius (Charadrius) IV Cur. 35.
" kittlitzii " " 34.
" nivifrons " " 35.
" pecuarius " " 34.
leucoprymna (Aquila) II Aq. 9.
" (Ardea) V Ar. 9.
" (Herodias) V Ar. 9.
leucops (Ardea) V Ar. 28.
" (Bucco) I Bucc. 89.
" (Capito) " " 89.
" (Monasa) " " 89.
" (Lypornix) " " 89.
leucopsis (Anser) VI A. 104.
" (Bernicla) " " 104.
" (Uria) VI U. 15.
leucoptera (Afrotis) IV Cur. 6.
" (Anas) VI A. 99.
" (Ardea) V Ar. 32.
" (Ardeola) " " 35.
" (Casarca) VI A. 64.
" (Columba) IV Col. 152.
" (Ciconia) V Cic. 6.
" (Cookilaria) VI Proc. 12.
" (Cryptorhina) I Cor. 72.
" (Fulica) V Ra. 64.
" grayi (Ardea) V Ar. 35.
" (Melopelia) IV Col. 152.
" (Procellaria) VI Proc. 12.
" (Prosobonia) V Sc. 18.
" speciosa (Ardea) V Ar. 34.
" (Sterna) VI Ster. 31.
" (Tringa) V Sc. 18.
Leucopternis albicollis II Asc. 9.
" kuhli II Acc. 104.
" palliata " " 103.
" superciliaris II Acc. 104; II Asc. 12.
leucopterus (Anser) VI A. 101.
" (Buphus) V Ar. 35.
" (Cracticus) I Cor. 129.
" (Glaucopis) " " 72.
" (Larus) VI L. 5.
" (Leucus) " " 5.
" minor (Leucus) VI L. 5.

leucopterus (Podiceps) VI U. 38.
" (Pyrrhocorax) I Cor. 56.
leucopus (Haematopus) IV Cur. 74.
" (Ostralega) " " 74.
leucopyga (Fulica) V Ra. 63, 64.
leucopygialis (Chalcopsitta) III P. 122.
leucopygus (Falco) II Pol. 8.
" (Ibicter) " " 8; II Acc. 138.
leucorhynchus (Bucco) I Bucc. 32.
" (Psittacus) III P. 62.
leucorodia (Platalea) V Cic. 19.
leucorrhoa (Asturina) II Ase. 5; II Acc. 102.
" (Procellaria) VI Proc. 3.
leucorrhous (Falco) II Ase. 5.
leucorypha (Aquila) II Aq. 15.
leucoryphus (Haliaetus) II Aq. 15; II Acc. 118.
Leucosarcia picata IV Col. 163.
leucosoma (Gallinula) V Ra. 32.
" (Janthoenas) IV Col. 76.
leucospila (Ephialtes) II Oti. 23; II Noc. 11.
leucosternus (Haliaetus) II Aq. 19.
" (Haliastur) II Acc. 119.
leucosticta (Chloroceryle) III Al. 5.
leucosticticus (Bubo) II Oti. 16; II Noc. 6.
leucostigma (Anas) VI A. 49.
" (Aquila) II Ass. 12.
" (Buceros) I Buc. 16.
leucotis (Bubo) II Oti. 17; II Noc. 6.
" (Chloroenas) IV Col. 79.
" (Colius) I Cuc. 80.
" (Columba) IV Col. 79.
" (Conurus) III P. 24; III P.R. 6.
" (Corythaix) I Cuc. 75.
" (Megalaema) I Bucc. 48.
" (Megalaima) " " 48.
" (Musophaga) I Cuc. 75.
" (Phapitreron) IV Col. 79.
" (Psittacus) III P. 24.
" (Rollandia) VI U. 42.
" (Scops) II Oti. 17.
" (Strix) " " 17.
" (Tamatia) I Bucc. 82.
" (Turaco) I Cuc. 75.
Leucotreron cincta IV Col. 34.
" gironnieri " " 36.
" gularis " " 37.
leucura (Chettusia) IV Cur. 59.
" (Scolopax) V Sc. 6.
leucurus (Butaëtus) II But. 9.
" (Buteo) " " 9.
" (Charadrius) IV Cur. 59.
" (Elanoides) II Mil. 8.
" (Elanus) II Mil. 8; II Acc. 130.
" (Helodromus) V Sc. 70.
" (Himantopus) V Sc. 107.
" (Milvago) II Pol. 3.
" (Milvus) II Mil. 8.
" (Totanus) V Sc. 71.
" (Vanellus) IV Cur. 59.
Leucus arcticus VI L. 4.
" chalcopterus " " 6.
" glaucescens " " 5.
" glaucus " " 4.
Leucus leucopterus VI L. 5.
" " minor " " 5.
levaillantii (Bucco) I Bucc. 3.
" (Chrysotis) III P. 55; III P.R. 27.
" (Columba) IV Col. 121.
" (Coracias) I Cor. 137.
" (Corvus) " " 27.
" (Indicator) I Cuc. 2.
" (Momotus) III Mo. 6.
" (Plotus) VI Pe. 25.
" (Psittacus) III P. 33, 116.
" (Turtur) IV Col. 121.
Lewinia pectoralis V Ra. 12.
lewinii (Rallus) " " 12.
lichtensteinii (Psittacara) III P. 23.
Licmetis tenuirostris III P. 146.
licua (Athene) II Str. 36.
" (Strix) " " 36, 37.
lidthii (Garrulus) I Cor. 61.
lignator (Centropus) I Cuc. 68.
lilacina (Callialcyon) III Al. 25.
" (Halcyon) III Al. 25.
limbata (Glareola) IV Cur. 15.
limbatus (Buceros) I Buc. 13.
Limicola fedoa V Sc. 23.
" marmorata " " 23.
" pygmaea " " 49.
" (Rallus) V Ra. 10.
limnaëtus (Falco) II Ass. 6.
" nipalensis II Acc. 52.
" (Spizaetus) II Ass. 7.
limnicola (Ardea) V Ar. 55.
limnophylax (Ardea) " " 55.
" (Botaurus) " " 55.
" (Nycticorax) " " 55.
Limosa V Sc. 19.
Limosa adspersa " " 23.
" aegocephala " " 19.
" americana " " 23.
" australis " " 22.
" brevipes " " 21.
" fedoa " " 23.
" glottis " " 23.
" gregaria " " 23.
" grisea " " 26.
" hardwickii " " 51.
" hudsonica " " 22.
" indiana " " 77.
" islandica " " 19.
" iapponica " " 23.
" leucophaea " " 23.
" meijeri " " 23.
" melanura " " 19, 21.
" melanuroides " " 21.
" novae zeelandiae " " 25.
" recurvirostra " " 77.
" rufa " " 23, 25.
" (Scolopax) " " 19.
" semipalmata " " 26.
" terek " " 77.
" uropygialis " " 25.
lindsayi (Dacelo) III Al. 23; III Al. R. 15.
" (Halcyon) III Al. 23.

linearis (Columbi-gallina) IV Col. 164.
" (Geotrygon) " " 164.
" (Starnoenas) " " 164.
lineata (Alecthelia) V Ra. 27.
" (Ardea) V Ar. 52, 53.
" (Megalaima) I Bucc. 31.
" (Strix) II Str. 17.
lineatus (Bucco) I Bucc. 36.
" (Buteo) II But. 20; II Acc. 108.
" (Capito) I Bucc. 31, 32.
" (Cuculus) I Cuc. 6, 8.
" (Falco) II But. 20.
" (Haliaëtus) II Mil. 2.
" (Numenius) V Sc. 86.
" (Podilymbus) VI U. 47.
" (Rallus) V Ra. 22.
" (Sylbeocyclus) VI U. 47.
linnaei (Eclectus) III P. 38; III P. R. 11.
" (Psittacus) III P. 38.
Lissotis melanogaster IV Cur. 9.
listado (Ynambui) VIII Ti. 29.
lithofalco (Falco) II Fal. 19.
littoralis (Carpophaga) IV Col. 103.
" (Charadrius) IV Cur. 31.
" (Columba) IV Col. 98.
" (Corvus) I Cor. 12.
" (Tadorna) VI A. 67.
litturata (Strix) II Str. 10.
liventer (Buteo) II But. 21; II Acc. 111.
" (Falco) II But. 21.
" (Poliornis) " " 21.
livia (Columba) IV Col. 63.
lobata (Anas) VI A. 7.
" (Biziura) VI A. 7.
" (Tringa) IV Cur. 67; V Sc. 58.
lobatus (Hydrobates) VI A. 7.
" (Lobivanellus) IV Cur. 67.
" (Phalaropus) V Sc. 58, 60.
Lobipes hyperboreus " " 58.
" incanus " " 60.
Lobipluvia biloba IV Cur. 64.
Lobivanellus " " 64.
Lobivanellus bilobus " " 64.
" cinereus " " 69.
" goensis " " 68.
" indicus " " 68.
" inornatus " " 69.
" lateralis " " 68.
" lobatus " " 67.
" miles " " 66.
" pectoralis " " 65.
" personatus " " 66.
" pileatus " " 65.
" senegalus " " 68.
" tricolor " " 67.
loculator (Tantalus) V Cic. 17.
locutrix (Columba) IV Col. 70.
lomatina (Tringa) V Sc. 29.
lomvia (Alca) VI U. 15.
" (Uria) " " 15.
longicauda (Astur) II Acc. 132.
" (Bartramia) V Sc. 79.
" (Henicopernis) II Acc. 132.
longicauda (Pernis) II Acc. 132.
" (Tringa) V Sc. 78.
longicaudata (Aptenodytes) VI U. 4.
longicaudatus (Phoenicophaës) I Cuc. 54.
longicaudus (Carbo) VI Pe. 15.
" (Palaeornis) III P. 84; III P. R. 36.
" (Psittacus) III P. 84.
longimembris (Strix) II Str. 6.
longipennis (Chelochelidon) VI Ster. 24.
" (Ephialtes) II Oti. 19.
" (Sterna) VI Ster. 23.
longipes (Buteo) II But. 9.
" (Charadrius) IV Cur. 34, 50.
" (Oedicnemus) " " 18.
" (Pluvialis) " " 50.
longirostris (Aptenodytes) VI U. 3.
" (Chalcophaps) IV Col. 145.
" (Eudocimus) V I. 5.
" (Gallinago) V Sc. 9.
" (Grus) V Ra. 2.
" (Grus cinerea) V Ra. 2.
" (Haematopus) IV Cur. 70, 73.
" (Ibis) V I. 5.
" (Numenius) V Sc. 85.
" (Podiceps) VI U. 34.
" (Rallus) V Ra 11.
" (Scolopax) V Sc. 10.
" (Strix) II Oti. 2.
Lontock I Cuc. 49.
Lophaëtos II Ass. 1.
Lophaithya cristata VI U. 34.
Lophochroa goffini III P. 144; III P. R. 67.
" leari III P. 144.
" sanguinea " " 144.
Lophocitta ardesiaca I Cor. 66.
" galericulata " " 66.
" histrionica " " 66.
Lophodytes cucullatus VI A. 5.
Lopholaimus antarcticus IV Col. 74.
Lophophaps ferruginea " " 155.
" plumifera " " 155.
Lophorina superba I Cor. 96.
Lophospiza II Ass. 22.
lophotes (Baza) II Per. 4; II Acc. 133.
" (Columba) IV Col. 156.
" (Falco) II Per. 4.
" indicus " " 4.
" (Mergus) VI A. 6.
" (Phaps) IV Col. 156.
" reinwardtii II Per. 5.
" (Scops) II Noc. 11.
Lophotibis cristata V I. 6.
Lophotis ruficrista IV Cur. 5.
lophyra (Anas) VI A. 39.
Lophyrus victoriae IV Col. 169.
Lori de Gueby III P. 124.
" écaillé " " 124.
loricata (Columba) IV Col. 69.
" (Lepidoenas) " " 69.
Loriculus IIIP.130; IIIP.R.59.
Loriculus amabilis " " 131; " " 61.
" aurantiifrons " " 62.

Loriculus catamene III P. R. 62.
" exilis " " 60.
" galgulus IIIP.131; IIIP.R.62.
" indicus " " 132; " " 60.
" philippensis " " 130; " " 59.
" pusillus " " 132; " " 60.
" sclateri " " 132; " " 61.
" sinensis " " 60.
" stigmatus IIIP.131; " " 60.
Lorius " " 108,118; " " 54.
Lorius ater " " 129; " " 59.
" borneus " " 128.
" coccineus " " 128; IIIP.R.58.
" cyanauchenIIIP.118,119; " " 54.
" cyanogenia " " 128; IIIP.R.56,58.
" domicella " " 120; " " 55.
" fuscatus " " 122; " " 55.
" garrulus " " 120; " " 55.
" guebiensis " " 123.
" papuensis " " 130; IIIP.R.53.
" phigy " " 116.
" pulchellus " " 130.
" reticulatus " " 128; IIIP.R.58.
" riciniatus " " 125; " " 56,57.
" ruber " " 123; " " 56.
" rubiginosus " " 129; " " 58.
" scintillans " " 122.
" scintillatus " " 122; IIIP.R.56.
" semilarvatus " " 124; " " 57.
" solitarius " " 59.
" speciosus IIIP.119.
" squamatus " " 124; III P. R. 56.
" superbus " " 119.
" tricolor " " 118; IIIP.R.54.
Lory de Gueby (Petit) III P. 125.
" (Psittacus) III P. 118; III P. R. 54.
lowei (Megapodius) VIII Ti. 71.
Loxia colius I Cuc. 79.
" (Psittacula) III P. 72.
loxias (Psittacula) III P. R. 31.
luciani (Conurus) III P. 25; III P. R. 6.
" (Palaeornis) " " 84; " " 36.
lucidus (Chrysococcyx) I Cuc. 34.
" (Chrysococcyx) " " 32.
" (Cuculus) " " 33, 35.
" (Graculus) VI Pe. 12.
" (Haliaeus) " " 12.
" (Phalacrocorax) " " 12.
" (Phoenicophaeus) I Cuc. 52.
lucioniensis (Eclectus) IIIP.48; IIIP.R.26.
" (Psittacus) " " 48.
" (Tanygnathus) III P. 48.
luctuosa (Carpophaga) IV Col. 102.
luctuosus (Haematopus) IV Cur. 74.
ludovicianus (Colymbus) VI U. 47.
" (Psittacus) III P. 17, 18.
ludwigii (Eupodotis) IV Cur. 7.
" (Otis) " " 7.
lugens (Columba) IV Col. 119.
" (Turtur) " " 119.
lugubris (Alcedo) III Al. 2; III Al. R. 1.
" (Carbo) VI Pe. 12.
" (Charadrius) IV Cur. 63.
lugubris (Corvus) I Cor. 12.
" (Cuculus) I Cuc. 28.
" (Fulica) V Ra. 62.
" (Gallinula) " " 40.
" (Procellaria pelagica) VI Proc. 7.
" (Strix) II Str. 25.
lulu (Strix) II Noc. 16.
lumme (Colymbus) VI U. 32.
lunata (Sterna) VI Ster. 27.
lunatus (Buceros rhinoceros) I Buc. 6.
Lunda VI U. 26, 28.
Lunda arctica VI U. 28.
" cirrhata " " 27.
" corniculata " " 28.
" psittacula " " 24.
lunulata (Psittacula) IIIP. 72; IIIP.R.31.
lunulatus (Falco) II Fal. 22; II Acc. 39.
" (Psittacus) III P. 72.
Lupha cristata V Ra. 59.
lussoniensis (Otis) IV Cur. 8.
luteocapillus (Psittacus) III P. 17.
luteocristata (Cacatua) III P. 137.
luteovirens (Columba) IV Col. 41.
" (Ptilopus) " " 41.
luteus (Bucco) I Bucc. 24.
" (Conurus) III P. 16; III P. R. 4.
" (Psittacus) " " 16, 17, 55.
luxuosus (Cyanocorax) I Cor. 54.
" (Garrulus) " " 54.
luzonica (Anas) VI A. 42.
" (Columba) IV Col. 157.
" (Phlegoenas) " " 157.
luzoniensis (Janthoenas) IV Col. 74, 75.
" (Numenius) V Sc. 93.
" (Parra) V Ra. 71.
" (Platalea) V Cic. 22.
" (Trogon) I Bucc. 7.
Lycocorax I Cor. 130.
Lycocorax morotensis " " 132.
" obiensis " " 132.
" pyrrhopterus " " 131.
Lycornis cornuta V Ra. 59.
Lycos monedula I Cor. 33.
Lymnicorax erythropus V Ra. 35.
" mossambicus " " 35.
" niger " " 34.
Lymnocryptes stagnatilis V Sc. 14.
Lypornix erythropyga I Bucc. 67.
" leucops " " 89.
" rubecula " " 87.
" ruficapilla " " 87.
" striata " " 85.
" tenebrosa " " 91.
" torquata " " 85.
" tranquilla " " 88.
" unicolor " " 89.
Lysea ardesiaca V Ra. 63.

M.

macao (Ara) III P. 3.
" (Arara) III P. 3; III P. R. 2.
" (Macrocercus) III P. 3, 4.

macao (Psittacus) III P. 3.
macawuanna (Psittacus) III P. 7.
maccabrum (Syrnium) II Str. 16.
maccao (Biziura) VI A. 10.
" (Erismatura) " " 10.
" (Oxyura) " " 10.
maccelli (Scops) II Oti. 27.
macei (Falco) II Aq. 16.
" (Ibis) V I. 14.
mac-gillivrayi (Megapodius) VIII Ti. 65.
Macheirhamphus II Per. 7; II Acc. 136.
" alcinus " " 7; " " 136.
Machetes pugnax V Sc. 51.
macklotii (Pitta) III Pit. 7; III Pit. R. 10.
mac leayii (Dacelo) III Al. 40; IIIAl.R.30.
" (Halcyon) " " 40.
" (Ptilonorhynchus) I Cor. 117.
Macoicogoé VIII Ti. 8, 10.
macqueenii (Hubara) IV Cur. 3.
" (Otis) " " 3.
macrocelides (Astur) II Ass. 47.
" (Falco) " " 47.
macrocephala (Strix) II Str. 10.
Macrocercus glaucus III P. 2.
" hyacinthinus " " 2.
" illigeri " " 7.
" macao " " 3, 4.
" maracana " " 6.
" pachyrhynchus " " 11.
" (Vanellus) IV Cur. 58.
macrodactyla (Gallinago) V Sc. 10.
macrodactylus (Bucco) I Bucc. 81.
" (Cyphos) " " 81.
macrognathus (Arara) III P. 8.
" (Ptilinopus) IV Col. 60.
macrolophus (Cyanura) I Cor. 63.
" (Plyctolophus) III P. 135.
macroptera (Atricilla) VI L. 44.
" (Procellaria) VI Proc. 8.
" (Pterodroma) " " 8.
" (Totanus) V Sc. 71.
macropterus (Circus) II Cir. 8; II Acc. 49.
" (Corvus) I Cor. 27.
" (Vanellus) IV Cur. 67.
Macropus phasianellus I Cuc. 41.
Macropygia IV Col. 104.
Macropygia albicapilla " " 111.
" amboinensis " " 113.
" doreya " " 115.
" emiliana " " 109.
" leptogrammica " " 107.
" magna " " 108.
" manadensis " " 106.
" modesta " " 107.
" phasianella " " 108.
" reinwardtii " " 104.
" " minor " " 106.
" ruficeps " " 110.
" schomburgkii V Ra. 37.
" sclateri " " 37.
" tenuirostris IV Col. 109.
" turtur " " 110.
" verreauxii V Ra. 37.
Macropygia walik-mchra IV Col. 108.
Macrorhamphus griseus V Sc. 26.
" griseus semipalmatus V Sc. 26.
" scolopaceus V Sc. 26.
" semipalmatus " " 26.
macrorhina (Dacelo) IIIAl. 22; IIIAl. R. 13.
" (Melidora) III Al. 22.
macrorhinus (Dacelo) " " 22.
macrorhyncha (Ardea) V Ar. 44.
" (Ardetta) " " 44.
" (Musophaga) I Cuc. 76.
" (Strix) II Oti. 10.
macrorhynchos (Bucco) I Bucc. 76.
" (Cyphos) " " 76.
macrorhynchus (Bucco) " " 76.
" (Butorides) V Ar. 44.
" (Calyptorhynchus) III P. 154; III P. R. 70.
" (Corvus) I Cor. 16, 19.
" (Corythaix) I Cuc. 76.
" (Graculus) VI Pe. 8.
" (Phalacrocorax) VI Pe. 8.
" (Psittacus) III P. 46.
macroscelis (Circus) II Acc. 50.
macrotarsa (Sterna) VI Ster. 34.
Macrotarsus nigricollis V Sc. 107.
macroura (Sterna) VI Ster. 15.
" (Strix) II Str. 10.
macrourus (Astur) II Ass. 25; II Acc. 67.
" (Buceros) I Buc. 9.
" (Centropus) I Cuc. 63.
" (Cuculus) " " 41.
" (Geotacco) " " 41.
" viridis (Psittacus) III P. 86.
macrura (Piaya) I Cuc. 58
" (Tanagra) " " 80.
macrurus (Colius) " " 80.
" (Cuculus) " " 44.
" (Lanius) " " 80.
macularia (Tringa) V Sc. 83.
macularius (Actitis) " " 83.
" (Totanus) " " 83.
" (Tringoides) " " 83.
maculata (Alcedo) I Bucc. 84.
" (Athene) II Str. 39.
" (Calodera) I Cor. 119, 120.
" (Chlamydera) " " 119, 120.
" (Columba) IV Col. 141.
" (Gallinula) V Ra. 45.
" (Noctua) II Str. 39; II Noc. 26.
" (Pelidna) V Sc. 39.
" (Peristera) IV Col. 141.
" (Pitta) III Pit. 12.
" (Spatula) VI A. 35.
" (Tamatia) I Bucc. 79.
" (Tringa) V Sc. 39.
" (Zenaida) IV Col. 141.
maculatus (Bucco) I Bucc. 84.
" (Falco) II Aq. 6.
" (Indicator) I Cuc. 2.
" (Ptilorhynchus) I Cor. 119.
" (Rallus) V Ra. 13.
" (Totanus) V Sc. 64.

maculicollis (Indicator) I Cuc. 2.
" (Rhynchotus) VIII Ti. 38.
maculicoronatus (Capito) I Bucc. 57.
maculipennis (Chroicocephalus) VI L. 36.
" (Larus) VI L. 36.
maculirostris (Anas) VI A. 57.
" (Querquedula) VI A. 57.
maculosa (Nothura) VIII Ti. 42, 45.
" (Strix) II Oti. 2, 14.
maculosus (Bubo) II Oti. 14; II Noc. 5.
" (Crypturus) VIII Ti. 42.
" (Oedicnemus) IV Cur. 21.
" (Tinamus) VIII Ti. 42.
madagascariensis (Accipiter) II Acc. 72.
" (Anas) VI A. 75.
" (Baza) II Acc. 136.
" (Biensis) V Ra. 10.
" (Centropus) I Cuc. 65.
" (Columba) IV Col. 42,48.
" (Coracias) I Cor. 143.
" (Corvus) " " 3.
" (Crombus) I Cuc. 36.
" (Dacelo) III Al. R. 32.
" (Eurystomus) I Cor. 143.
" (Funingus) IV Col. 42.
" (Ispidina) III Al. R. 32.
" (Ninox) II Noc. 23.
" (Numenius) V Sc. 91.
" (Palumbus viridis) IV Col. 48.
" (Porphyrio) V Ra. 54.
" (Psittacula) III P. 72.
" (Ptilinopus) IV Col. 42.
" (Ptilopus) " " 42.
" (Rallus) V Ra. 10.
" (Scops) II Noc. 12.
maderaspatana (Gallinago) V Sc. 16.
" (Scolopax) " " 16.
maderaspatanus (Oriolus) I Cor. 106.
magellanica (Anas) VI A. 98, 99.
" (Chloëphaga) VI A. 99.
" (Gallinago) V Sc. 11.
" (Scolopax) " " 11.
" (Strix) II Oti. 10.
magellanicus (Anser) VI U. 10; VI A. 99.
" (Aptenodytes) VI U. 10.
" (Graculus) VI Pe. 21.
" (Leucarbo) " " 21.
" (Pelecanus) " " 21.
magicus (Otus) II Oti. 22.
" (Scops) " " 22; II Noc. 11.
magna (Cryptura) VIII Ti. 13.
" (Macropygia) IV Col. 108.
" (Tringa) V Sc. 28.
" (Upupa) I Cor. 94.
magnifica (Carpophaga) IV Col. 38.
" (Columba) " " 38.
" (Craspedophora) I Cor. 96.
" (Diphyllodes) " " 86.
" (Megaloprepia) IV Col. 38.
" (Paradisea) I Cor. 86.
magnificus (Epimachus) " " 96.
" (Falcinellus) " " 96.
magnificus (Gyps) II Vul. 7.
" (Ptilinopus) IV Col. 38.
" (Ptilopus) " " 38.
magnirostris (Asturina) IIAse.3; IIAcc.100.
" (Baza) IIPer.5; IIAcc.133,135.
" (Falco) II Ase. 3.
" (Oedicnemus) IV Cur. 22.
" (Phaetusa) VI Ster. 12.
" (Poeocephalus) III P. 34.
" (Rupornis) II Ase. 3.
" (Sterna) VI Ster. 12.
" (Treron) IV Col. 58.
" (Urocissa) I Cor. 70.
magnus (Epimachus) " " 94.
" (Psittacus) III P. 40.
" (Schoeniclus) V Sc. 28.
Magoua VIII Ti. 13.
maguari (Ardea) V Cic. 8.
" (Ciconia) " " 8, 11.
maillardii (Circus) II Acc. 51.
maïtaca (Psittacus) III P. 30.
Majaqueus aequinoctialis VI Proc. 19.
" conspicillatus " " 20.
major (Alca) VI U. 13.
" (Cirrhocephalus) VI L. 36.
" (Colymbus) VI U. 38.
" (Corvus) I Cor. 11.
" (Crotophaga) I Cuc. 47.
" (Cygnus) VI A. 81.
" (Eurypyga) V Ra. 74.
" (Gallinago) V Sc. 7.
" (Halcyon coromanda) III Al. 25.
" (Himantopus) V Sc. 105.
" (Indicator) I Cuc. 1, 2.
" (Larus) VI L. 29.
" (Larus canus) " " 26.
" (Larus scopulinus) " " 29.
" ruficeps (Tinamus) VIII Ti. 15.
" (Nothura) " " 42.
" (Numenius) V Sc. 86, 89, 91.
" (Otus capensis) II Noc. 3.
" (Pagodroma nivea) VI Proc. 15.
" (Paradisea) I Cor. 79.
" (Perdix) VIII Ti. 13.
" (Pica mexicana) I Cor. 25.
" (Platalea) V Cic. 21.
" (Podiceps) VI U. 38.
" (Pogonias) I Bucc. 1.
" (Procellaria) VI Proc. 27.
" (Puffinus) " " 27.
" (Scolopax) V Sc. 7, 10.
" subcristatus (Tinamus) VIII Ti. 15.
" (Tetrao) " " 13.
" (Tinamus) VIII Ti. 1, 13, 42.
malabarica (Megalaima) I Bucc. 27.
" (Osmotreron) IV Col. 52.
" (Treron) " " 52.
" (Vinago) " " 52.
malabaricus (Bucco) I Bucc. 27.
" (Buceros) I Buc. 6.
malaccensis (Ardea) V Ar. 33.
" (Bucco) I Bucc. 21.
" (Columba) IV Col. 131.

malaccensis (Palaeornis) III P. 84.
" (Pelargopsis) III Al. R. 7.
" (Pitta) III Pit. 4, 12; III Pit. R. 15.
" (Psittacus) III P. 73, 84.
" (Turdus) III Pit. 12.
malachitaceus (Psittacus) III P. 66.
Malacoptila I Bucc. 85.
Malacoptila fusca " " 85.
" inornata " " 85.
" nigrifusca " " 85.
" rubecula " " 87.
" ruficapilla " " 87.
" torquata " " 85.
malacorhyncha (Anas) VI A. 36.
Malacorhynchus membranaceus " " 36.
malayana (Eudynamis) I Cuc. 18.
malayanus (Buceros) I Buc. 7.
" (Cuculus) I Cuc. 33.
alayensis (Aquila) II Aq. 11; II Acc. 116.
" (Falco) " " 11.
Maleo VIII Ti. 53, 77.
maléo (Megacephalon) VIII Ti. 54, 77.
malimbica (Alcedo) III Al. 30.
" (Dacelo) III Al. R. 20.
" (Halcyon) " " 20.
malimbicus (Merops) III Me. 7.
manadensis (Columba) IV Col. 106.
" (Macropygia) " " 106.
" (Turcoena) " " 106.
Manchot à collier VI U. 10.
, du Cap de B. Esp. " " 10.
mandtii (Uria) " " 18.
Mangleduif IV Col. 79.
mangle (Gallinula) V Ra. 15.
manilata (Ara) III P. 7.
" (Arara) " " 7; III P. R. 2.
manilatus (Psittacus) " " 7.
manillensis (Anas) VI A. 77.
" (Ardea) V Ar. 60.
" (Nycticorax) V Ar. 60.
mansuetus (Cygnus) VI A. 78.
mantelli (Notornis) V Ra. 52.
mantellii (Apteryx) IV St. 7.
mantis (Otus) II Oti. 25.
" (Scops) II Noc. 10.
Manucodia chalybaea I Cor. 122.
" gouldii " " 120.
Marabu V Cic. 12.
marabu (Ciconia) V Cic. 13.
maracana (Arara) III P. 6; III P. R. 2.
" (Macrocercus) III P. 6.
Mareca americana VI A. 45.
" castanea " " 47.
" chiloënsis " " 46.
" penelope " " 44.
" punctata " " 47.
margarethae (Tanysiptera) III Al. 43; III Al. R. 37.
margaritaceus (Micropogon) I Bucc. 67.
margaritatus (Capito) " " 67.
" (Micropogon) " " 67.
marginata (Saurothera) I Cuc. 41.
marginatus (Bucco) I Bucc. 67.
" (Charadrius) IV Cur. 35, 42.
" (Psittacus) III P. 48.
marginella (Zenaidura) IV Col. 142.
mariae (Ptilinopus) " " 10.
Marila affinis VI A. 28.
" (Anas) " " 26.
" frenata " " 26.
" (Fuligula) " " 26.
" (Fulix) " " 26.
mariloides (Fuligula) VI A. 28.
marina (Procellaria) VI Proc. 5.
marini (Lari) VI L. 4.
marinus (Dominicanus) VI L. 10.
" (Larus) " " 10.
" (Psittacus) VI U. 28.
maritima (Arquatella) V Sc. 30.
" (Tadorna) VI A. 67.
" (Tringa) V Sc. 30.
Marmaronetta angustirostris VI A. 63.
marmorata (Anas) VI A. 63.
" (Dafila) " " 63.
" (Limicola) V Sc. 23.
" (Nothura) VIII Ti. 44.
" (Scolopax) V Sc. 23.
marmoratus (Charadrius) IV Cur. 53.
martii (Crypticus) III Mo. 4.
" (Momotus) " " 4.
" (Prionites) " " 4.
Martinete VIII Ti. 49.
martinica (Fulica) V Ra. 38.
" (Gallinula) " " 38.
" (Geotrygon) IV Col. 165.
" (Jonornis) V Ra. 38.
" (Porphyrio) " " 38.
" (Porphyrula) " " 38, 39.
martinicensis (Fulica) " " 38.
Martin-pêcheur à tête verte III Al. 32.
" " à collier blanc " " 32.
" " de l'île de Luçon " " 31.
" " des Philippines " " 32.
Martins-chasseurs " " 18.
" -pêcheurs " " 1.
maruetta (Porzana) V Ra. 29.
" (Rallus) " " 29.
massena (Trichoglossus) III P. 110; III P. R. 43.
mathildae (Pitta) III Pit. 10.
matoni (Trichoglossus) III P. 111.
maugei (Columba) IV Col. 132.
" (Conurus) III P. 13; III P. R. 4.
" (Geopelia) IV Col. 132.
" (Psittacara) III P. 13.
mauri (Heteropoda) V Sc. 55.
mauritanica (Pica) I Cor. 39, 41.
maurus (Circus) II Cir. 7; II Acc. 49.
" (Falco) " " 7.
maxima (Alcedo) III Al. 3; III Al. R. 1.
" (Anas) VI A. 73.
" (Ceryle) III Al. 3.
" (Pitta) III Pit. 2; III Pit. R. 4.
maxillaris (Oriolus) I Cor. 115.
" (Sphecotheres) I Cor. 115.

maxillaris (Turdus) I Cor. 115.
maximiliana (Amazona) III P. 61; III P. R. 29.
maximiliani (Anadorhynchus) III P. 2.
" (Psittacus) " " 61.
maximus (Aramides) V Ra. 14.
" (Bubo) II Oti. 7; II Noc. 4.
" (Rallus) V Ra. 14.
maxuriensis (Sterna) VI Ster. 6.
maynanensis (Bucco) I Bucc. 63.
" (Capito) " " 63.
mcclellandi (Megalaima) " " 36.
media (Erythra cinerea) V Ra. 32.
" (Nothura) VIII Ti. 45.
" (Scolopax) V Sc. 4, 7.
" (Sterna) VI Ster. 6.
medius (Anser) VI A. 110.
" (Centropus) I Cuc. 70.
" groenlandicus (Colymbus) VI U. 28.
" (Numenius) V Sc. 86.
" (Phalacrocorax) VI Pe. 8.
" (Phalacrocorax carbo) " " 8.
" (Tinamus) VIII Ti. 45.
meena (Columba) IV Col. 118.
mefoorana (Pitta novae guineae) III Pit. R. 8.
Megacephalon VIII Ti. 77.
Megacephalon maleo " " 54, 77.
Megaceryle caesia III Al. 4.
" domingensis " " 3.
" stellata " " 4.
megala (Gallinago) V Sc. 12.
Megalaema bilineata I Bucc. 43.
" leucotis " " 48.
" pusilla " " 40.
Megalaima " " 12.
Megalaima armillaris " " 22.
" asiatica " " 16.
" atroflava " " 42.
" australis " " 29.
" bilineata " " 43.
" bonapartei " " 51.
" calauchenia " " 94.
" calva " " 49.
" caniceps " " 34, 36.
" capistratus " " 61.
" chrysocoma " " 41.
" chrysopogon " " 14.
" chrysopsis " " 15.
" corvina " " 30.
" duchaillui " " 39.
" duvaucelli " " 28.
" flavifrons " " 23.
" flavigula " " 24.
" franklinii " " 20.
" henrici " " 21.
" hodgsoni " " 34.
" javensis " " 19.
" leucolaima " " 46.
" leucotis " " 48.
" lineata " " 31.
" malabarica " " 27.
" mcclellandi " " 36.
Megalaima mystacophanos I Bucc. 18.
" oorti " " 21.
" phaiostictica " " 36.
" phaiosticticus " " 36.
" pusilla " " 40.
" pyrolopha " " 37.
" rosea " " 27.
" rubricapilla " " 26, 74.
" scolopacea " " 47.
" subsulphurea " " 44.
" uropygialis " " 42.
" versicolor " " 15.
" virens " " 13.
" viridis " " 32.
" zeylanica " " 34.
Megaloprepia assimilis IV Col. 38.
" magnifica " " 38.
" perlata " " 17.
" puella " " 39.
megaloptera (Atricilla) VI L. 44.
" (Pica) I Cor. 39.
megalopterus (Aquila) II Pol. 4.
" (Polyborus) II Pol. 4; II Acc. 37.
megalorhynchus (Eclectus) III P. 46; III P. R. 23.
" (Psittacus) III P. 46.
" spinosus I Bucc. 73.
" (Tanygnathus) III P. 46.
megapodia (Glareola) IV Cur. 15.
Megapodius VIII Ti. 52, 56.
Megapodius assimilis " " 58.
" barnabyi " " 64.
" bernsteini " " 63.
" brenchleyi " " 65.
" cumingii " " 71.
" duperreyi " " 54, 57.
" eremita " " 65.
" forstenii " " 70.
" freycinetii " " 66.
" geelvinkianus " " 63.
" gilbertii " " 73.
" gouldii " " 57.
" haskeri " " 65.
" la perousii " " 57.
" la peyrousii " " 65.
" layardi " " 65.
" lowei " " 71.
" mac-gillivrayi " " 65.
" nicobariensis " " 74.
" pritchardi " " 64.
" pusillus " " 72.
" quoyi " " 66.
" reinwardtii " " 57.
" rubrifons " " 65.
" rubripes " " 57.
" sanghirensis " " 73.
" senex " " 65.
" stairi " " 64.
" tumulus " " 57.
" wallacei " " 54, 75.
megarhyncha (Pitta) III Pit. 9; III Pit. R. 16.
megarhynchus (Cuculus) I Cuc. 32.
megaspilus (Circus) II Cir. 6.

mehleri (Piaya) I Cuc. 57.
„ (Pyrrhococcyx) „ „ 58.
Melagavia personata VI L. 35.
melampyga (Crex) V Ra. 14.
melanauchen (Sterna) VI Ster. 28.
„ (Sternula) „ „ 28.
Melanetta deglandii VI A. 17.
„ fusca „ „ 16.
melania (Thalassidroma) VI Proc. 3.
Melanibyx IV Cur. 75.
melanocephala (Amazona) III P. 64; III P. R. 29.
„ (Anas) VI A. 32, 79.
„ (Ardea) V Ar. 6.
„ (Columba) IV Col. 28.
„ (Coracias) I Cor. 69.
„ (Cyanopica) „ „ 42.
„ (Fuligula) VI A. 32.
„ (Gavia) VI L. 43.
„ (Ibis) V I. 14.
„ (Jotreron) IV Col. 28.
„ (Pitta) III Pit. 4; III Pit. R. 9.
„ (Xema) VI L. 43.
melanocephalos (Pica) I Cor. 42.
melanocephalum (Galgulum) „ „ 54.
melanocephalus (Charadrius) IV Cur. 14.
„ (Cygnus) VI A. 79.
„ (Garrulus) I Cor. 59.
„ (Garrulus glandarius) I Cor. 58.
„ (Larus) VI L. 43.
„ (Nandays) III P. 10.
„ (Oriolus) I Cor. 106.
„ (Pionus) III P. 63, 64.
„ (Pogonias) I Bucc. 10.
„ (Pogonorhynchus) I Bucc. 10.
„ (Psittacus) III P. 10.
„ (Ptilinopus) IV Col. 28.
„ (Ptilopus) „ „ 28.
„ (Strepsilas) IV Cur. 43.
„ (Tantalus) V I. 14.
melanochloris (Parra) V Ra. 67.
melanocorypha (Anas) VI A. 79.
melanocoryphus (Coccygus) I Cuc. 38.
melanocyaneus (Cyanocorax) I Cor. 45.
melanogaster (Carbo) VI Pe. 12.
„ (Cuculus) I Cuc. 59.
„ (Lissotis) IV Cur. 9.
„ (Otis) „ „ 9.
„ (Phalacrocorax) VI Pe. 12.
„ (Phoenicophaeus) I Cuc. 48.
„ (Piaya) „ „ 59.
„ (Plotus) VI Pe. 26.
„ (Vanellus) IV Cur. 54.
melanogastra (Fregatta) VI Proc. 6.
„ (Hydrochelidon) VI Ster. 21.
„ (Procellaria) VI Proc. 6.
„ (Sterna) VI Ster. 21.
„ (Thalassidroma) VI Proc. 6.
melanogenia (Psittacula) III P. R. 35.
melanogenys (Anous) VI Ster. 37.
melanogenys (Falco) II Fal. 3; II Acc. 32.
melanognathus (Haliaeus) VI Pe. 13.
„ (Phoenicophaeus) I Cuc. 49.
melanoleuca (Anas) VI A. 92.
„ (Anseranas) „ „ 92.
„ (Asturina) II Ase. 5; II Acc. 102.
„ (Columba) IV Col. 163.
„ (Gambetta) IV Sc. 63.
„ (Pica) I Cor. 39.
„ (Scolopax) IV Sc. 63.
melanoleucos (Astur) II Ass. 37.
„ (Bucco) I Bucc. 78.
„ (Circus) IICir.7; IIAcc.49,51.
„ (Falco) „ „ 7.
„ (Sparvius) II Ass. 52.
melanoleucus (Astur) II Ass. 15; II Acc.74.
„ (Buceros) I Buc. 12.
„ (Buteo) II Ass. 14.
„ (Capito) I Bucc. 78.
„ (Cuculus) I Cuc. 45.
„ (Graculus) VI Pe. 15.
„ (Haliaeus) „ „ 15.
„ (Mergulus) VI U. 20.
„ (Nisus) IIAss.15,37; IIAcc.74.
„ (Spizaetus) II Ass. 14; II Acc. 60.
„ (Spizaëtus) II Ase. 5.
„ (Totanus) V Sc. 63.
melanonota (Asturina) II Ase. 10; II Acc. 103.
„ (Psittacula) III P. 70; III P. R. 31.
„ (Strix) II Noc. 20.
melanonotus (Buteo) II Ase. 10.
„ (Psittacus) III P. 70.
Melanopelargos leucocephalus V Cic. 9.
„ niger „ „ 4.
melanophaia (Porzana) V Ra. 35.
melanophaios (Rallus) „ „ 35.
melanophrys (Diomedea) VI Proc. 33.
melanopis (Ibis) V I. 7.
„ (Otus) II Oti. 6.
„ (Tantalus) V I. 7.
„ (Theristicus) „ „ 7.
melanops (Anous) VI Ster. 37.
„ (Asturina) II Ase. 10; II Acc.104.
„ (Buteo) „ „ 10.
„ (Centropus) I Cuc. 65, 66.
„ (Charadrius) IV Cur. 31.
„ (Dacelo) III Al. 21; III Al. R. 13.
„ (Falco) II Ase. 10.
„ (Paralcyon) III Al. 21.
„ (Rallus) V Ra. 28, 50.
melanoptera (Alcedo) III Al. 27, 28.
„ (Bernicla) VI A. 100.
„ (Chloëphaga) „ „ 100.
„ (Columba) IV Col. 153.
„ (Dacelo) III Al. 27; III Al. R. 18.
„ (Glareola) IV Cur. 15.
„ (Melopelia) IV Col. 153.
„ (Metriopelia) „ „ 153.

melanoptera (Sterna) VI Ster. 25.
" (Strepera) I Cor. 123.
melanopteroides (Charadrius) IV Cur. 63.
melanopterus (Anser) VI A. 100.
" (Charadrius) IV Cur. 63.
" (Elanus) II Mil. 6; II Acc. 130.
" (Falco) " " 6, 8.
" (Halcyon) III Al. 27.
" (Himantopus) V Sc. 105.
" (Pogonias) I Bucc. 6.
" (Pogonorhynchus) " " 6.
" (Porphyrio) V Ra. 55.
" (Psittacus) III P. 69.
melanopus (Ardea) V Ar. 19.
" (Egretta) " " 19.
" (Numenius) V Sc. 85.
melanorhinus (Cygnus) VI A. 82.
melanorhyncha (Alcedo) III Al. 15; III Al. R. 8.
" (Ardea) V Ar. 16.
" (Coracopsis) III P. 37.
" (Egretta) V Ar. 16.
" (Eudynamis) I Cuc. 20.
" (Halcyon) III Al. 15.
" (Sterna) VI Ster. 24.
" (Thalassea) " " 24.
melanorhynchos (Platalea) V Cic. 23.
melanorhynchus (Centropus) I Cuc. 65.
" (Coracias) I Cor. 56.
" (Corcorax) " " 56.
" (Corydonyx) I Cuc. 65.
" (Cuculus) " " 20.
" (Cygnus) VI A. 81.
" (Larus) VI L. 41.
" (Palaeornis) III P. 83, 85.
" (Pyrrhocorax) I Cor. 56.
melanosternon (Buteo) II But. 19; II Acc. 111.
" (Gypoictinia) II But. 19.
" (Milvus) " " 19.
melanota (Anas) VI A. 74.
" (Sarkidiornis) VI A 74.
melanotis (Amazona) III P. 67; III P. R. 30.
" (Caica) " " 67.
" (Capito) I Bucc. 61, 82.
" (Falco) II Aq. 16.
" (Milvus) II Mil. 2; II Acc. 126.
" (Mimeta) I Cor. 111, 113.
" (Oriolus) " " 111.
" (Pionus) III P. 67.
" (Ptilorhynchus) I Cor. 118.
" (Sterna) VI Ster. 13.
melanotus (Botaurus) V Ar. 48.
" (Buteo) II Acc. 103.
" (Circaëtus) " " 113.
" (Porphyrio) V Ra. 57.
" (Psittacus) III P. 92.
melanura (Anas) VI A. 44.
" (Carpophaga) IV Col. 98.
" (Ceyx) III Al. 49.
" (Daceło) " " 49; III Al. R. 33.
" (Limosa) V Sc. 19, 21.
" (Palaeornis) III P. 99.
" (Rhynchops) VI Ster. 39.
melanura (Sula) VI Pe. 39.
melanuroides (Limosa) V Sc. 21.
melanurus (Centropus) I Cuc. 63.
" (Larus) VI L. 8.
" (Merops) III Me. 4.
" (Platycercus) III P. 98; III P. R. 40.
" (Rallus) V Ra. 15.
melas (Himantopus) V Sc. 108.
melasomus (Charadrius) IV Cur. 61.
Melias diardi I Cuc. 54.
" tristis " " 54.
Melidora euphrosiae III Al. 22.
" macrorhina " " 22.
Melierax musicus II Ass. 20.
melinus (Sericulus) I Cor. 99.
" (Turdus) " " 99.
melissophanes (Cuculus) I Cuc. 44.
Mellitophagus erythropterus III Me. 10.
" gularis " " 12.
" variegatus " " 11.
meloda (Melopelia) IV Col. 152.
melodus (Charadrius) IV Cur. 29, 33.
Melopelia IV Col. 152.
Melopelia leucoptera " " 152.
" melanoptera " " 153.
" meloda " " 152.
Melopsittacus undulatus III P. 105.
membranacea (Anas) VI A. 36.
membranaceus (Malacorhynchus) VI A. 36.
menadensis (Scops) II Oti. 20; II Noc. 12.
menbeki (Nesocentor) I Cuc. 61.
menebeki (Centropus) " " 61.
meninting (Alcedo) III Al. 9; III Al. R. 5.
menstrua (Amazona) III P. 60; III P. R. 28.
menstruus (Psittacus) " " 60.
mentalis (Carbo) VI Pe. 18.
mercenaria (Amazona) III P. R. 28.
mercenarius (Psittacus) " " 28.
Merganetta VI A. 12.
Merganetta armata " " 12.
" chilensis " " 12.
" columbiana " " 12.
" leucogenys " " 12.
Merganser castor " " 2.
" (Mergus) " " 2.
Mergellus albellus " " 6.
Mergulus alle VI U. 20.
" cassini " " 26.
" cirrhocephalus " " 22.
" melanoleucus " " 20.
Mergus VI A. 2.
Mergus albellus " " 6.
" americanus " " 2.
" brasiliensis " " 6.
" castor " " 2.
" coeruleus " " 2.
" cristatus " " 2.
" cucullatus " " 5.
" glacialis " " 6.
" imperialis " " 2.
" lophotes " " 6.
" merganser " " 2.

Mergus minutus VI A. 6.
" octosetosus " " 6.
" orientalus " " 3.
" serrator " " 3.
" squamatus " " 2.
" stellatus " " 6.
meriani (Corythaix) I Cuc. 76.
" (Musophaga) " " 76.
meridionalis (Asturina) II But. 17.
" (Buteo) II But. 17; II Acc. 110.
" (Columba) IV Col. 154.
" (Falco) II But. 17.
" (Gypaëtus) II Vul. 11.
" (Gypaëtus barbatus) II Vul. 10; II Acc. 141.
" (Morphnus) II But. 17.
" (Nestor) III P. 156; III P. R. 70.
" (Noctua veterum) II Str. 29; II Noc. 26.
" (Psittacus) III P. 156.
" (Rupornis) II But. 17.
" (Scolopax) V Sc. 8.
" (Sterna) VI Ster. 15, 34.
" (Strix) II Str. 29.
Merle verd à tête noire des moluques III Pit. 3.
" verd des moluques III Pit. 11.
Meropogon forstenii III Me. 8.
Merops " " 1.
Merops aegyptius " " 2, 6.
" albicollis " " 5.
" amictus " " 13.
" apiaster " " 4.
" athertoni " " 12.
" badius " " 3.
" bicolor " " 7.
" bullockii " " 8.
" bullockoides " " 9.
" castaneus " " 3.
" coeruleocephalus " " 7.
" collaris " " 10.
" cuvieri " " 5.
" cyanipectus " " 10.
" cyanogaster " " 8.
" cyanorrhos " " 2.
" erythropterus " " 10, 11.
" forsteni " " 8.
" frenatus " " 8.
" gularis " " 12.
" hirundinaceus " " 11.
" hypoglaucus " " 3.
" javanicus " " 2.
" lafresnayi " " 11.
" lamarckii " " 6.
" lefeburii " " 11.
" leschenaltii " " 9.
" malimbicus " " 7.
" melanurus " " 4.
" minutus " " 10.
" natalensis " " 7.
" nubicoides " " 7.
" nubicus " " 7.
Merops ornatus III Me. 4.
" persica " " 2.
" philippinus " " 2.
" quinticolor " " 9.
" savignyi " " 2.
" smithii " " 9.
" urica " " 9.
" vaillantii " " 2.
" variegatus " " 10, 11.
" viridis " " 6.
" viridissimus " " 6.
merlini (Coccygus) I Cuc. 40.
" (Saurothera) " " 40.
mersa (Anas) VI A. 12.
" (Undina) " " 13.
Merula viridis atricapilla moluccensis III Pit. 3.
" viridis moluccensis III Pit. 11.
merulinus (Cacomantis) I Cuc. 21.
" (Cuculus) " " 21.
" (Psittacus) III P. 17.
meruloides (Mimeta) I Cor. 110.
meserythrus (Crypturus) VIII Ti. 25.
" (Crypturus pileatus) " " 25.
" (Tinamus) " " 25.
mesites (Cuculus) I Cuc. 8.
mesurus (Pyrrhococcyx) " " 57.
metallica (Columba) IV Col. 75.
" (Janthoenas) " " 74, 75.
metallicus (Cuculus) I Cuc. 33.
Metopiana peposaca VI A. 32.
metopias (Anas) " " 32.
" (Fuligula) " " 32.
Metopidius africanus V Ra. 69.
" albinucha " " 70.
" gallinaceus " " 68.
" indicus " " 67.
Metriopelia anais IV Col. 153.
" aymara " " 153.
" melanoptera " " 153.
mexicana (Anas) VI A. 33, 35.
" major (Pica) I Cor. 25.
" (Penelope) VI A. 87.
" (Piaya) I Cuc. 57.
" (Strix) II Oti. 2.
mexicanus (Accipiter) II Acc. 73.
" (Carbo) VI Pe. 23.
" (Corvus) I Cor. 25, 63.
" (Cuculus) I Cuc. 57.
" (Dromococcyx) " " 41.
" (Falcinellus) V I. 4.
" (Falco) II Fal. 18.
" (Geococcyx) I Cuc. 41.
" (Graculus) VI Pe. 23.
" guarouba (Psittacus) III P. 17.
" (Himantopus) V Sc. 107.
" (Ibis) V I. 5.
" (Larus zonorhynchus) VI L. 22.
" (Momotus) III Mo. 6.
" (Oedicnemus) IV Cur. 19.
" (Otus) II Oti. 2.
" (Phasianus) I Cuc. 41.
" (Psilorhinus) I Cor. 44.

meyeri (Limosa) V Sc. 23.
" (Psittacus) III P. 36; III P. R. 10.
" (Trichoglossus) " " 50.
michahellesii (Larus) VI L. 16.
Micrastur brachypterus II Ass. 52.
" guerilla II Acc. 98.
" xanthothorax II Ass. 50.
" zonothorax II Acc. 98.
Microcarbo stictocephalus VI Pe. 13.
microcera (Carpophaga) IV Col. 87.
microceros (Ciceronia) VI U. 23.
" (Phaleris) " " 23.
Microglossum IIIP.146; IIIP.R.67.
Microglossum alecto " " 151; " " 67.
" aterrimum III P. 147; III P. R. 67.
Micronisus badius II Ass. 48.
" guttatus II Acc. 93.
" zonarius II Ass. 47.
Micropalama himantopus V Sc. 54.
" tacsanowskia " " 26.
Micropogon amazonicus I Bucc. 57.
" aureus " " 55.
" bourcierii " " 58.
" cayanensis " " 53.
" cinctus " " 24.
" flavicollis " " 55.
" fuliginosus " " 73.
" hartlaubii " " 61.
" margaritaceus " " 67.
" margaritatus " " 67.
" naevius " " 53.
" sulphuratus " " 65.
Micropsitta pygmaea III P. 74.
Microptera americana V Sc. 3.
" (Atricilla) VI L. 44.
" minor V Sc. 3.
Micropterus cinereus VI A. 13.
" (Cuculus) I Cuc. 12.
" (Psittacus) III P. 69.
Micrositace smaragdina " " 22.
microstephanus (Momotus) III Mo. 3.
midas (Otus) II Oti. 2.
migrans (Milvus) II Mil. 2, 3; II Acc. 126.
migratoria (Columba) IV Col. 142.
" (Ectopistes) " " 142.
" (Peristera) " " 115, 142.
miles (Lobivanellus) IV Cur. 66.
" (Vanellus) " " 66.
militaris (Arara) III P. 5; III P. R. 2.
" (Columba) IV Col. 45.
" (Psittacus) III P. 5.
" (Vinago) IV Col. 45.
Milvago albigularis II Pol. 4.
" australis " " 3.
" chimango " " 6.
" leucurus " " 3.
" ochrocephalus " " 5.
Milvi II Mil. 1; II Acc. 126.
milvoides (Aquila) II But. 17.
Milvus II Mil. 1; II Acc. 126.
Milvus aegypius II Acc. 126.
" aegyptius II Mil. 3.
Milvus aetolius II Mil. 2; II Acc. 126.
" affinis " " 3; " " 126.
" cenchris " " 10.
" (Falco) " " 1.
" govinda " " 2; II Acc. 126.
" isiurus " " 4; " " 129.
" leucurus " " 8.
" melanosternon II But. 19.
" melanotus II Mil. 2; II Acc. 126.
" migrans " " 2, 3; " " 126.
" niger " " 2; " " 126.
" regalis " " 1; " " 126.
" riocourii " " 5.
" sphenurus II Aq. 21.
Mimeta affinis I Cor. 110.
" buruensis " " 113.
" flavicincta " " 110.
" forsteni " " 112.
" melanotis " " 111, 113.
" meruloides " " 110.
" mülleri " " 110.
" viridis " " 110, 115.
Mimetes flavocinctus " " 110.
" viridis " " 110.
minahasa (Rallina) V Ra. 18.
mindanensis (Eudynamis) I Cuc. 18.
minima (Erythra cinerea) V Ra. 32.
" (Scolopax) V Sc. 14.
minimus (Indicator) I Cuc. 2.
minor (Accipiter) II Ass. 28.
" (Alcedo) III Al. 7; III Al. R. 3.
" (Alcedo bengalensis) III Al. 7.
" (Anous) VI Ster. 37.
" (Aptenodytes) VI U. 10.
" (Ardea) V Ar. 49.
" (Atricilla) VI L. 44.
" (Botaurus) V Ar. 49.
" (Bubo orientalis) II Oti. 13; IINoc. 5.
" (Buteo) II But. 5.
" (Cacatua) III P. 144.
" (Charadrius) IV Cur. 28.
" (Cirrhocephalus) VI L. 36.
" (Cissa) I Cor. 68.
" (Coccyzus) I Cuc. 38.
" (Colymbus) VI U. 15, 43.
" (Colymbus cornutus) VI U. 36.
" (Corvus) I Cor. 27, 29.
" (Crotophaga) I Cuc. 47.
" (Cuculus cayanensis) " " 59.
" (Cygnus) VI A. 82.
" (Dacelo coromandeliana) III Al. 25; III Al. R. 16.
" (Dendrocygna) VI A. 89.
" (Elanus) II Mil. 6.
" (Falco communis) II Fal. 4; II Acc. 33.
" (Fregata) VI Pe. 3.
" (Fuligula) VI A. 28.
" (Fulmarus) VI Proc. 21.
" (Garrulus) I Cor. 57.
" (Halcyon coromanda) III Al. 25.
" (Indicator) I Cuc. 2.
" (Ispida bengalensis) III Al. 7.

minor (Larus ichthyaëtus) VI L. 34.
" (Leucus leucopterus) " " 5.
" (Macropygia reinwardtii) IV Col. 106.
" (Microptera) V Sc. 3.
" moluccensis (Alcedo) III Al. 8; III Al. R. 3.
" (Noctua hirsuta) II Noc. 24.
" (Nothura) VIII Ti. 45.
" (Numenius) V Sc. 93, 101.
" (Olor) VI A. 82.
" (Pagodroma nivea) VI Proc. 16.
" (Paradisea) I Cor. 82.
" (Pelecanus) VI Pe. 3, 30.
" (Pelecanus onocrotalus) VI Pe. 30.
" (Philohela) V Sc. 3.
" (Phoenicopterus) VI A. 116.
" (Piaya) I Cuc. 59.
" (Platalea) V Cic. 21.
" (Pluvialis torquata) IV Cur. 26.
" (Podiceps) VI U. 43.
" (Pogonias) I Bucc. 3.
" (Porphyrio) V Ra. 38.
" (Procellaria nivea) VI Proc. 16.
" (Rallus aquaticus) V Ra. 29.
" (Rusticola) V Sc. 3.
" (Scolopax) " " 3, 14.
" (Spheniscus) VI U. 10.
" (Tachybaptus) " " 43.
" (Tachypetes) VI Pe. 3.
" (Tinamus) VIII Ti. 45.
" (Tringa cinclus) V Sc. 33.
" (Uria) VI U 18, 20.
minullus (Falco) II Ass. 34.
" (Nisus) II Ass. 34; II Acc. 77.
minuta (Aquila) II Aq. 8.
" (Ardea) V Ar. 37.
" (Ardeola) V Ar. 37.
" australis (Ardea) V Ar. 39.
" (Barbatula) I Bucc. 40.
" (Columba) IV Col. 135.
" (Porzana) V Ra. 31.
" (Sterna) VI Ster. 21, 23.
" (Sternula) " " 21.
" (Tringa) V Sc. 43.
" (Zapornia) V Ra. 31.
minutilla (Actodromus) V Sc. 48.
" (Tringa) V Sc. 48, 55.
minutillus (Chrysococcyx) I Cuc. 33.
minutissima (Athene) II Str. 32.
" (Noctua) " " 32; II Noc. 29.
" (Strix) II Str. 32.
minutus (Actodromus) V Sc. 43.
" (Anser) VI A. 111.
" brevirostris (Actodromus) V Sc. 49.
" (Bucco) I Bucc. 40.
" (Coccyzus) I Cuc. 59.
" (Corvus) I Cor. 24.
" (Hydrocoloeus) VI L. 42.
" (Larus) " " 41, 42.
" (Mergus) VI A. 6.
" (Merops) III Mc. 10.
" (Numenius) V Sc. 101.
minutus (Porphyrio) V Ra. 38.
" (Rallus) V Ra. 31.
miqueli (Ptilopus) IV Col. 26.
mirandollei (Astur) II Ass. 27; II Acc. 68.
Misocalius palliolatus I Cuc. 34.
missisippensis (Falco) II Mil. 10.
" (Ictinia) " " 10; II Acc. 131.
mitrata (Fulica) V Ra. 59.
mitratus (Pelecanus) VI Pe. 30.
" (Psittacus) III P. 30.
modesta (Ardea) V Ar. 17.
" (Columba) IV Col. 107.
" (Egretta) V Ar. 17.
" (Macropygia) IV Col. 107.
" (Psitacella) III P. R. 42.
" (Psittacula) III P. 31.
" (Turcoena) IV Col. 107.
modestus (Charadrius) IV Cur. 48.
" (Crypturus) VIII Ti. 25.
" (Larus) VI L. 44.
" (Morinellus) IV Cur. 42, 48.
" (Palaeornis) III P. 84.
" (Zonibyx) IV Cur. 48.
mogilnik (Aquila) II Aq. 2.
" bifasciata (Aquila) II Aq. 3; II Acc. 115.
" (Falco) II Aq. 2.
mokoho (Ardea) V Ar. 49.
molinae (Aptenodytes) VI U. 10.
molkenboeri (Centropus) I Cuc. 65.
mollis (Cookilaria) VI Proc. 11.
" (Procellaria) " " 11.
mollissima (Anas) VI A. 14.
" (Fuligula) " " 14.
" (Somateria) " " 14.
moloxitta (Oriolus) I Cor. 108.
moluccensis (Alcedo) III Al. 8.
" (Alcedo minor) III Al. 8; III Al. R. 3.
" (Cacatua) III P. 142; III P. R. 66.
" (Centrococcyx) I Cuc. 69.
" (Chalcophaps) IV Col. 145.
" (Falco) II Fal. 28; II Acc. 42.
" (Merula viridis) III Pit. 11.
" (Merula viridis atricapilla) III Pit. 3.
" (Pitta) III Pit. R. 15.
" (Psittacus) III P. 142.
Molybdophanes coerulescens V I. 9
Momot du Brésil III Mo. 2.
momota (Prionites) " " 2.
" (Rhamphastus) " " 2.
momotula (Hylomanes) " " 7.
" (Momotus) " " 7.
Momotus " " 1.
Momotus bahamensis " " 3.
" brasiliensis " " 2.
" coerulciceps " " 4.
" gularis " " 7.
" lessoni " " 4.
" levaillantii " " 6.

Momotus martii III Mo. 4.
„ mexicanus „ „ 6.
„ microstephanus „ „ 3.
„ momotula „ „ 7.
„ platyrhynchus „ „ 4.
„ ruficapillus „ „ 5.
„ semirufus „ „ 5.
„ subrufescens „ „ 3.
„ superciliaris „ „ 7.
monacha (Columba) IV Col. 12.
„ (Grus) V Ra. 4.
Monachalcyon princeps III Al. 24.
monachus (Cathartes) II Vul. 5.
„ (Centropus) I Cuc. 72.
„ (Charadrius) IV Cur. 35.
„ (Coccycua) I Cuc. 59.
„ (Conurus) III P. 15; III P. R. 4.
„ (Dacelo) III Al. 24.
„ (Psittacus) III P. 15.
„ (Ptilinopus) IV Col. 12.
„ (Ptilopus) „ „ 12.
„ (Vultur) II Vul. 9; II Acc. 141.
Monasa I Bucc. 88.
Monasa atra „ „ 88.
„ axillaris „ „ 89.
„ flavirostris „ „ 89.
„ fusca „ „ 86.
„ inornata „ „ 85.
„ leucops „ „ 89.
„ nigrifrons „ „ 89.
„ personata „ „ 89.
„ peruana „ „ 89.
„ phaioleucos „ „ 87.
„ tenebrio „ „ 91.
„ tenebrosa „ „ 91.
„ tranquilla „ „ 88.
„ unitorques „ „ 85.
Monastes „ „ 88.
Monastes fuscus „ „ 85.
monedula (Corvus) I Cor. 33.
„ (Lycos) „ „ 33.
„ nigra „ „ 33.
mongolicus (Charadrius) IV Cur. 41.
mongolus (Pluviorhynchus) „ „ 41.
monocerata (Alca) VI U. 26.
monoceratus (Simorhynchus) „ „ 26.
monoceros (Buceros) I Buc. 6.
monogrammicus (Astur) II Ass. 24; II Acc. 67.
„ (Falco) „ „ 24.
Montagnard II Fal. 27.
montagui (Scolopax) V Sc. 7.
montana (Anas) VI A. 67.
„ (Columba) IV Col. 165.
„ (Geotrygon) „ „ 165.
„ (Starnoenas) „ „ 165.
montanus (Anser) VI A. 100.
„ (Buteo) II Acc. 107.
„ (Charadrius) IV Cur. 38, 46.
„ (Corvus) I Cor. 11.
„ (Ochtodromus) IV Cur. 38.
„ (Phaleoboenus) II Pol. 4.
monticola (Bulaca) II Str. 19.
montieri (Gallinula) V Ra. 50.
montignesia (Grus) V Ra. 4.
moreli (Nisus) II Acc. 95.
morinella (Eudromias) IV Cur. 46.
„ (Tringa) „ „ 43.
Morinellus „ „ 46.
Morinellus australis „ „ 47.
„ caspius „ „ 38.
„ (Charadrius) „ „ 46.
„ modestus „ „ 42. 48.
„ sibiricus „ „ 46.
„ totanirostris „ „ 47.
morio (Corvus) I Cor. 44.
„ (Pica) „ „ 44.
„ (Psilorhinus) „ „ 44.
Mormon arctica VI U. 28.
„ cirrhatus „ „ 27.
„ corniculatum „ „ 28.
„ fratercula „ „ 28.
„ glacialis „ „ 28.
„ superciliosa „ „ 25.
Morococcyx erythropygius I Cuc. 42.
morotensis (Lycocorax) I Cor. 132.
morphnoides (Aquila) II Aq. 8.
Morphnus guianensis II Ass. 25.
„ meridionalis II But. 17.
„ urubitinga II Ase. 6.
mortieri (Tribonyx) V Ra. 50.
moschata (Anas) VI A. 73, 74.
„ (Cairina) „ „ 73.
mossambicus (Lymnicorax) V Ra. 35.
Mouettes à capuchon VI L. 31.
mülleri (Accipiter) II Acc. 80.
„ (Anas) VI A. 42.
„ (Brachyurus) III Pit. 3.
„ (Carpophaga) IV Col. 93.
„ (Circus) II But. 23.
„ (Eclectus) III P. 48; III P. R. 25.
„ (Mimeta) I Cor. 110.
„ (Pitta) III Pit. R. 5.
„ (Psittacus) III P. 48.
„ (Tanygnathus) „ „ 48.
„ (Zoenaenas) IV Col. 93.
multicolor (Anas) VI A. 77.
„ (Euphema) III P. 100; III P. R. 40.
„ (Platycercus) III P. 100.
„ (Psephotus) „ „ 100.
„ (Psittacus) „ „ 100, 108.
„ (Querquednla) VI A. 72.
„ (Todus) III Mo. 8.
„ (Treron) IV Col. 51.
„ (Trichoglossus) III P. 108; III P. R. 47.
multistriata (Hemipalama) V Sc. 54.
muralis (Anas) VI A. 57.
murina (Myiopsitta) III P. 15.
murinoides (Psittacus) „ „ 16.
murinus (Conurus) „ „ 16.
„ (Psittacus) „ „ 15.
muschenbroekii (Nanodes) III P. R. 52.
musicus (Astur) II Ass. 20; II Acc. 65.
„ (Cygnus) VI A. 81.
„ (Falco) II Ass. 20.
„ (Melierax) „ „ 20.

musicus (Olor) VI A. 81.
Musophaga I Cuc. 74.
Musophaga africana " " 79.
" albicristata " " 77.
" concolor " " 78.
" cristata " " 77.
" erythrolopha " " 75.
" gigantea " " 77.
" leucogastra " " 78.
" leucotis " " 75.
" macrorhyncha " " 76.
" meriani " " 76
" paulinae " " 75.
" persa " " 76.
" personata " " 78.
" porphyreolopha " " 75.
" purpurea " " 77.
" senegalensis " " 79.
" variegata " " 79.
" verreauxii " " 76.
" violacea " " 74.
" zonura " " 79.
Musophagae ignobiles " " 78.
" nobiles " " 74.
musschenbroekii (Ptilopus) IV Col. 23.
mustelina (Crex) V Ra. 34.
Mustelirallus albicollis V Ra. 34.
muta (Anas) VI A. 58.
Mycteria V Cic. 11.
Mycteria americana " " 11.
" argala " " 13.
" australis " " 6.
" (Ciconia) " " 11.
" crumenifera " " 12.
" indica " " 7.
" javanica " " 13.
" senegalensis " " 7.
Myiopsitta aurifrons III P. 15.
" murina " " 15.
Myiothera coerulea III Pit. 1.
myrtha (Alula) II Str. 19; II Noc. 21.
" (Ciccaba) " " 19.
mystacalis (Cyanocorax) I Cor. 51.
mystacea (Columba) IV Col. 164.
" (Geotrygon) " " 164.
" (Starnoenas) " " 164.
" (Uria) VI U. 26.
mystacina (Gallinula) V Ra. 32.
mystacophanos (Bucco) I Bucc. 18.
" (Megalaima) " " 18.

N.

Naenia inca VI Ster. 39.
naevia (Aquila) II Aq. 6; II Acc. 116.
" (Gallinula) V Ra. 40.
" (Glareola) IV Cur. 15
" (Ispida brasiliensis) I Bucc. 84.
" (Sterna) VI Ster. 29, 31.
" (Tringa) V Sc. 29.
naevioides (Aquila) II Aq. 3; II Acc. 115.
" (Falco) " " 3.
naevius (Bucco cayanensis) I Bucc. 53.
naevius (Coccyzes) I Cuc. 42.
" (Colymbus) VI U. 38.
" (Cuculus cayanensis) I Cuc. 42.
" (Diplopterus) " " 42.
" (Falco) II Aq. 6.
" (Galgulus) I Cor. 135.
" (Geococcyx) I Cuc. 42.
" (Spheniscus) VI U. 10.
" (Totanus) V Sc. 65.
naevosa (Anas) VI A. 63.
" (Stictonetta) " " 63.
nagtglasii (Buceros) I Buc. 16.
naina (Ptilinopus) IV Col. 21.
naïs (Tanysiptera) III Al. R. 36.
nana (Athene) II Str. 31.
" (Bucco) I Bucc. 24.
" (Columba) IV Col. 21.
" (Jotreron) " " 21.
" (Noctua) II Str. 31; II Noc. 29.
" (Nothura) VIII Ti. 46.
" (Psittacara) III P. 14.
" (Strix) II Str. 31.
nanday (Conurus) III P. 10; III P. R. 3.
" (Psittacus) " " 10.
Nandayus melanocephalus III P. 10.
Nanodes IIIP.112; IIIP.R.50.
Nanodes australis " " 114; " " 53.
" discolor " " 114; " " 53.
" euteles " " 112; " " 50.
" fringillaceus " " 117; " " 53.
" iris " " 116; " " 53.
" muschenbroekii " " 52.
" papuensis " " 53.
" placens IIIP.113; " " 50.
" porphyreocephalus III P. 115; III P. R. 53.
" pulchellus III P. R. 52.
" pusillus IIIP.115; IIIP.R.53.
" rubronotatus " " 51.
" smaragdinus IIIP.117; " " 54.
" solitarius " " 116; " " 59.
" taitianus " " 117; " " 53.
" versicolor " " 115; " " 53.
nanus (Conurus) " " 14; " " 4.
" (Cyanocorax) I Cor. 49.
" (Ichthyaëtus) II Aq. 18.
" (Ptilopus) IV Col. 21.
" (Spizaetus) II Acc. 52.
" (Tinamus) VIII Ti. 46.
napoleonis (Gygis) VI Ster. 35.
nasica (Buceros) I Buc. 13.
" (Cacatua) III P. 146; III P. R. 67.
" (Treron) IV Col. 55.
nasicus (Corvus) I Cor. 32, 33.
" (Psittacus) III P. 146.
Nasiterna geelvinkiana III P. R. 71.
" pygmaea III P. 74; III P. R. 71.
" pygmaea geelvinkiana III P. R. 71.
naso (Calyptorhynchus) III P. 153.
nasutus (Buceros) I Buc. 13.
" (Corvus) I Cor. 33.
" (Psittacus) III P. 46.

natalensis (Alcedo) III Al. R. 8.
" (Coracias) I Cor. 135.
" (Merops) III Me. 7.
natans (Totanus) V Sc. 64.
natator (Totanus) " " 69.
nattereri (Asturina) II Acc. 100.
Nauclerus II Mil. 5; II Acc. 129.
Nauclerus furcatus " " 5; " " 129.
" riocourii " " 5; " " 129.
nebulosa (Strix) II Str. 11.
" (Ulula) " " 11; II Noc. 18.
nebulosum (Syrnium) II Str. 11.
Nectris brevicaudus VI Proc. 27.
" carneipes " " 26.
" fuliginosa " " 8, 26.
" gama " " 26.
" tenuirostris " " 27.
neglecta (Carpophaga) IV Col. 90.
" (Procellaria) VI Proc. 10.
neglectus (Corvus) I Cor. 35.
" (Cuculus) I Cuc. 35.
" (Falco) II Acc. 43.
" (Porphyrio) V Ra. 53.
" (Procellarius) VI L. 22.
" (Ptilopus) IV Col. 7.
" (Turtur) " " 122.
nemoricola (Gallinago) V Sc. 16.
" nipalensis " " 16.
" (Scolopax) " " 16.
Neomorphus I Cuc. 60.
Neomorphus geoffroyi " " 60.
" radiatus " " 60.
Neophron II Vul. 5.
Neophron percnopterus II Vul. 5; II Acc. 139.
" pileatus " " 5; " " 139.
nereis (Sterna) VI Ster. 21.
nesiotis (Coccygus) I Cuc. 38.
Nesocentor goliath " " 61.
" menbeki " " 61.
Nestor III P. 156; III P. R. 70.
Nestor hypopolius " " 156.
" meridionalis " " 156; III P. R. 70.
" novaezeelandiae " " 156.
" pecquetii " " 157; III P. R. 70.
" (Podiceps) VI U. 41.
" (Poliocephalus) VI U. 41.
" productus III P. 157; III P. R. 71.
" (Psittacus) " " 156.
Netchitterin VI Proc. 5.
Nettapus VI A. 75.
Nettapus albipennis " " 77.
" auritus " " 75.
" coromandelianus " " 76.
" pulchellus " " 77.
Nettion crecca " " 52.
newarensis (Bulaca) II Str. 19; II Noc. 21.
newtonii (Falco) II Acc. 43.
nicobarica (Calloenas) IV Col. 170.
" (Columba) " " 170.
nicobariensis (Megapodius) VIII Ti. 74.
nigellus (Caiidris) V Sc. 55.
niger (Aegypius) II Vul. 9.
" africanus (Haematopus) IV Cur. 76.
niger americanus (Haematopus) IV Cur. 76.
" australasianus (Haematopus) IV Cur. 75.
" (Bucco) I Bucc. 7.
" (Cuculus) I Cuc. 27.
" (Epimachus) I Cor. 94.
" (Falco) II But. 2.
" (Haematopus) IV Cur. 76.
" (Haliaeus) VI Pe. 13.
" (Lymnicorax) V Ra. 34.
" (Melanopelargos) V Cic. 4.
" (Milvus) II Mil. 2; II Acc. 126.
" oceanicus (Haematopus) IV Cur. 75.
" (Psittacus) III P. 37; III P. R. 10.
" (Rallus) V Ra. 34.
" (Sparvius) II Acc. 96.
nigra (Anas) VI A. 18, 19.
" (Astrapia) I Cor. 94.
" (Ciconia) V Cic. 4.
" (Coracias) I Cor. 78.
" (Eudynamis) I Cuc. 17.
" (Fuligula) VI A. 18.
" (Hydrochelidon) VI Ster. 31.
" (Ischnoscelis) II Ass. 53.
" (Monedula) I Cor. 33.
" (Oidemia) VI A. 18.
" (Paradisea) I Cor. 94.
" (Parra) V Ra. 65.
" (Polyphasia) I Cuc. 27.
" (Porzana) V Ra. 34.
" (Rhynchops) VI Ster. 39.
" (Sterna) " " 29, 30.
" (Uria) VI U. 18.
nigricans (Anser) VI A. 103.
" (Bernicla) " " 103.
" (Rallus) V Ra. 8.
" (Tringa) V Sc. 30.
nigricapillus (Tinamus) VIII Ti. 17.
nigriceps (Anas) VI A. 32.
" (Falco) II Acc. 32.
" (Otis) IV Cur. 8.
nigricollis (Anas) VI A. 79.
" (Buteo) II But. 17; II Acc. 110.
" (Colius) I Cuc. 81.
" (Cygnus) VI A. 79.
" (Falco) II But. 17.
" (Himantopus) V Sc. 107.
" (Macrotarsus) " " 107.
" (Podiceps) VI U. 40.
nigricrissa (Piaya) I Cuc. 57.
nigrifrons (Bucco) I Bucc. 89.
" (Centropus) I Cuc. 65.
" (Charadrius) IV Cur. 31.
" (Monasa) I Bucc. 89.
nigrifusca (Malacoptila) " " 85.
nigrigularis (Trichoglossus) III P. 110; III P. R. 43.
nigripennis (Gallinago) V Sc. 10.
" (Pelecanopus) VI Ster. 9.
nigripes (Ardea) V Ar. 12.
" (Diomedea) VI Proc. 33.
" (Garzetta) V Ar. 14.
nigrirostris (Ardea) " " 12.
" (Chloroenas) IV Col. 78.

nigrirufus (Centropus) I Cuc. 64.
nigrithorax (Bucco) I Bucc. 4.
nigriventris (Eudyptes) VI U. 6.
nigrocyanea (Dacelo) III Al. R. 31.
" (Halcyon) " " 31.
nigrogularis (Cracticus) I Cor. 128.
nigro-maculatus (Bucco) I Bucc. 53.
nigrorufus (Cuculus) I Cuc. 64, 65.
nilotica (Gallinago) V Sc. 4.
" (Sterna) VI Ster. 17.
Ninox jeridius II Str. 25.
" madagascariensis II Noc. 23.
" nipalensis II Str. 25.
ninus (Aratinga) III P. 24.
nipalensis (Aceros) I Buc. 10.
" (Aquila) II Aq. 9.
" (Brachyurus) III Pit. 2.
" (Bubo) II Noc. 5.
" (Buceros) I Buc. 10.
" (Heleornis) III Pit. 2.
" (Huhua) II Noc. 5.
" (Limnaëtus) II Acc. 52.
" (Nemoricola) V Sc. 16.
" (Ninox) II Str. 25.
" (Nisaëtus) II Ass. 6.
" (Paludicola) III Pit. 2.
" (Pitta) III Pit. 2; III Pit. R. 4.
" (Thoria) IV Col. 55.
" (Toria) " " 53.
" (Treron) " " 53.
nippon (Ibis) V I. 9.
Nipponia temminckii " " 9.
Nisaëtus alboniger II Ass. 6.
" grandis II Aq. 9.
" nipalensis II Ass. 6.
" niveus II Aq. 9.
" pallidus II Ass. 6.
" pulcher " " 6.
nisicolor (Cuculus) I Cuc. 15.
nisoria (Strix) II Str. 42.
Nisus IIAss.28; IIAcc.68.
Nisus approximans " " 42; " " 79.
" badius " " 48; " " 92.
" bicolor " " 71.
" brachypterus IIAss.52; " " 99.
" brevipes " " 92.
" brutus " " 95.
" chilensis " " 71.
" chionogaster " " 71.
" cirrhocephalus IIAss.38; " " 77.
" cirrhocephalus ceramensis II Ass. 39; II Acc. 78.
" communis IIAss.28.
" concentricus " " 51; IIAcc.98.
" cooperi " " 18; " " 73.
" cruentus " " 40; " " 80.
" erythrauchen " " 39; " " 76, 78.
" erythrocnemia IIAcc.70.
" erythrocnemius IIAss.46; " " 70.
" erythropus " " 35; " " 77.
" (Falco) " " 28.
" ferrugineus " " 31; IIAcc.70.
Nisus francessii IIAcc.94.
" fringillarius IIAss.28; " " 68.
" fringillarius rufiventer II Ass. 30; II Acc. 69.
" fuscus II Ass. 30; II Acc. 69.
" gabar " " 48; " " 96.
" gularis " " 33; " " 74.
" guttatus " " 71.
" haplochrous " " 91.
" hemidactylus II Ass. 53; " " 99.
" iogaster II Ass. 43; II Acc. 76, 89.
" lantzii " " 72.
" melanoleucus IIAss.15, 37; IIAcc.74.
" minullus " " 34, 35; " " 77.
" moreli " " 95.
" perlatus " " 73.
" perspicillaris IIAss.30.
" pileatus " " 35, 43; IIAcc.70.
" poliocephalus " " 88.
" poliogaster II Ass. 43; " " 96.
" polyzonoides " " 92.
" polyzonus II Ass. 46.
" radiatus " " 54; II Acc. 100.
" recentiorum " " 28.
" rhodogaster II Acc. 76.
" ruficollis II Ass. 50, 51; " " 98.
" rufitorques " " 40; " " 80.
" satrapa " " 46.
" sexfasciatus " " 35.
" soloënsis " " 44; II Acc. 97.
" sphenurus " " 92.
" striatus II Ass. 28.
" sulaënsis II Acc. 76.
" tachiro II Ass. 46; " " 96.
" tinus " " 33; " " 77.
" torquatus " " 38, 39; " " 91.
" trinotatus " " 45; " " 90.
" unduliventer " " 47; " " 96.
" verreauxi " " 15.
" verreauxii " " 37; II Acc. 74.
" virgatus " " 32; " " 74.
" " rhodogaster II Ass. 32; II Acc. 76.
" xanthothorax II Ass. 50; II Acc. 98.
" zonarius " " 47; " " 96.
nitida (Asturina) II Ase. 1; " " 100.
nitidus (Falco) " " 1.
nitzschii (Sterna) VI Ster. 16.
nivalis (Anas) VI A. 107.
nivea (Ardea) V Ar. 12.
" major (Pagodroma) VI Proc. 15.
" minor (Pagodroma) " " 16.
" minor (Procellaria) " " 16.
" (Nyctea) II Str. 43.
" (Pagophila) VI L. 6.
" (Procellaria) VI Proc. 15.
" (Strix) II Str. 43.
niveigula (Glottis) IV Sc. 61.
niveus (Larus) VI L. 26.
" (Misaëtus) II Aq. 9.
" (Sparvius) II Ass. 20.
" (Spizaetus) " " 7.
nivifrons (Charadrius) IV Cur. 35.

nivifrons (Leucopolius) IV Cur. 35.
nivosa (Aegialitis) " " 32.
nivosus (Rallus) V Ra. 13.
nobiles (Musophagae) I Cuc. 74.
nobilis (Arara) III P. 8; III P. R. 3.
" (Ardea) V Ar. 3.
" (Ardeomega) V Ar. 3.
" (Conurus) III P. 8.
" (Corvus) I Cor. 12.
" (Gallinago) V Sc. 9.
" (Otidiphaps) IV Col. 170.
" (Psittacus) III P. 8.
" (Sittace) " " 8.
noctivagus (Crypturus) VIII Ti. 33.
" (Podiceps) VI U. 45.
" (Tinamus) VIII Ti. 33.
Noctua II Str. 24; II Noc. 21.
Noctua aruensis " " 31.
" (Athene) II Str. 28.
" boobook II Str. 38; II Noc. 26.
" brama " " 29; " " 27.
" brasiliensis " " 31.
" brodiei " " 35; II Noc. 28.
" capensis " " 28.
" castanoptera II Str. 34; " " 29.
" castanota " " 34; " " 28.
" connivens " " 39; " " 31.
" cuculoides " " 33; " " 27.
" cunicularia " " 30; " " 27.
" dominicensis " " 14.
" ferruginea " "30, 31; II Noc. 29.
" fransenii " " 31.
" guteruhi II Str. 26; " " 23.
" hirsuta " " 25; " " 23.
" " borneoensis II Str. 25; II Noc. 24.
" " japonica II Str. 25; II Noc. 23.
" " minor II Noc. 24.
" " philippensis II Str. 26; II Noc. 22.
" hoedtii II Noc. 24.
" hypogramma " " 25.
" infuscata II Str. 31; " " 29.
" jardinii " " 29.
" maculata II Str. 39; " " 26.
" minutissima " " 32; " " 29.
" nana " " 31; " " 29.
" novae zeelandiae II Str. 38; II Noc. 26.
" nyctea II Str. 43; II Noc. 32.
" ochracea " " 22.
" passerina II Str. 41; " " 30.
" perlata " " 36; " " 30.
" " capensis II Str. 37; II Noc. 30.
" philippensis II Noc. 22.
" polleni " " 25.
" punctulata II Str. 29; II Noc. 29.
" radiata " " 34; " " 27.
" rufistrigata " " 31.
" squamipila II Str. 27; " " 22.
" strenua " " 40; " " 31.
" (Strix) " " 28.
Noctua superciliaris II Noc. 25.
" sylvatica II Str. 36; II Noc. 28.
" ulula " "38, 42; " " 32.
" veterum " " 28; " " 26.
" " meridionalis II Str. 29; II Noc. 26.
Noctuae II Noc. 1.
noctula (Scops) II Oti. 24; II Noc. 10.
" (Strix) " " 24.
Noddi VI Ster. 36.
nodirostris (Ciceronia) VI U. 23.
noiroux (Coucal) I Cuc. 64.
Nonnula rubecula I Bucc. 87.
nordmannii (Glareola) IV Cur. 15.
norfolciensis (Carpophaga) IV Col. 103.
" (Columba) " " 103.
" (Leucomelaena) " " 103.
norwegicus (Falco gyrfalco) II Fal. 12; II Acc. 34.
notata (Anas) VI A. 28, 61.
notatus (Actitis) V Sc. 83.
" (Elanus) II Mil. 8.
Nothocercus julius VIII Ti. 18.
" sallaei " " 31.
Nothoprocta curvirostris " " 41.
Nothorodius guarauna V Ra. 7.
Nothura VIII Ti. 39.
Nothura assimilis " " 20.
" boraquira " " 44.
" cinerascens " " 40.
" curvirostris " " 41.
" doeringii " " 41.
" maculosa " " 42, 45.
" major " " 42.
" marmorata " " 44.
" media " " 45.
" minor " " 45.
" nana " " 46.
" perdicaria " " 40.
" punctulata " " 41.
Notornis alba V Ra. 52.
" coerulescens IV St. 2; V Ra. 52.
" mantelli " " 52.
novaeboracensis (Coturnicops) " " 26.
" (Crex) " " 26.
" (Fulica) " " 26.
" (Gallinula) " " 26.
" (Ortygometra) " " 26.
novae guineae (Ardea) V Ar. 25.
" (Cyanorhamphus) III P. 106.
" mefoorana (Pitta) III Pit. R. 8.
" (Pitta) III P. 4; III Pit. R. 6.
" (Psittacus) III P. 129.
novae hispaniae (Anas) VI A. 52.
novae hollandiae (Ardea) V Ar. 28.
" (Astur) II Ass. 20; II Acc. 63.
" (Biziura) VI A. 7.
" (Calopsitta) III P. 99.
" (Cereopsis) VI A. 115.
" (Cygnus) " " 80.
" (Dromajus) IV St. 7.

novae hollandiae (Falco) II Ass. 20.
" (Herodias) V Ar. 28.
" (Nymphicus) III P. 99.
" (Platycercus) " " 99; III P. R. 40.
" (Plotus) VI Pe. 26.
" (Podiceps) VI U. 43.
" (Psittacus) III P. 99.
" (Scythrops) I Cuc. 36.
" (Strix) IIStr.6; IINoc.17.
" (Vanellus) IV Cur. 67.
novae zeelandiae (Anas) VI A. 29.
" (Athene) II Str. 38.
" (Carpophaga) IV Col. 98.
" (Charadrius) IV Cur. 45.
" (Columba) IV Col. 98.
" (Euphema) III P. 105; III P. R. 42.
" (Falco) II Fal. 35; II Pol. 3; II Acc. 47.
" (Fuligula) VI A. 29.
" (Graculus) VI Pe. 8.
" (Hemiphaga) IV Col. 98.
" (Himantopus) V Sc. 108.
" (Limosa) " " 25.
" (Nestor) III P. 156.
" (Noctua) II Str. 38; II Noc. 36.
" (Platycercus) III P. 105.
" (Psittacus) " " 105.
" (Scops) II Oti. 27; II Noc. 13.
" (Strepsilas) IV Cur. 45.
" (Strix) II Str. 38.
noveboracensis (Scolopax) V Sc. 26.
nuba (Otis) IV Cur. 5.
nubicoides (Merops) III Me. 7.
nubicus (Falco lanarius) II Fal. 15; II Acc. 35.
" (Merops) III Me. 7.
" (Vultur) II Vul. 9.
nuchalis (Calodera) I Cor. 119.
" (Chlamydera) " " 119.
" (Coracias) " " 137.
" (Psittacus) III P. 115.
" (Ptilorhynchus) I Cor. 119.
Nucifraga " " 37.
Nucifraga caryocatactes " " 37.
" hemispila " " 38.
nudicollis (Falco) II Pol. 9.
nudifrons (Ibis) V I. 8.
" (Platalea) V Cic. 22.
nudipes (Gypaëtus) II Vul. 11.
nudirostris (Phalacotreron) IV Col. 47.
" (Treron) " " 47, 49.
nugax bailloni (Puffinus) VI Proc. 30.
" (Procellaria) " " 31.
" (Puffinus) " " 31.
Numenius V Sc. 84
Numenius arquata " " 85.
" atricapillus " " 93.
" australis " " 90.
" borealis " " 100, 101.
" brevirostris " " 101.
Numenius cinereus V Sc. 77.
" cyanopus " " 91.
" femoralis " " 94.
" haesitatus " " 93.
" hastatus " " 92.
" hemirhynchus " " 101.
" hudsonicus " " 100.
" ibis V Cic. 18.
" intermedius V Sc. 100.
" lineatus " " 86.
" longirostris " " 85.
" luzoniensis " " 93.
" madagascariensis V Sc. 91.
" major V Sc. 86, 89, 91.
" medius " " 86.
" melanopus " " 85.
" minor " " 93, 101.
" minutus " " 101.
" occidentalis " " 85.
" phaeopus " " 93.
" pusillus " " 49.
" pygmaeus " " 49.
" rufescens " " 91.
" rufus " " 85.
" struthersii " " 102.
" subarquata " " 31.
" syngenicos " " 92.
" tahiticus " " 94.
" tahitiensis " " 91, 94.
" tenuirostris " " 92.
" uropygialis " " 93.
numidica (Grus) V Ra. 6.
nuttalli (Pica) I Cor. 39.
Nyctactes pulmentum I Bucc. 80.
" tamatia " " 79.
Nyctale II Str. 8; II Noc. 17.
Nyctale funerea " " 8.
" harrisii " " 9.
Nyctalopus stygius II Oti. 6.
Nyctea nivea II Str. 43.
" (Noctua) II Str. 43; II Noc. 32.
" (Strix) " " 43.
Nyctherodias violaceus V Ar. 61.
Nycticorax americanus " " 56.
" (Ardea) " " 56.
" caledonicus " " 59.
" crassirostris " " 60.
" cucullatus " " 60.
" gardeni " " 56.
" goisagi " " 54.
" griseus " " 56.
" leuconotus " " 60.
" limnophylax " " 55.
" manillensis " " 60.
" obscurus " " 58.
" pileatus " " 36.
" violaceus " " 61.
Nyctiornis amicta III Me. 13.
" athertoni " " 12.
nympha (Tanysiptera) III Al. 43; III Al. R. 41.
Nymphicus bisetis III P. 95.
" novae hollandiae " " 99.

Nyroca africana VI A. 30.
" (Anas) " " 30.
" australis " " 30.
" brunnea " " 31.
" ferina " " 23.
" (Fuligula) " " 30.
" latirostris " " 28.
" leucophthalma " " 30.
Nystactes I Bucc. 53.

O.

obiensis (Lycocorax) I Cor. 132.
obscura (Anas) VI A. 41.
" (Ardea) V Ar. 58.
" (Procellaria) VI Proc. 30.
obscurus (Anser) VI A. 112.
" (Charadrius) IV Cur. 45.
" (Nycticorax) V Ar. 58.
" (Psittacus) III P. 37; III P. R. 10.
" (Puffinus) VI Proc. 30.
obsoletus (Crypturus) VIII Ti. 22.
" (Tinamus) " " 22.
occidentalis (Ceratorhyncha) VI U. 26.
" (Cerorhyncha) " " 26.
" (Dacelo) III Al. R. 11.
" (Falco berigora) II Fal. 36; II Acc. 47.
" (Geopsittacus) III P. 106.
" (Gyps) II Vul. 6.
" (Ieracidea) II Fal. 36.
" (Laroides) VI L. 15.
" (Larus) " " 15, 22.
" (Numenius) V Sc. 85.
" (Podiceps) VI U. 38.
" (Recurvirostra) V Sc. 104.
" (Rhynchaea) " " 18.
" (Vultur fulvus) II Vul. 6; II Acc. 140.
occipitalis (Dendrocitta) I Cor. 75.
" (Falco) II Ass. 1.
" (Glaucopis) I Cor. 75.
" (Podiceps) VI U. 41.
" (Poliocephalus) " " 41.
" (Psilorhinus) I Cor. 69.
" (Ptilopus) IV Col. 35.
" (Ramphiculus) " " 35.
" (Spizaëtus) II Ass. 1; II Acc. 51.
" (Strix) II Str. 36.
" (Todirhamphus) III Al. 32.
" (Vultur) II Vul. 8; II Acc. 141.
oceanica (Carpophaga) IV Col. 87.
" (Columba) " " 97.
" (Gambetta) V Sc. 74.
" (Oceanites wilsoni) VI Proc. 6.
" (Procellaria) " " 6.
oceanicus (Haematopus niger) IV Cur. 75.
" (Totanus) V Sc. 74.
Oceanites wilsoni VI Proc. 6.
" " oceanica " " 6.
Oceanodroma furcata " " 3.
" orientalis " " 3.
ocellata (Leipoa) VIII Ti. 83.
ocellatum (Syrnium) II Str. 21.
ocellatus (Erythroscelus) V Sc. 64.
ochracea (Noctua) II Noc. 22.
ochrocephalus (Milvago) II Pol. 5.
" (Psittacus) III P. 55.
ochrogaster (Ptilopus) IV Col. 40.
ochropterus (Psittacus) III P. 55.
ochropus (Helodromus) V Sc. 70.
" (Totanus) V Sc. 70.
" (Tringa) V Sc. 70, 73.
ochropygia (Carpophaga) IV Col. 91.
ochrurus (Psittacus) III P. 70.
Ochthodromus columboides IV Cur. 39.
" montanus " " 38.
" wilsonius " " 30.
ocreata (Ephialtes) II Oti. 26.
Octopteryx guira I Cuc. 43.
octosetosus (Mergus) VI A. 6.
ocularis (Conurus) III P. R. 5.
oculea (Gallinula) V Ra. 20.
" (Rallina) " " 20.
oculeus (Canirallus) " " 20.
Ocydromus " " 72.
Ocydromus australis " " 73.
" brachypterus " " 73.
" earli " " 73.
" troglodytes " " 73.
Ocyphaps lophotes IV Col. 156.
Oedicnemus IV Cur. 18.
Oedicnemus affinis " " 21.
" americanus " " 19.
" bistriatus " " 19.
" capensis " " 21.
" crepitans " " 20.
" europaeus " " 20.
" frenatus " " 18.
" giganteus " " 22.
" grallarius " " 18.
" longipes " " 18.
" maculosus " " 21.
" magnirostris " " 22.
" mexicanus " " 19.
" recurvirostris " " 23.
" senegalensis " " 20.
" superciliaris " " 19.
" vocifer " " 19.
Oenas capensis IV Col. 145.
" (Columba) " " 65.
ohula (Ardea) V Ar. 15.
" (Garzetta) " " 15.
Oidemia americana VI A. 19.
" bimaculata " " 17.
" nigra " " 18.
" patachonica " " 13.
" velvetina " " 17.
Oie des îles Malouines VI A. 99.
Oies-canards " " 84.
" -renards " " 94.
okeni (Charadrius) IV Cur. 29.
olax (Columba) IV Col. 56.
" (Osmotreron) " " 57.
" (Treron) " " 56.
" (Vinago) " " 56.

olivacea (Amaurornis) V Ra. 43.
" (Gallinula) " " 43.
" (Hagedashia) V I. 9.
" (Ibis) " " 9.
" (Ortygometra) V Ra. 34.
olivaceus (Rallus) " " 34.
Olor americanus VI A. 82.
" (Anas) " " 78.
" buccinator " " 83.
" coscoroba " " 83.
" (Cygnus) " " 78, 81, 82.
" minor " " 82.
" musicus " " 81.
Ombria psittacula VI U. 24.
Omeotreron batilda IV Col. 35.
omnicolor (Alcedo) III Al. 27; III Al.R.18.
" (Dacelo) " " 27.
" (Psittacus) III P. 96.
Onocrotalus fuscus VI Pe. 28.
" minor (Pelecanus) " " 30.
" (Pelecanus) " " 30.
" thagus " " 28.
oapa (Columba) IV Col. 15.
" (Kurotreron) " " 15.
oorti (Bucco) I Bucc. 21.
" (Megalaima) " " 21.
Opaëthus buffonii I Cuc. 76.
" erythrolophus " " 75.
" persa " " 77.
ophiophaga (Ictinia) II Mil. 10.
Opisthocomus I Cuc. 81.
Opisthocomus cristatus " " 81.
optatus (Cuculus) " " 8.
ordii (Falcinellus) V I. 4.
" (Ibis) " " 5.
Oreopeleia violacea IV Col. 165.
Oreophilus V Sc. 78.
Oreophilus ruficollis IV Cur. 47.
" totanirostris " " 47.
organicum (Gymnorhina) I Cor. 126.
orientalis (Ardea) V Ar. 12.
" (Bubo) II Oti. 12; II Noc. 5.
" (Cerorhina) VI U. 26.
" (Charadrius auratus) IV Cur. 50.
" (Cladorhynchus) V Sc. 108.
" (Columba) IV Col 118.
" (Coracias) I Cor. 139.
" (Cuculus) I Cuc. 16.
" (Eudynamis) I Cuc. 17, 19.
" (Eurystomus) I Cor. 139.
" (Falco) II Acc. 32.
" (Gallinula) V Ra. 48.
" (Glareola) IV Cur. 16, 17.
" (Haematopus) " " 70.
" indica (Grus) V Ra. 3.
" (Mergus) VI A. 3.
" minor (Bubo) II Oti. 13; II Noc. 5.
" (Oceanodroma) VI Proc. 3.
" (Podiceps) VI U. 40.
" (Procellaria) VI Proc. 3.
" (Rhynchaea) V Sc. 17.
" (Rhynchops) VI Ster. 40.
orientalis (Spilornis) II Acc. 113.
" (Sternula) VI Ster. 21.
" (Strix) II Oti. 12; II Str. 21.
" (Tachydromus) IV Cur. 13.
" (Turtur) IV Col. 118.
" (Vultur fulvus) II Vul. 6; II Acc. 140.
Oriolus I Cor. 99.
Oriolus acrorhynchus " " 104.
" affinis " " 110.
" ardens " " 115.
" auratus " " 101.
" aureus " " 101.
" baruffiii " " 109.
" bengalensis " " 106.
" bicolor " " 101.
" brachyrhynchus " " 108.
" broderipi " " 106.
" buruensis " " 113.
" ceylanensis " " 107.
" chinensis " " 102.
" cochinchinensis " " 102.
" flavicinctus " " 110.
" flaviventris " " 116.
" forsteni " " 112.
" frontalis " " 105.
" galbula " " 99.
" galbuloides " " 101.
" indicus " " 102.
" kundoo " " 101.
" larvatus " " 107.
" maderaspatanus " " 106.
" maxillaris " " 115.
" melanocephalus " " 106.
" melanotis " " 111.
" moloxita " " 108.
" phaiochromus " " 114.
" regens " " 99.
" regius " " 99.
" striatus " " 112.
" timoriensis " " 115.
" traillii " " 114.
" variegatus " " 110.
" virescens " " 111.
" viridis " " 110,115.
" xanthonotus " " 109.
ornata (Cissa) " " 69.
" (Cyanocitta) " " 47.
" (Pica) " " 69.
ornatus (Cyanocorax) " " 47.
" (Falco) II Ass. 2.
" (Garrulus) I Cor. 60.
" (Merops) III Me. 4.
" (Phoenicophaës) I Cuc. 51.
" (Psittacus) III P. 112.
" (Ptilopus) IV Col. 19.
" (Spizaetus) II Ass. 2; II Acc 52, 59.
" (Trichoglossus) III P. 112; III P. R. 49.
orru (Corvus) I Cor. 20, 22.
ortygoides (Erismatura) VI A. 9.
Ortygometra carolina V Ra. 28.
" dimidiata " " 27.

Ortygometra fasciata V Ra. 30.
„ fusca „ „ 21.
„ jamaicensis „ „ 36.
„ novaeboracensis „ „ 26.
„ olivacea „ „ 34.
„ porzana „ „ 29.
„ superciliosa „ „ 32.
oscitans (Anastomus) V Cic. 15.
osculans (Chalsites) I Cuc. 34.
Osmotreron axillaris IV Col. 52, 53.
„ bicincta „ „ 51.
„ flavogularis „ „ 52.
„ malabarica „ „ 52.
„ olax „ „ 57.
„ phayrei „ „ 52.
„ vernans „ „ 50.
„ virens „ „ 23.
ossifraga (Falco) II Aq. 11.
„ gigantea VI Proc. 18.
„ (Procellaria) „ „ 18.
ossifragus (Corvus) I Cor. 24, 32, 33.
„ (Falco) II Aq. 12.
Ostralega leucopus IV Cur. 74.
ostralegus (Haematopus) „ „ 70.
Oti II Oti. 1; II Noc. 1.
Otides IV Cur. 1.
Otidiphaps IV Col. 170.
Otidiphaps nobilis „ „ 170.
Otis IV Cur. 1.
Otis abyssinica „ „ 8.
„ afra „ „ 6.
„ arabs „ „ 8.
„ aurita „ „ 10.
„ australasiana „ „ 9.
„ australis „ „ 9.
„ barrowii „ „ 5.
„ bengalensis „ „ 10.
„ caffra „ „ 7.
„ cana „ „ 4.
„ coerulescens „ „ 4.
„ colii „ „ 7.
„ cristata „ „ 8.
„ denhami „ „ 7.
„ edwardii „ „ 8.
„ ferox „ „ 4.
„ fulva „ „ 10.
„ hartlaubii „ „ 9.
„ himalayana „ „ 10.
„ hubara „ „ 3.
„ kori „ „ 8.
„ ludwigii „ „ 7.
„ lussoniensis „ „ 8.
„ macqueenii „ „ 3.
„ melanogaster „ „ 9.
„ nigriceps „ „ 8.
„ nuba „ „ 5.
„ rhaad „ „ 4, 5.
„ ruficollis „ „ 7.
„ ruficrista „ „ 5.
„ scolopacea „ „ 5.
„ semitorquata „ „ 4.
„ senegalensis „ „ 5.
„ stanleyi „ „ 7.
Otis tarda IV Cur. 2.
„ tetrax „ „ 2.
„ torquata „ „ 4.
„ verreauxii „ „ 4.
„ vigorsii „ „ 5.
Otodytes auritus VI U. 40.
Otogyps auricularis II Vul. 9.
Otus II Oti. 1; II Noc. 1.
Otus abyssinicus II Oti. 5.
„ americanus „ „ 2.
„ ascalaphus „ „ 8.
„ bengalensis „ „ 8.
„ brachyotus „ „ 3; II Noc. 3.
„ brasiliensis „ „ 21.
„ breviauris „ „ 4.
„ capensis „ „ 5; II Noc. 3.
„ capensis major „ „ 3.
„ galopagoensis II Oti. 3.
„ japonicus „ „ 20.
„ magicus „ „ 22.
„ mantis „ „ 25.
„ melanopis „ „ 6.
„ mexicanus „ „ 2.
„ midas „ „ 2.
„ semitorques „ „ 23.
„ siguapa „ „ 6.
„ (Strix) „ „ 1.
„ stygius „ „ 6; II Noc. 4.
„ vulgaris „ „ 1; „ „ 1.
„ „ americanus II Oti. 2.
„ wilsonianus „ „ 2.
owenii (Apteryx) IV St. 8.
oxycerca (Cercibis) V I. 8.
„ (Ibis) „ „ 8.
Oxyechus vociferus IV Cur. 23.
Oxylophus afer I Cuc. 44.
„ edolius „ „ 45.
oxyptera (Anas) VI A. 59.
oxypterus (Buteo) II Acc. 107.
oxyura (Anas) VI A. 38.
„ australis „ „ 11.
„ (Columba) IV Col. 62.
„ maccao VI A. 10.
„ (Treron) IV Col. 62.
oxyurus (Sphenurus) „ „ 62.

P.

pachyrhyncha (Ara) III P. 11.
„ (Rhynchopsitta) „ „ 11.
pachyrhynchus (Conurus) III P. 11; III P. R. 3.
„ (Eudyptes) VI U. 6.
„ (Macrocercus) III P. 11.
„ (Poeocephalus) „ „ 34.
pacifica (Ardea) V Ar. 7.
„ (Carpophaga) IV Col. 87.
„ (Columba) „ „ 87.
„ (Coracias) I Cor. 139.
„ (Procellaria) VI Proc. 22.
„ (Procellaria glacialis) VI Proc. 22.
pacificus (Colymbus) VI U. 31.
„ (Gabianus) VI L. 7.

pacificus (Galgulus) I Cor. 139.
" (Larus) VI L. 7.
" (Psittacus) III P. 105, 106, 114.
pagodarum (Ciccaba) II Str. 22.
" (Strix) " " 22.
Pagodroma nivea major VI Proc. 15.
" " minor " " 16.
Pagophila brachytarsa VI L. 6.
" eburnea " " 6.
" nivea " " 6.
Palaeornis III P. 76; III P. R. 35.
Palaeornis affinis " " 36.
" alexandri III P. 76; III P.R.35.
" anthopeplus III P. 99.
" barrabandi " " 98.
" bengalensis " " 81.
" borneus " " 85.
" calthropae IIIP.83; IIIP.R.36.
" columboides " " 83; " " 35.
" cyanocephalus " " 35.
" derbyanus III P. 85.
" docilis III P. R. 35.
" erythrogenys III P. 84.
" fasciatus III P. R. 36.
" gironieri III P. 83.
" hodgsonii III P. R. 35.
" javanicus III P. 79, 86; III P. R. 36.
" layardi III P. R. 35.
" longicaudus III P. 84; III P. R. 36.
" luciani III P. 84; III P. R. 36.
" malaccensis III P. 84.
" melanorhynchus " " 83, 85.
" melanura " " 99.
" modestus " " 84.
" parvirostris IIIP.80; IIIP.R.35.
" purpureus " " 35.
" rosa III P. 81; " " 35.
" rosaceus " " 98.
" schisticeps " " 82; IIIP.R.35.
" torquatus " " 80, 84; III P. R. 35.
" vibrisca III P. 79, 85; III P. R. 36.
" viridimystax III P. 84.
Palamedea V Ra. 72.
Palamedea chavaria " " 72.
" cornuta " " 72.
" derbyana " " 72.
pallasii (Glareola) IV Cur. 15.
" (Ichthyaëtus) VI L. 34.
pallescens (Tinamus) VIII Ti. 22.
palliata (Leucopternis) II Acc. 103.
palliatus (Falco) II Per. 9.
" (Haematopus) IV Cur. 74.
palliceps (Platycercus) III P. 95; III P. R 39.
pallida (Columba) I Cuc. 26.
" (Dendrocitta) I Cor. 77.
pallidus (Circus) II Cir. 4.
" (Cuculus) I Cuc. 26.
" (Nisaëtus) II Ass. 6.
pallidus (Vanellus) IV Cur. 58.
palliolatus (Cuculus) I Cuc. 34.
" (Misocalius) " " 34.
pallipes (Anser) VI A. 110.
palmarum (Corvus) I Cor. 25.
palmatus (Himantopus) V Sc. 108.
palpebrata (Aptenodytes) VI U. 11.
Paludicola nipalensis III Pit. 2.
paludosa (Gallinago) V Sc. 8.
" (Scolopax) " " 7, 8.
" (Xylocota) " " 8.
paludosus (Anas) VI A. 112.
palumbarius (Astur) II Ass. 16; II Acc. 61.
" (Falco) " " 16.
palumbus (Columba) IV Col. 66.
" elphinstonii " " 70.
" himalayana (Columba) " " 66.
" pulchricollis " " 71.
" torquatus " " 66.
" torringtonii " " 71.
" viridis madagascariensis " " 48.
palustris (Brachyotus) II Oti. 3.
" (Falco) II Cir. 8.
" (Porzana) V Ra. 30.
" (Scolopax) V Sc. 7.
pampusan (Leptopila) IV Col. 162.
pampusana (Columba) " " 162.
" rousseau " " 162.
" xanthura " " 162.
panaya (Sterna) VI Ster. 26.
panayensis (Buceros) I Buc. 11.
" (Colius) I Cuc. 80.
" (Sterna) VI Ster. 26.
Pandion II Aq. 21.
Pandion americanus " " 22.
" carolinensis " " 22.
" haliaëtus II Aq. 22; II Acc. 123.
" humilis " " 18.
" leucocephalus II Acc. 123.
pannosa (Herodias) V Ar. 25.
papa (Cathartes) II Vul. 1; II Acc. 138.
" (Vultur) " " 1.
Papagai à tête aurore III P. 18.
papillatus (Geronticus) V I. 11.
papillosa (Ibis) " " 11.
" (Inocotis) " " 11.
papua (Aptenodytes) VI U. 5.
" (Spheniscus) " " 5.
papuana (Paradisea) I Cor. 82.
papuanus (Casuarius) IV St. 11.
papuensis (Charmosina) III P. 130.
" (Cinnamolegus) I Cor. 94.
" (Coracias) " " 138.
" (Lorius) III P. 130; III P. R. 53.
" (Nanodes) " " 53.
" (Pitta) III Pit. R. 6.
" (Psittacus) III P. 130.
" (Upupa) I Cor. 94.
Paradisea " " 78.
Paradisea alba " " 95.
" apoda " " 79.
" (Ardea) V Ra. 6.
" atra I Cor. 96.

Paradisea aurea I Cor. 92, 98.
„ bartlettii „ „ 82.
„ calva „ „ 87.
„ cirrhata „ „ 86.
„ (Grus) V Ra. 6.
„ magnifica I Cor. 86.
„ major „ „ 79.
„ minor „ „ 82.
„ nigra „ „ 94.
„ papuana „ „ 82.
„ penicillata „ „ 92.
„ regia „ „ 88.
„ rex „ „ 88.
„ rubra „ „ 84.
„ sanguinea „ „ 84.
„ sexpennis „ „ 92.
„ sexsetacea „ „ 92.
„ speciosa „ „ 86.
„ (Sterna) VI Ster. 15, 24.
„ superba I Cor. 96.
„ (Thalassea) VI Ster. 24.
„ viridis I Cor. 122.
„ wallacei „ „ 91.
„ wallaciana „ „ 79.
„ wilsoni „ „ 87.
Paradiseae „ „ 1, 78.
paradiseus (Anthropoides) V Ra. 6.
„ (Chalybaeus) I Cor. 122.
„ (Craspedophorus) „ „ 96.
„ (Epimachus) „ „ 97.
„ (Geranus) V Ra. 6.
„ (Ptiloris) I Cor. 97.
paraguaiae (Gallinago) V Sc. 11.
„ (Scolopax) „ „ 9, 11.
paraguayae (Gallinago) „ „ 9.
Paralcyon coronata III Al. 38.
„ melanops „ „ 21.
parasitica coprotheres (Lestris) VI L. 47.
„ (Lestris) „ „ 47.
parasiticus (Falco) II Mil. 3.
„ (Larus) VI L. 47.
„ (Stercorarius) „ „ 47.
pardela (Charadrius) IV Cur. 54.
Pardirallus variegatus V Ra. 13.
parotis (Colymbus) VI U. 38.
Parra V Ra. 65.
Parra aenea „ „ 67.
„ africana „ „ 69.
„ albinucha „ „ 70.
„ atrata „ „ 67.
„ atricollis „ „ 70.
„ brasiliensis „ „ 65.
„ capensis „ „ 69.
„ cayennensis IV Cur. 57.
„ chavaria V Ra. 72.
„ chirurgus „ „ 71.
„ cordifera „ „ 66.
„ cristata „ „ 68.
„ cuprea „ „ 67.
„ gallinacea „ „ 68.
„ goensis IV Cur. 68.
„ gymnostoma V Ra. 66.
„ hypomelaena „ „ 65.
Parra indica V Ra. 67.
„ jassana „ „ 66.
„ luzoniensis „ „ 71.
„ melanochloris „ „ 67.
„ nigra „ „ 65.
„ punicea „ „ 66.
„ senegala IV Cur. 68.
„ sinensis V Ra. 71.
„ superciliosa „ „ 67.
„ viridis „ „ 65.
parva (Fulica) „ „ 39.
„ (Gallinula) „ „ 39.
„ (Glaucestes) „ „ 39.
parvifrons (Gallinula) „ „ 45.
parvirostris (Crypturus) VIII Ti. 22.
„ (Palaeornis) III P. 80; III P. R. 35.
„ (Procellaria) VI Proc. 11.
„ (Tringa) V Sc. 79.
parvulus (Anous) VI Ster. 38.
„ (Plyctolophus) III P. 137.
parvus (Bucco) I Bucc. 24, 40, 41.
„ (Colymbus) VI U. 43.
„ (Dysporus) VI Pe. 41.
„ (Pelecanus) „ „ 41.
„ (Phoenicopterus) VI A. 116.
„ (Porphyrio) V Ra. 39.
„ (Rallus) „ „ 31.
passerina (Athene) II Str. 41.
„ (Chamaepelia) IV Col. 135.
„ (Columba) „ „ 134.
„ (Noctua) II Str. 41; II Noc. 30.
„ (Peristera) IV Col. 135.
„ (Strix) II Str. 8, 28, 41.
passerinoides (Strix) II Str. 31.
passerinum (Glaucidium) „ „ 41.
passerinus (Cacomantis) I Cuc. 27.
„ (Cuculus) „ „ 27.
„ (Psittaculus) III P. 30, 31, 69; III P. R. 8.
„ (Psittacus) III P. 30.
pastinator (Corvus) I Cor. 25.
pastor (Charadrius) IV Cur. 34.
„ traillii I Cor. 114.
patachonica (Aptenodytes) VI U. 3.
„ (Oidemia) VI A. 13.
patagiatus (Podiceps) VI U. 34.
Patagioenas corensis IV Col. 68.
Patagonian pinguin VI U. 3.
patagonica (Aptenodytes) „ „ 3.
patagonicus (Cyanolyseos) III P. 9.
patagonicus (Spheniscus) VI U. 3.
patagonus (Psittacus) III P. 9.
patruelis (Ardea) V Ar. 43.
„ (Butorides) V Ar. 43.
paturi (Anas) VI A. 61.
paulina (Carpophaga) IV Col. 84.
„ (Columba) „ „ 84.
paulinae (Musophaga) I Cuc. 75.
pavonina (Ardea) V Ra. 7.
„ (Balearica) „ „ 7.
„ (Grus) „ „ 7.
pavua (Conurus) III P. 12.

pavua (Psittacus) III P. 12.
paykulli (Scolopax) V Sc. 26.
pealii (Egretta) V Ar. 21.
pêcheur (Faucon) II Per. 6.
pecquetii (Dasyptilus) III P. 157.
" (Nestor) III P. 157; III P. R. 70.
" (Psittacus) III P. 157.
pectinicauda (Scolopax) V Sc. 13.
pectoralis (Astur) II Ass. 18; II Acc. 63.
" (Charadrius) IV Cur. 34, 53, 65.
" (Charmosyna) III P. 130.
" (Cladorhynchus) V Sc. 108.
" (Columba) IV Col. 23.
" (Corvus) I Cor. 5.
" (Falco) II Ass. 18.
" (Gracula) I Cor. 98.
" (Himantopus) V Sc. 108.
" (Hiracococcyx) I Cuc 15.
" (Leptorhynchus) V Sc. 108.
" (Lewinia) V Ra. 12.
" (Lobivanellus) IV Cur. 65.
" (Peristera) IV Col. 162.
" (Ptilopus) " " 23.
" (Rallus) V Ra. 12, 23.
" (Sarciophorus) IV Cur. 65.
" (Tringa) V Sc. 39.
" (Xiphidiorhynchus) V Sc. 108.
pecuarius (Charadrius) IV Cur. 34.
" (Leucopolius) " " 34.
Pedeaithyia subcristata VI U. 38.
pelagica lugubris (Procellaria) VI Proc. 7.
" (Procellaria) " " 7.
pelagicus (Dominicanus) VI L. 13.
" (Haliaetus) II Aq. 14; II Acc. 117.
Pelagodroma fregata VI Proc. 5.
Pelargopis gouldii III Al. R. 7.
Pelargopsis burmanica " " 7.
" floresiana " " 7.
" fraseri " " 7.
" malaccensis " " 7.
Pelecani VI Pe. 1.
Pelecanoides berardi VI Proc. 38.
" (Pelecanopus) VI Ster. 9.
" (Sterna) " " 9.
" urinatrix VI Proc. 37.
Polecanopus bergii VI Ster. 7, 11.
" nigripennis " " 9.
" pelecanoides " " 9.
" velox " " 11.
Pelecanus VI Pe. 27.
Pelecanus africanus " " 15.
" aquilus " " 2.
" bassanus " " 37.
" brevirostris " " 30.
" capensis " " 19.
" carbo " " 7.
" carunculatus " " 20.
" cirrhatus " " 20.
" conspicillatus " " 36.
" crispus " " 32.
" cristatus " " 18.
" erythrorhynchus " " 35.
" fiber " " 41.
Pelecanus fuscus VI Pe. 28.
" graculus " " 18.
" magellanicus " " 21.
" minor " " 3, 30.
" mitratus " " 30.
" onocrotalus " " 30.
" onocrotalus minor " " 30.
" parvus " " 41.
" philippensis " " 33.
" piscator " " 40.
" pygmaeus " " 13.
" rufescens " " 33.
" sula " " 41.
" trachyrhynchus " " 35.
" urile " " 17.
" varius " " 20.
" violaceus " " 17.
pelenope (Anas) VI A. 44.
peli (Gymnobucco) I Bucc. 49.
Pelidna cinclus V Sc. 33, 42.
" maculata " " 39.
" schinzii " " 42.
" subarquata " " 31.
pelii (Scotopelia) II Str. 23.
" (Strix) " " 23.
" (Ulula) " " 23; II Noc. 21.
Pelionetta bimaculata VI A. 17.
" perspicillata " " 16.
" trowbridgii " " 16.
pelzelni (Podiceps) VI U. 43.
penelope (Mareca) VI A. 44.
" mexicana " " 87.
Penguin à pieds noirs VI U. 10.
penicillata (Paradisea) I Cor. 92.
penicillatus (Graculus) VI Pe. 18.
" (Urile) " " 18.
pennantii (Aptenodytes) VI U. 3.
" (Platycercus) III P. 96; III P. R. 40.
" (Psittacus) III P. 96.
" (Spheniscus) VI U. 3.
pennata (Aquila) II Aq. 8; II Acc. 116.
pennatus (Falco) " " 8.
" (Scops) II Noc. 14.
pennsylvanicus (Buteo) II But. 20; II Acc. 109.
" (Falco) II But. 20; II Ass. 30.
pentheria (Peristera) IV Col. 142.
" (Zenaida) " " 142.
pentlandii (Eudromia) VIII Ti. 47.
" (Tinamotis) " " 47.
peposaca (Anas) VI A. 31.
" (Fuligula) " " 31.
" (Metopiana) " " 32.
percnopsis (Poliornis) II But. 23.
percnopterus (Cathartes) II Vul. 5; II Acc. 139.
" (Neophron) II Vul. 5; II Acc. 139.
" (Vultur) II Vul. 5.
perdicaria (Nothura) VIII Ti. 40.
perdicarius (Crypturus) " " 40.
" (Rhynchotus) " " 40.

Perdix brasiliensis VIII Ti. 13.
" hudsonica V Ra. 26.
" major VIII Ti. 13.
Perdiz de copeta VIII Ti. 49.
peregrina (Ibis) V I. 3.
" (Scolopax) V Sc. 4.
peregrinator (Falco) II Fal. 5.
peregrinoides (Falco) " " 4, 15.
peregrinus (Falcinellus) V I. 3.
" (Falco) II Fal. 1, 4.
Perisoreus canadensis I Cor. 65.
" infaustus " " 65.
Peristera IV Col. 134.
Peristera afra " " 144.
" campestris " " 138.
" capensis " " 145.
" carolinensis " " 142.
" chalcospilos " " 144.
" cinerea " " 138.
" cruziana " " 137.
" elegans " " 154.
" gallopagoensis " " 140.
" geoffroyi " " 139.
" griseola " " 135.
" lansbergii " " 139.
" maculata " " 141.
" migratoria " " 115, 142.
" passerina " " 135.
" pectoralis " " 162.
" pentheria " " 142.
" picui " " 137.
" puella " " 134.
" ruficauda " " 141.
" rufigula " " 157.
" rufipennis " " 136.
" stephani " " 151.
" talpacoti " " 136.
" tympanistria " " 143.
" zenaida " " 140.
perlata capensis (Noctua) II Str. 37; II Noc. 30.
" (Carpophaga) IV Col. 17.
" (Columba) " " 17.
" (Megaloprepia) " " 17.
" (Noctua) II Str. 36; II Noc. 30.
" (Strix) " " 5, 36.
perlatus (Nisus) II Acc. 73.
" (Ptilinopus) IV Col. 17.
" (Ptilopus) " " 17.
Pernes II Per. 1; II Acc. 131.
Pernis " " 1; " " 131.
Pernis apivorus II But. 5; II Per. 1; II Acc. 131.
" cristatus II Per. 2; II Acc. 131.
" longicauda " " 132.
" ruficollis II Per. 2.
" tachardus II Acc. 131.
" torquata II Per. 2.
peronii (Charadrius) IV Cur. 33.
perousii (Ptilinopus) IV Col. 10.
" (Ptilopus) " " 10.
Perroquet à cou rouge III P. 50.
perroquets (Pigeons-) IV Col. 44.
Perruche à collier III P. 76.
" coulacissi " " 130.
" de Gingi " " 76.
persa (Corythaix) I Cuc. 76.
" (Cuculus) " " 76.
" (Musophaga) " " 76.
" (Opaëthus) " " 77.
persica (Merops) III Me. 2.
persicus (Charadrius) IV Cur. 60.
personata (Anas) VI A. 90.
" (Barita) I Cor. 127.
" (Chizaerhis) I Cuc. 78.
" (Heliornis) VI U. 49.
" (Melagavia) VI L. 35.
" (Monasa) I Bucc. 89.
" (Musophaga) I Cuc. 78.
" (Podica) VI U. 49.
" (Strix) II Str. 6, 17; II Noc. 17.
" (Sula) VI Pe. 39.
personatus aruensis (Eclectus) III P. 43; III P. R. 18.
" (Chroicocephalus) VI L. 35.
" (Eclectus) III P. 42; III P. R. 18.
" (Larus) VI L. 35, 44.
" (Lobivanellus) IV Cur. 66.
" (Platycercus) III P. 88; III P. R. 36.
" (Pogonias) I Bucc. 4.
" (Psittacus) III P. 42, 43.
perspicillaris (Nisus) II Ass. 30.
perspicillata (Anas) VI A. 16
" (Carpophaga) IV Col. 89, 90.
" (Columba) " " 89.
" (Fuligula) VI A. 16.
" (Pelionetta) " " 16.
" (Strix) II Str. 17.
perspicillatus (Graculus) VI Pe. 17.
" (Phalacrocorax) " " 17.
pertinax (Conurus) III P. 20; III P. R. 5.
" (Psittacus) " " 20.
peruana (Monasa) I Bucc. 89.
peruviana (Xanthoura) I Cor. 53.
peruvianus (Bucco) I Bucc. 55.
" (Corvus) I Cor. 53.
Petit barbu I Bucc. 24.
" (Coucou de l'île Panay) I Cuc. 21.
" lory de Gueby III P. 125.
" pluvier à collier de l'île de Luçon IV Cur. 28.
" râle de Cayenne V Ra. 31.
" tamatia à plastron noir I Bucc. 78
" vasa III P. 37.
Petits-butors V Ar. 37.
" -hérons " " 9.
petrificatus (Ereunetes) V Sc. 55.
petrophila (Euphema) III P. 104; III P. R. 42.
petzii (Conurus) III P. 20; III P. R. 5.
" (Psittacus) III P. 20.
peyrousei (Rallus) V Ra. 31.
Pezophaps IV St. 4.
Pezophaps broeckei IV St. 4.

Pezophaps herbertii IV St. 4.
" solitarius " " 4.
pezoporos (Aquila) II Pol. 6.
Pezoporus III P. 106.
Pezoporus formosus " " 106.
Pezus japura VIII Ti. 21, 28.
" serratus " " 13.
" zabélé " " 33.
Phaenorhina goliath IV Col. 95.
Phaeocephalus citreocapillus III P. 35.
" citrineocapillus III P. R. 9.
" xanthopterus " " 10.
phaeonotus (Stictoenas) IV Col. 73.
phaeopus (Numenius) V Sc. 93.
" vulgaris " " 93.
Phaëton VI Pe. 43.
Phaëton aethereus " " 43.
" candidus " " 43.
" demersus VI U. 8, 10.
" flavirostris VI Pe. 43.
" phoenicurus " " 44.
" rubricauda " " 44.
Phaetusa galericulata VI Ster. 7.
" magnirostris " " 12.
phaiocephalus (Corvus) I Cor. 3.
phaiochromus (Oriolus) " " 114.
phaioleucos (Monasa) I Bucc. 87.
phaiostictica (Megalaima) " " 36.
phaiosticticus (Megalaima) " " 36.
Phalacotreron abyssinica IV Col. 48.
" calva " " 47.
" crassirostris " " 47.
" delalandii " " 49.
" nudirostris " " 47.
Phalacrocorax brevirostris VI Pe. 16.
" capensis " " 19.
" capillatus " " 8.
" carbo " " 7.
" carbo medius " " 8.
" carbo novae hollandiae VI Pe. 8.
" carbo sinensis VI Pe. 8.
" carboides " " 8.
" cincinnatus " " 22.
" dilophus " " 22.
" floridanus " " 23.
" hypoleucus " " 20.
" leucogaster " " 20.
" lucidus " " 12.
" macrorhynchus " " 8.
" medius " " 8.
" melanogaster " " 12.
" perspicillatus " " 17.
" sulcirostris " " 13.
" townssendii " " 23.
Phalaenopsis infuscata II Noc. 29.
" jardinii " " 29.
" leucolaima " " 29.
Phalaria gigantea V Ra. 59.
Phalaropus V Sc. 57.
Phalaropus angustirostris " " 58.
" australis " " 58.
" cinereus " " 58.
Phalaropus fimbriatus V Sc. 60.
" frenatus " " 60.
" fulicarius " " 58.
" hyperboreus " " 58.
" lobatus " " 58, 60.
" platyrhynchus " " 58.
" rufescens " " 58.
" rufus " " 58.
" stenodactylus " " 60.
" wilsonii " " 60.
Phalcoboenus montanus II Pol. 4.
Phaleris camtschatica VI U. 25.
" cerorhyncha " " 26.
" cristatella " " 25.
" cristatellus " " 25.
" microceros " " 23.
" psittacula " " 24.
" pusillus " " 23.
" superciliosa " " 25.
Phapes IV Col. 153.
Phapitreron amethystina " " 80.
" leucotis " " 79.
Phaps " " 153.
Phaps chalcoptera " " 154.
" elegans " " 154.
" histrionica " " 154.
" lophotes " " 156.
" plumifera " " 155.
" scripta " " 155.
" smithii " " 155.
pharaonica (Ardea) V Ar. 8.
phasianella (Columba) IV Col 108.
" (Macropygia) " " 108.
phasianellus (Coccyzus) I Cuc. 41.
" (Diplopterus) " " 41.
" (Dromococcyx) " " 41.
" (Geococcyx) " " 41.
" (Macropus) " " 41.
phasianinus (Centropus) " " 63.
Phasianurus vigorsii VI A. 55.
Phasianus africanus I Cuc. 79.
" (Centropus) " " 63.
" (Coridonyx) " " 63.
" cristatus " " 81.
" mexicanus " " 41.
" (Polophilus) " " 63.
phayrei (Osmotreron) IV Col. 52.
phigy (Lorius) III P. 116.
" (Psittacus) " " 116.
philadelphia (Sterna) VI L. 41.
philadelphiae (Chroicocephalus) " " 41.
Philedon buruensis I Cor. 113.
philippense (Syrnium) II Oti. 14.
philippensis (Ardea) V Ar. 56.
" (Bubo) II Oti. 14; II Noc. 5.
" (Bucco) I Bucc. 24, 27.
" (Centropus) I Cuc. 66.
" (Ceyx) III Al. R. 11.
" (Corvus) III Pit. 2.
" fuscus (Rallus) V Ra. 20.
" (Hypotaenidia) " " 23.
" (Loriculus) III P. 130; III P. R. 59.

philippensis (Noctua) II Noc. 22.
" (Noctua hirsuta) II Str. 26; II Noc. 22.
" (Pelecanus) VI Pe. 33.
" (Pitta) III Pit. 2; III Pit. R. 5.
" (Psittacula) III P. 130.
" (Rallus) V Ra. 23, 24.
" (Xantholaema) I Bucc. 24.
philippina (Sterna) VI Ster. 36.
philippinarum (Cacatua) III P. 144; III P. R. 67.
" (Psittacus) III P. 144.
philippinus (Charadrius) IV Cur. 28.
" (Corvus) I Cor. 22.
" (Merops) III Me. 2.
" (Rallus) V Ra. 24.
Philohela minor V Sc. 3.
Philomachus spinosus IV Cur. 61.
" ventralis " " 61.
Phimosis infuscatus V I. 8.
Phimus giganteus I Cuc. 77.
" violaceus " " 74.
Phlegoenas IV Col. 157.
Phlegoenas cruenta " " 157.
" erythroptera " " 162.
" luzonica " " 157.
" rufigula " " 157.
" stairii " " 162.
" tristigmata " " 158.
Phodilus badius II Str. 23.
Phoebetria fuliginosa VI Proc. 35.
Phoenicophaës I Cuc. 48.
Phoenicophaës aëreus " " 50.
" calorhynchus " " 48.
" chlorophaeus " " 51.
" cumingi " " 51.
" curvirostris " " 49.
" diardi " " 54.
" elongatus " " 55.
" erythrognathus " " 49.
" flavirostris " " 50.
" javanicus " " 55.
" leucogaster " " 53.
" longicaudatus " " 54.
" ornatus " " 51.
" pyrrhocephalus " " 53.
" sirkie " " 56.
" sumatranus " " 53.
" superciliosus " " 51.
" tristis " " 54.
Phoenicophaeus barroti " " 51.
" caniceps " " 52.
" corallirhynchus " " 59.
" lucidus " " 52.
" melanogaster " " 48.
" melanognathus " " 49.
" tricolor " " 49.
" viridirostris " " 52.
" viridirufus " " 49.
" viridis " " 49.
phoenicoptera (Columba) IV Col. 45.
" (Treron) " " 45.
Phoenicopterus VI A. 116.
Phoenicopterus antiquorum " " 116.
" blythii " " 116.
" chilensis " " 117.
" (Crocopus) IV Col. 45.
" erythraeus VI A. 116.
" ignipalliatus " " 117.
" minor " " 116.
" parvus " " 116.
" roseus " " 116.
" ruber VI A. 116, 117.
phoenicopus (Anser) VI A. 112.
phoenicura (Columba) IV Col. 42.
" (Erythra) V Ra. 41.
" (Gallinula) " " 41.
phoenicurus (Conurus) III P. 26; III P. R. 7.
" (Phaëton) VI Pe. 44.
" (Rallus) V Ra. 41.
" rubricauda VI Pe. 44.
Phonygama atra I Cor. 121.
" keraudreni " " 120.
Phonygamia lessonii " " 120.
Phytotoma abyssinica I Bucc. 5.
" tridactyla " " 5.
piapiac (Crypthorhina) I Cor. 78.
Piaya I Cuc. 56.
Piaya brachyptera " " 59.
" cayana " " 57, 58.
" cinnamomeiventris " " 39.
" circe " " 57.
" macrura " " 58.
" mehleri " " 57.
" melanogaster " " 59.
" mexicana " " 57.
" minor " " 59.
" nigricrissa " " 57.
" pluvialis " " 39.
" termophila " " 58.
Pica I Cor. 38.
Pica albicapilla " " 51.
" albiventer " " 39.
" (Alca) VI U. 13.
" bactriana I Cor. 39.
" beecheyi " " 44.
" (Buceros) I Buc. 6.
" bullockii I Cor. 43.
" butanensis " " 39.
" caudata " " 39.
" (Coccystes) I Cuc. 44.
" coerulea I Cor. 46.
" colliei " " 43.
" (Cuculus) I Cuc. 45.
" cyanea I Cor. 41.
" cyanomelas " " 47.
" europaea " " 39.
" formosa " " 43.
" hudsonica " " 39.
" japonica " " 39.
" larvata " " 51.
" mauritanica " " 39, 41.
" megaloptera " " 39.
" melanocephalos I Cor. 42.

Pica melanoleuca I Cor. 39.
" mexicana major " " 25.
" morio " " 44.
" nuttalli " " 39
" ornata " " 69.
" pyrrhoptera " " 131.
" sericea " " 39.
" (Uria) VI U. 16.
" varia I Cor. 39.
picata (Ardea) V Ar. 10.
" (Columba) IV Col. 163.
" (Herodias) V Ar. 10.
" (Leptopila) IV Col. 163.
" (Leucosarcia) " " 163.
Picathartes I Cor. 54.
Picathartes gymnocephalus " " 54.
picatus (Bucco) I Bucc. 78.
" (Cracticus) I Cor. 128.
" (Eudynamis) I Cuc. 19.
" (Falco) II Ase. 10.
" (Haematopus) IV Cur. 73.
picta (Agamia) V Ar. 11.
" (Alcedo) III Al. 16; III Al. R. 8.
" (Anas) VI A. 54, 99.
" (Ispidina) III Al. 16.
" (Rhynchaea) V Sc. 17.
" (Scolopax) " " 4.
picturata (Alcedo) III Al. 16; III Al. R. 8.
" (Columba) IV Col. 129.
picturatus (Turtur) " " 129.
pictus (Anser) VI A. 115.
" (Bucco) I Bucc. 63.
" (Capito) " " 63.
" (Todus) III Al. 16.
picui (Columba) IV Col. 137.
" (Peristera) " " 137.
Picus cafer I Bucc. 65.
" rubricatus " " 65.
pigeon (Purple crowded) IV Col. 15.
Pigeons-perroquets " " 44.
pikei (Sterna) VI Ster. 24.
pileata (Alcedo) III Al. 27.
" (Ardea) V Ar. 36.
" (Dacelo) III Al. 27; III Al. R. 18.
" (Gallinula) V Ra. 17.
" (Psittacula) III P. 30.
" (Sterna) VI Ster. 36.
pileatus (Anous) " " 36.
" (Charadrius) IV Cur. 65.
" (Crypturus) VIII Ti. 24.
" (Cyanocorax) I Cor. 52.
" (Falco) II Ass. 35.
" (Halcyon) III Al. 27.
" (Lobivanellus) IV Cur. 65.
" meserythrus (Crypturus) VIII Ti. 25.
" (Neophron) II Vul. 5; II Acc. 139.
" (Nisus) II Ass. 35, 43; " " 70.
" (Nicticorax) V Ar. 36.
" (Pilherodias) " " 36.
" (Platycercus) III P. 94; III P. R. 39.
" (Psittaculus) " " 30; " " 7.
" (Psittacus) " " 30, 64.
pileatus (Sarciophorus) IV Cur. 65.
" (Tetrao) VIII Ti. 24.
" (Tinamus) " " 25.
" (Vultur) II Vul. 5.
Pilherodias pileatus V Ar. 36.
pilosa (Coracias) I Cor. 135, 137.
pinguin (Patagonian) VI U. 3.
Pinguinaria " " 1.
Pinguinus impennis " " 13.
pinnata (Ardea) V Ar. 49.
pinnatus (Botaurus) " " 49.
pinon (Carpophaga) IV Col. 94.
" jobiensis (Carpophaga) " " 95.
" (Zoenaenas) " " 94.
Pionias fuscicapillus III P. R. 9.
" gerontodes " " 29.
Pionus III P. 60.
Pionus corallirostris " " 61.
" flavifrons " " 35.
" gulielmi " " 34.
" haematotis " " 65.
" melanocephalus " " 63, 64.
" melanotis " " 67.
" siy " " 60.
pirigua (Crotophaga) I Cuc. 43.
pisanus (Cuculus) " " 44.
piscator (Falco) II Per. 6.
" (Pelecanus) VI Pe. 40.
Piscatrix candida " " 40.
" (Sula) " " 40.
Pitta IIIPit. 1; IIIPit. R. 1.
Pitta angolensis " " 12, " " 15.
" atricapilla IIIPit. 2, 3, 4; " " 5.
" atricapilla sanghirana " " 5.
" bangkana III Pit. 3; " " 5.
" baudii " " 5; " " 9.
" bengalensis " " 12; " " 15.
" bosschii " " 14.
" brachyura IIIPit. 11, 12; IIIPit. R. 14.
" celebensis " " 6; " " 10.
" coerulea " " 1; " " 4.
" concinna " " 10; " " 14.
" coronata " " 14.
" crassirostris " " 14.
" cucullata III Pit. 4; " " 5.
" cyanea " " 2; " " 4.
" cyanonota " " 8; " " 13.
" cyanoptera " " 9; " " 15.
" cyanura " " 13; " " 16.
" elegans III Pit. 11, 14; " " 17.
" erythrogaster III Pit. 8; " " 12.
" gigas " " 1.
" granatina " " 5; IIIPit. R. 9.
" guajana " " 16.
" inornata III Pit. 7.
" irena " " 11.
" iris " " 6; IIIPit. R. 16.
" macklotii " " 7; " " 10.
" maculata " " 12.
" malaccensis " " 4, 12; IIIPit. R. 15.
" mathildae " " 10.
" maxima " " 2; IIIPit. R. 4.
" megarhyncha " " 9; " " 16.

Pitta melanocephala III Pit. 4; III Pit. R. 9.
" moluccensis III Pit. R. 15.
" mülleri " " 5.
" nipalensis III Pit 2; III Pit. R. 4.
" novae guineae " " 4; " " 6.
" novae guineae mefoorana " " 8.
" papuensis " " 6.
" philippensis III Pit. 2; " " 5.
" pulih " " 12.
" rosenbergii III Pit. R. 8.
" rubrinucha " " 12.
" rufiventris III Pit. 7; III Pit. R. 12.
" schwaneri " " 14; " " 17.
" simillima " " 13.
" sordida " " 5.
" strepitans III Pit. 10; " " 13.
" venusta " " 13; " " 17
" vigorsii III Pit. 10, 11; " " 15.
pittoides (Atelornis) I Cor. 138.
" (Brachypteracias) " " 138.
Pityriasis gymnocephala " " 130.
pityriopsis (Vinago) IV Col. 47.
placens (Nanodes) III P. 113; III P. R. 50.
placentis (Coriphilus) III P. 113.
" (Psittacus) " " 113.
placida (Geopelia) IV Col. 131.
plagiata (Asturina) II Ase. 1; II Acc. 100.
plagiatus (Buteo) " " 1.
" (Falco) " " 1.
plagosus (Chrysococcyx) I Cuc. 32.
" (Cuculus) " " 33.
Platalea V Cic. 19.
Platalea ajaja " " 24.
" (Anas) VI A. 35.
" chlororhyncha V Cic. 22.
" flavipes " " 24.
" leucorodia " " 19
" luzioniensis " " 22.
" major " " 21.
" melanorhynchos " " 23.
" minor " " 21.
" nudifrons " " 22.
" pygmaea V Sc. 50.
" regia V Cic. 23
" telfairi " " 22.
" tenuirostris " " 22.
Plateibis flavipes " " 24.
platurus (Eclectus) III P. 45; III P. R. 22.
" (Psittacus) " " 45.
Platycercus III P. 76, 87; III P. R. 36.
Platycercus adelaidae IIIP. 97; " " 40.
" amboinensis " " 90; " " 37.
" anna " " 88; " " 36.
" aucklandicus " " 105.
" auriceps " " 106.
" barnardi " " 94; III P.R 39.
" baueri " " 94.
" caledonicus " " 98.
" cornutus " " 95; III P.R. 39.
" cyanopygius III P. R. 37.
" dorsalis III P. 91; III P. R. 37.
" erythropterus III P. 92; III P. R. 38.
Platycercus eximius IIIP 96; IIIP.R.39.
" flaveolus " " 95; " " 39.
" flavigaster " " 98; " " 40.
" flaviventris " " 98.
" haematogaster III P. 102.
" haematonotus " " 101.
" hypophonius III P. 91; III P. R. 38.
" icterotis IIIP.97; IIIP.R.40.
" melanurus " " 98; " " 40.
" multicolor " " 100.
" novae hollandiae III P. 99; III P. R. 40.
" novae zeelandiae III P. 105.
" palliceps IIIP.95; IIIP.R.39.
" pennantii " " 96; " " 40.
" personatus " " 88; " " 36.
" pileatus " " 94; " " 39.
" pulcherrimus III P. 101.
" rosaceus IIIP.98; IIIP.R.40.
" scapulatus " " 89; " " 37.
" semitorquatus III P. 93; III P. R. 39.
" splendens IIIP.88; IIIP.R.36.
" stanleyi " " 97.
" tabuensis " " 88; IIIP.R.36.
" venustus " " 96; " " 40.
" vulneratus " " 92; " " 39.
" xanthogaster III P. 98.
" zonarius III P. 94; III P.R. 39.
platypterus (Sparvius) II But. 20.
platyrhyncha (Tringa) V Sc. 49, 50.
platyrhynchos (Aptenodytes) VI U. 10.
platyrhynchus (Momotus) III Mo. 4.
" (Phalaropus) V Sc. 58.
" (Prionirhynchus) III Mo. 4.
platyura (Scolopax) V Sc. 2.
Plectropterus gambensis VI A. 93.
plicatus (Buceros) I Buc. 2.
Plotus VI Pe. 24.
Plotus anhinga " " 25.
" levaillantii " " 25.
" melanogaster " " 26.
" novae hollandiae " " 26.
" surinamensis VI U. 49.
plumbea (Chloroenas) IV Col. 70.
" (Columba) " " 70.
" (Gallinula) V Ra. 40.
" (Ibis) V I. 9.
" (Ictinia) II Mil. 10; II Acc. 131.
" (Lepidoenas) IV Col. 60
" (Poëcilopteryx) II Mil. 10.
" (Sterna) VI Ster. 29.
" (Strepera) I Cor. 123.
plumbeiceps (Larus) VI L. 36.
" (Leptopila) IV Col. 160.
plumbeiventris (Rallina) V Ra. 17.
" (Rallus) " " 17.
plumbeus (Anous) VI Ster. 38.
" (Aramides) V Ra. 15.
" (Falco) II Mil. 10.
" (Haliaetus) II Aq. 17.
" (Rallus) V Ra. 15.

plumbiceps (Cirrhocephalus) VI L. 36.
plumicollis (Tantalus) V Cic. 17.
plumifera (Egretta) V Ar. 19.
" (Geophaps) IV Col. 155.
" (Herodias) V Ar. 19.
" (Lophophaps) IV Col. 155.
" (Phaps) " " 155.
plumipes (Buteo) II Acc. 106.
plutonia (Anas) VI A. 80.
Pluvialis IV Cur. 48.
Pluvialis apricarius " " 49.
" aurea " " 49.
" (Charadrius) " " 49, 50, 53.
" (Coccygus) I Cuc. 39.
" (Coccyzus) " " 40.
" (Cuculus) " " 39.
" dominicensis IV Cur. 23.
" fulvus " " 50.
" fulvus americanus IV Cur. 53.
" (Hyetornis) I Cuc. 39.
" longipes IV Cur. 50.
" (Piaya) I Cuc. 39.
" (Ptiloloptis) " " 39.
" senegalensis armata IV Cur. 61.
" taïtensis " " 50.
" torquata " " 23.
" torquata minor " " 26.
" varius " " 53.
" virginicus " " 53.
" viridis " " 49.
" xanthocheilus " " 50.
Pluvianellus sociabilis " " 42.
Pluvianus aegyptius " " 14.
" cinereus " " 69.
pluvier à collier de l'île de Luçon (Petit) IV Cur. 28.
Pluviorhynchus mongolus IV Cur. 41.
Plyctocophus leadbeateri III P. 141.
Plyctolophus citrino-cristatus " " 140.
" citrinus " " 137.
" croceus " " 140.
" eos " " 145.
" macrolophus " " 135.
" parvulus " " 137.
Podica personata VI U. 49.
" senegalensis " " 49.
Podiceps " " 33.
Podiceps albicollis " " 42.
" americanus " " 42.
" antarcticus " " 47.
" arcticus " " 36.
" (Ardeola) V Ar. 39.
" auritus VI U. 40.
" australis " " 34.
" bicornis " " 38.
" californicus " " 40.
" calipareus " " 41.
" carolinensis " " 47.
" chilensis " " 41.
" clarkii " " 38.
" (Colymbus) " " 47.
" cooperi " " 34.
" cornutus " " 36.
Podiceps cristatus VI U. 34.
" dominicus " " 47.
" griseigena " " 38.
" gularis " " 43, 45.
" hollböllii " " 38.
" leucopterus " " 38.
" longirostris " " 34.
" major " " 38.
" minor " " 43.
" nestor " " 41.
" nigricollis " " 40.
" noctivagus " " 45.
" novae hollandiae " " 43.
" occidentalis " " 38.
" occipitalis " " 41.
" orientalis " " 40.
" patagiatus " " 34.
" pelzelni " " 43.
" poliocephalus " " 41.
" recurvirostris " " 40.
" rollandii " " 42.
" rubricollis " " 38.
" rufipectus " " 43.
" sclavus " " 36.
" (Sylbeocyclus) " " 47.
" tricolor " " 43, 45.
Podilymbus brevirostris " " 47.
" carolinensis " " 47.
" lineatus " " 47.
Podoa pucherani " " 49.
" senegalensis " " 49.
Poëcilonetta bahamensis VI A. 55.
" erythrorhyncha " " 56.
poecilonotus (Falco) II Ase. 10.
Poëcilopternis erythronotus II But. 12.
" hyemalis " " 20.
" wilsonii " " 20.
Poëcilopteryx plumbea II Mil. 10.
poeciloptila (Ardea) V Ar. 48.
poëcilorhyncha (Anas) VI A. 43.
poecilorhynchus (Buceros) I Buc. 14.
" (Crypthorhina) I Cor. 78.
" (Psittacus) III P. 56.
" (Ptilostomus) I Cor. 78.
poecilurus (Chrysococcyx) I Cuc. 33.
poënsis (Puceros) I Buc. 18.
poensis (Strix) II Noc. 15.
Poeocephalus magnirostris III P. 34.
" pachyrhynchus " " 34.
Pogonia erythromelas I Bucc. 1.
" laevirostris " " 3.
" stephensi " " 7.
" sulcirostris " " 1.
" vieilloti " " 6.
Pogonias bifrenatus " " 10.
" brucei " " 5.
" haematops " " 5.
" hirsutus " " 11.
" major " " 1.
" melanocephalus " " 10.
" melanopterus " " 6.
" minor " " 3.
" personatus " " 4.

Pogonias rolleti I Bucc. 2.
" rubescens " " 6.
" rubrifrons " " 5.
" senegalensis " " 6
" unidentatus " " 7.
Pogonorhamphus " " 1.
Pogonorhynchus " " 1.
Pogonorhynchus abyssinicus " " 5.
" bidentatus " " 3.
" diadematus " " 9.
" dubius " " 1.
" hirsutus " " 11.
" leucocephalus " " 4.
" leucomelas " " 7.
" melanocephalus " " 10.
" melanopterus " " 6.
" rolleti " " 2.
" torquatus " " 4.
" undatus " " 8.
" vieillotii " " 6.
Poicephalus senegalensis III P. 35.
poiocephala (Xema) VI L. 37.
Poiocephalus cryptoxanthus III P. R. 9.
" versteri III P. 36.
poliocephala (Caesarornis) V Ra. 54.
" (Carpophaga) IV Col. 92.
" (Chloëphaga) VI A. 101.
" (Hemiphaga) IV Col. 92.
poliocephalus (Accipiter) II Acc. 88.
" (Anser) VI A. 101.
" (Cuculus) I Cuc. 12.
" nestor VI U. 41.
" (Nisus) II Acc. 88.
" occipitalis VI U. 41.
" (Podiceps) " " 41.
" (Porphyrio) V Ra. 54.
poliocerca (Sterna) VI Ster. 12.
poliocercus (Thalasseus) " " 12.
poliogaster (Cuculus) I Cuc. 26.
" (Falco) II Ass. 35, 43; II Acc. 71.
" (Nisus) " " 43; " " 96.
poliogenys (Buteo) II But. 22; " " 111.
" (Falco) " " 22.
polionotus (Buteo) II Acc. 103.
poliopterus (Circus) II Cir. 6; II Acc. 49.
Poliornis II But. 21.
Poliornis indicus " " 22.
" liventer " " 21.
" percnopsis " " 23.
" pyrrhopterus " " 23.
" teesa " " 22.
polleni (Columba) IV Col. 72.
" (Noctua) II Noc. 25.
" (Stictoenas) IV Col. 72.
pollicaris (Anas) VI A. 95.
Polophilus coeruleus I Cuc. 46.
" phasianus " " 63.
" variegatus " " 63.
" viridis " " 65.
polyagrus (Falco) II Fal. 18.
" (Gennaia) " " 18.
Polybori II Pol. 1.
Polyboroides radiatus II Ass. 54.
Polyboroides typicus II Ass. 55.
Polyborus II Pol. 1; II Acc. 136.
Polyborus australis " " 3; " " 137.
" brasiliensis " " 2; " " 137.
" chimachima " " 5; " " 137.
" chimango " " 6; " " 137.
" hypoleucos II Aq. 18.
" megalopterus II Pol. 4; II Acc. 137.
" vulgaris " " 2.
polychloros (Psittacus) III P. 40.
polychlorus (Eclectus) III P. 40; III P. R. 14.
polycomos (Anser) VI A. 95.
polygrammica (Ulula) II Noc. 19.
polygrammicum (Syrnium) II Str. 14.
polynesiae (Totanus) V Sc. 74
polyocerca (Sylochelidon) VI Ster. 12.
Polyphasia nigra I Cuc. 27.
polysoma (Buteo) II But. 12; II Acc. 109.
Polysticta stelleri VI A. 15
Polysticte quopopa I Bucc. 65.
polyzonoides (Nisus) II Acc. 92.
polyzonus (Falco) II Ass. 46.
" (Nisus) " " 46.
" (Astur) " " 21; II Acc. 65.
pomare (Bruchigavia) VI L. 28.
" (Larus) " " 28, 29.
pomarinus fuscus (Lestris) " " 47.
" (Larus) " " 47.
" (Lestris) " " 47.
" (Stercorarius) " " 47.
pompadura (Treron) IV Col. 52.
pondiceriana (Ardea) V Cic. 15.
pondicerianus (Anastomus) " " 15.
" (Falco) II Aq. 19; II Acc. 119
" (Psittacus) III P. 85, 86.
" (Vultur) II Vul. 8.
porphyraceus (Ptilopus) IV Col. 8.
porphyracra (Columba) " " 8, 15.
porphyrea (Columba) " " 33.
" (Lamprotreron) " " 33.
porphyreocephalus (Nanodes) III P. 115; III P. R. 53.
" (Trichoglossus) III P. 115.
porphyreolopha (Musophaga) I Cuc. 75.
porphyreus (Ptilopus) IV Col. 33.
Porphyrio V Ra. 51, 54.
Porphyrio aegyptiacus " " 54.
" alleni " " 38.
" antiquorum " " 52.
" bellus " " 58.
" caesius " " 52.
" chloronotus " " 54.
" chlorynotus " " 54.
" cinereus " " 32, 34.
" coerulescens IV St. 2.
" erythropus V Ra. 54.
" flavirostra " " 39.
" (Fulica) " " 54, 55.
" (Gallinula) " " 38.
" hyacinthinus " " 52, 54.
" (Hydrornia) " " 38.

Porphyrio indicus V Ra. 53, 55.
" madagascariensis " " 54.
" martinica " " 38.
" melanopterus " " 55.
" melanotus " " 57.
" minor " " 38.
" minutus " " 38.
" neglectus " " 53.
" parvus " " 39.
" poliocephalus " " 54.
" pulverulentus " " 54, 55.
" samoensis " " 56.
" simplex " " 39.
" smaragdinus " " 53, 55.
" smaragnotus " " 53, 54.
" tavoua " " 38.
" veterum " " 52, 53.
" vitiensis " " 55.
porphyrioides (Gallinula) " " 40.
Porphyriops " " 50.
porphyrorus (Psittacus) III P. 68.
Porphyrula martinica V Ra. 38, 39.
portoricensis (Columba) IV Col. 68.
" (Strix) II Oti. 21.
Porzana V Ra. 28.
Porzana albicollis " " 34.
" carolina " " 28.
" cinerea " " 32.
" exilis " " 35.
" flaviventer " " 31.
" fluminea " " 30.
" immaculata " " 36.
" jamaicensis " " 36.
" leucophrys " " 32.
" maruetta " " 29.
" melanophaia " " 35.
" minuta " " 31.
" nigra " " 34.
" (Ortygometra) " " 29.
" palustris " " 30.
" pygmaea " " 30.
" (Rallus) " " 29.
" schomburgkii " " 37.
poucheti (Herodias) V Ra. 22.
Poule rouge au bec de bécasse IV St. 4.
prasinorrhous (Ptilinopus) IV Col. 25.
prasinoscelis (Ardea) V Ar. 33.
pratensis (Crex) V Ra. 25.
pratincola (Glareola) IV Cur. 15.
" (Hirundo) " " 15.
" (Strix) II Str. 5.
prêtrei (Amazona) III P. 59; III P. R. 28.
" (Psittacus) " " 59.
primoli (Sittace) " " 7.
princeps (Dacelo) III Al. 24, III Al. R. 16.
" (Monachalcyon) III Al. 24.
Prion VI Proc. 16.
Prion ariel " " 18.
" banksi " " 17.
" turtur " " 17.
" vittatus " " 16.
Prionirhynchus platyrhynchus III Mo. 4.
Prionites bahamensis " " 3.
Prionites coeruleiceps III Mo. 4.
" lessonii " " 4.
" martii " " 4.
" momota " " 2.
" ruficapillus " " 5.
Prioniturus discurus III P. 45.
" flavicans " " 45.
" wallacei " " 45; III P. R. 22.
pritchardi (Megapodius) VIII Ti 64.
Procellaria VI Proc. 2.
Procellaria adamastor " " 23.
" acquinoctialis " " 19.
" anglorum " " 28.
" antarctica " " 15.
" ariel " " 18.
" aterrima " " 9.
" atlantica " " 8.
" banksii " " 17.
" bulweri " " 9.
" capensis " " 14.
" carneipes " " 26.
" chlororhyncha " " 25.
" cinerea " " 23,24.
" coerulea " " 12.
" conspicillata " " 20.
" desolata " " 13.
" " rostrata " " 13.
" fregata " " 5.
" fuliginosa " " 8.
" furcata " " 3.
" gigantea " " 18.
" glacialis " " 21,22.
" " pacifica " " 22.
" glacialoides " " 22.
" grallaria " " 5.
" grisea " " 12.
" haesitata VI Proc. 11, 13, 23.
" incerta VI Proc. 9.
" inexpectata " " 12.
" leachii " " 3.
" leucocephala " " 12.
" leucomelas " " 24.
" leucoptera " " 12.
" leucorrhoa " " 3.
" macroptera " " 8.
" major " " 27.
" marina " " 5.
" melanogastra " " 6.
" mollis " " 11.
" neglecta " " 10.
" nivea " " 15.
" nivea minor " " 16.
" nugax " " 31.
" obscura " " 30.
" oceanica " " 6.
" orientalis " " 3.
" ossifraga " " 18.
" pacifica " " 22.
" parvirostris " " 11.
" pelagica " " 7.
" pelagica lugubris " " 7.
" puffinus " " 28.

Procellaria rostrata VI Proc. 10.
„ smithi „ „ 22.
„ solandri „ „ 12.
„ sphenura „ „ 25.
„ tenuirostris „ „ 22, 26.
„ tridactyla „ „ 37.
„ tristis „ „ 27.
„ tropica „ „ 4.
„ turtur „ „ 17, 18.
„ urinatrix „ „ 37.
„ vittata „ „ 16, 17.
„ yelkuan „ „ 29.
Procellariae „ „ 1.
Procellarus neglectus VI L. 22.
Procelsterna albivitta VI Ster. 38.
„ cinerea „ „ 38.
Proctopus auritus VI U. 40.
proditor (Indicator) I Cuc. 1.
Prodotiscus „ „ 35.
„ regulus „ „ 35.
productus (Nestor) III P. 157; III P.R.70.
Promépic I Bucc. 65.
Prosobonia V Sc. 18.
Prosobonia leucoptera „ „ 18.
Psarolophus ardens I Cor. 115.
„ traillii „ „ 114.
Psephotus haematogaster III P. 102.
„ haematonotus „ „ 101.
„ haematorrhous „ „ 102.
„ multicolor „ „ 100.
„ pulcherrimus „ „ 101.
Pseudobucco pyrolophus I Bucc. 37.
Pseudornis dicruroides I Cuc. 28.
Pseudoscolopax semipalmatus V Sc. 26.
Psilopogon I Bucc. 53.
Psilopogon pyrolophus „ „ 37.
Psilopus hayi „ „ 74.
Psilorhinus albicapillus I Cor. 69.
„ chilensis „ „ 47.
„ mexicanus „ „ 44.
„ morio „ „ 44.
„ occipitalis „ „ 69.
Psittacella III P. R. 42.
Psittacella brehmii „ „ 42.
„ modesta „ „ 42.
Psittaca calita III P. 16.
„ cayennensis „ „ 27.
„ chiriri „ „ 27.
„ ginginiana „ „ 76.
„ indica coccinea „ „ 128.
„ torquata „ „ 80.
Psittacara coeruleo-frontatus „ „ 11.
„ erythrogenys „ „ 12.
„ hahnii „ „ 9.
„ leptorhyncha „ „ 22.
„ lichtensteinii „ „ 23.
„ maugei „ „ 13.
„ nana „ „ 14.
„ rectirostra „ „ 22.
„ tiriba „ „ 23.
„ vigorsi „ „ 23.
psittacea (Columba) IV Col. 58.
„ (Treron) „ „ 59.
psittacea (Vinago) IV Col. 59.
Psittaci III P. 1; III P. R. 1.
psittacina (Columba) IV Col. 59.
Psittacodis intermedius III P. 41.
„ westermanni „ „ 42.
Psittacula III P. 68; III P. R. 30.
psittacula (Alca) VI U. 24.
„ blythii III P. R. 32.
„ cana III P. 72; III P. R. 31.
„ cingulata „ „ 69; „ „ 30.
„ coelestis „ „ 32.
„ conspicillata III P. 32.
„ coxenii III P. R. 34.
„ cyanochlora III P. 31; III P. R. 8.
„ cyanopileata „ „ 131.
„ cyanopygia „ „ 33.
„ desmarestii „ „ 75; III P. R. 32.
„ diophthalma III P. 75; III P. R. 32.
„ diophthalma aruensis „ „ 33.
„ florentis III P. 115.
„ guilielmi III III P. R. 34.
„ hueti III P. 69; „ „ 30.
„ incerta „ „ 73; „ „ 32.
„ leucophthalma III P. 69.
„ loxia „ „ 72.
„ loxias III P. R. 31.
„ (Lunda) VI U. 24.
„ lunulata III P. 72; III P. R. 31.
„ madagascariensis III P. 72.
„ melanogenia III P. R. 35.
„ melanonota III P. 70; III P. R. 31.
„ modesta „ „ 31.
„ (Ombria) VI U. 24.
„ (Phaleris) „ „ 24.
„ philippensis III P. 130.
„ pileata „ „ 30.
„ pullaria III P. 71; III P. R. 31.
„ purpurata „ „ 68; „ „ 30.
„ pygmaea „ „ 74; „ „ 71.
„ roseicollis „ „ 71; „ „ 31.
„ rubrifrons „ „ 130.
„ sanctae thomae III P. 31.
„ sclateri „ „ 32.
„ stigmatus „ „ 131.
„ surda III P. 70; III P. R. 31.
„ taranta „ „ 72; „ „ 31.
„ vernalis „ „ 132.
„ viridicauda III P. 68; III P. R. 30.
„ xanthops „ „ 31.
Psittaculus III P. 27; „ „ 7.
Psittaculus chrysosema „ „ 28; „ „ 7.
„ coelestis „ „ 32; „ „ 9.
„ conspicillatus III P. 32; III P. R. 8.
„ cyanopygius III P. 33; III P. R. 9.
„ gregarius III P. 31.
„ jugularis „ „ 29; III P. R. 7.
„ passerinus „ „ 30, 31, 69; III P. R. 8.
„ pileatus III P. 30; III P. R. 7.

Psittaculus sancti thomae III P. 31; III P. R. 8.
" sclateri III P. 32.
" (Simorhynchus) VI U. 24.
" smaragdinus III P. 117.
" tovi III P. 29; III P. R. 7.
" tui " " 29; " " 7.
" tuipara " " 28; " " 7.
" virescens " " 27; " " 7.
Psittacus " " 33; " " 9.
Psittacus accipitrinus III P. 66.
" acuticaudatus " " 11.
" aequatorialis " " 137, 140.
" aeruginosus " " 21.
" aestivus " " 53, 54.
" agilis " " 53.
" albifrons " " 59.
" alexandri " " 76.
" amazonicus III P. 53, 54; III P. R. 30.
" amazonicus pullus III P. 57.
" ambiguus " " 5.
" amboinensis " " 90.
" aracanga " " 3.
" ararauna " " 4.
" aruensis " " 43.
" asiaticus " " 132.
" ater " " 129.
" aterrimus " " 149,151.
" augustus " " 50.
" aurantius " " 51.
" aureus " " 19.
" auriceps " " 106.
" aurora " " 55.
" australis " " 114,156.
" autumnalis " " 51.
" azureus " " 73.
" badiceps " " 63.
" banksianus fulgidus " " 157.
" banksii " " 152,153.
" barbatulus " " 84.
" barbatus " " 85.
" barrabandi " " 65, 98.
" batavica " " 69.
" baueri " " 94.
" bernsteini " " 124.
" bitorquatus " " 81.
" borneus " " 123.
" brachyurus " " 66.
" brasiliensis " " 57.
" browni " " 96.
" buccalis " " 15.
" cactorum " " 21.
" caica " " 64.
" calthopticus " " 28.
" canicularis " " 19.
" canus " " 72.
" capistratus " " 43, 109.
" capitata " " 96.
" cardinalis " " 39.
" carolinensis " " 17, 18.
" cayanensis " " 28.
" ceylanensis " " 39.
Psittacus chalcopterus III P. 62.
" cheroyeus " " 22.
" chlorolepidotus " " 111.
" chrysogaster " " 104.
" chrysostomus " " 103.
" chrysurus " " 70
" cinereicollis " " 15.
" cingulatus " " 69
" clusii " " 67.
" cobaltinus " " 61.
" coccineus " " 116.
" cochinchinensis " " 125.
" coeruleatus " " 123.
" columbinus " " 50.
" concinnus " " 114.
" cookii " " 152, 153.
" cornutus " " 95.
" coronatus " " 67.
" cristatus " " 143.
" cruentatus " " 23.
" cubicularius " " 81.
" cyanauchen " " 119.
" cyaneus " " 117.
" cyanicollis " " 44.
" cyanocephalus " " 81.
" cyanogaster " " 66.
" cyanogula " " 60.
" cyanolyseos " " 9.
" cyanomelas " " 94.
" cyanopis " " 50.
" cyanopterus " " 25, 30.
" cyanorhynchus " " 50.
" cyanotis " " 57.
" cyanurus " " 61.
" diadema III P. 51; III P. R. 27.
" discolor III P. 114.
" domicella " " 120.
" dominicensis " " 58.
" dorsalis " " 91.
" dufresnianus " " 52.
" edwardsii " " 103.
" elegans " " 96.
" eos " " 145.
" eques " " 81.
" erythacus III P. 37; III P. R. 10.
" erythrocephalus III P. 30, 81, 84.
" erythrogaster " " 23.
" erythropis " " 57.
" erythrops " " 59.
" erythropterus " " 92.
" erythrurus " " 70.
" eupatria " " 76.
" euteles " " 112.
" eximius " " 96.
" farinosus " " 52.
" festivus " " 57.
" flammipes " " 33.
" flavifrons " " 35.
" flavigaster " " 98.
" flavinuchus " " 52.
" flavirostris " " 61.
" flavoscapulatus " " 36.
" formosus " " 106.

Psittacus forsteni III P. 111.
" fringillaceus " " 117.
" frontalis " " 24.
" funereus " " 155.
" fuscicapillus III P. 43; III P.R. 9.
" fuscicollis " " 34; " " 9.
" gala " " 48.
" galeatus " " 48, 142.
" galeritus " " 134.
" galgulus " " 131.
" garrulus " " 120.
" geoffroyanus " " 42, 43.
" geoffroyi " " 43.
" gerini " " 59.
" gloriosus " " 96.
" goliath " " 148.
" gramineus III P. R. 25.
" grandis III P. 38.
" gregarius " " 31.
" guarouba " " 17.
" guebiensis " " 123, 124.
" guenbiensis " " 125.
" guenbyensis " " 125.
" guianensis " " 12.
" guildingi " " 49.
" gulielmi " " 34; III P.R. 9.
" guttatus " " 128.
" gutture luteo " " 29.
" guyanensis " " 9.
" haematotus " " 109.
" havanensis " " 50.
" histrio " " 64.
" hueti " " 69.
" humeralis " " 114.
" hyacinthinus " " 2.
" hygsinus III P. 88; III P. R. 37.
" hypophonius III P. 91.
" hypopolius " " 156.
" icterotis " " 97.
" incerta " " 73.
" incertus " " 73.
" indicus " " 128, 132.
" iris " " 116.
" jandaya " " 18.
" japonicus " " 130.
" javanicus " " 86.
" jonquillaceus " " 92.
" jukesii " " 42.
" kieneri " " 83.
" lathami " " 114.
" layardi " " 81.
" leachii " " 152, 153.
" leucocephalus " " 58, 59.
" leucogaster " " 63.
" leucorhynchus " " 62.
" leucotis " " 24.
" levaillantii " " 33, 116.
" linnaei " " 38.
" longicaudus " " 84.
" lory III P. 118; III P. R. 54.
" lucioniensis III P. 48.
" ludovicianus " " 17, 18.
" lunulatus " " 72.

Psittacus luteocapillus III P. 17.
" luteus " " 16, 17, 55.
" macao " " 3.
" macawuanna " " 7.
" macrorhynchus " " 46.
" macrourus viridis " 86.
" magnus " " 40.
" maïtaca " " 30.
" malaccensis " " 73, 84.
" malachitaceus " " 66.
" manilatus " " 7.
" marginatus " " 48.
" marinus VI U. 28.
" maximiliani III P. 61.
" megalorhynchus " " 46.
" melanocephalus " " 10.
" melanonotus " " 70.
" melanopterus " " 69.
" melanotus " " 92.
" menstruus " " 60.
" mercenarius III P. R. 28.
" meridionalis III P. 156.
" merulinus " " 17.
" mexicanus guarouba " " 17.
" meyeri III P. 36; III P. R. 10.
" micropterus III P. 69.
" militaris " " 5.
" mitratus " " 30.
" moluccensis " " 142.
" monachus " " 15.
" mülleri " " 48.
" multicolor " " 100, 108.
" murinoides " " 16.
" murinus " " 15.
" nanday " " 10.
" nasicus " " 146.
" nasutus " " 46.
" nestor " " 156.
" niger III P. 37; III P. R. 10.
" nobilis III P. 8.
" novae guineae " " 129.
" novae hollandiae " " 99.
" novae zeelandiae " " 105.
" nuchalis " " 115.
" obscurus III P. 37; III P. R. 10.
" ochrocephalus III P. 55.
" ochropterus " " 55.
" ochrurus " " 70.
" omnicolor " " 96.
" ornatus " " 112.
" pachyrhynchus " " 34.
" pacificus " " 105, 106, 114.
" papuensis " " 130.
" passerinus " " 30.
" patagonus " " 9.
" pavua " " 12.
" pecquetii " " 157.
" pennantii " " 96.
" personatus " " 42, 43.
" pertinax " " 20.
" petzii " " 20.
" phigy " " 116.
" philippinarum " " 144.

Psittacus pileatus III P. 30, 64.
" placentis " " 113.
" platurus " " 45.
" poëcilorhynchus " " 56.
" polychloros " " 40.
" pondicerianus " " 85, 86.
" porphyrorus " " 68.
" prêtrei " " 59.
" pulchellus " " 103.
" pullarius " " 71.
" pulverulentus " " 52.
" pumilis " " 66.
" puniceus " " 39.
" purpuratus " " 68.
" purpureocephalus " 94.
" purpureus " " 63.
" pusillus " " 115.
" pygmaeus " " 74.
" pyrrhocephalus " " 18.
" radja " " 120.
" raja " " 120.
" reticulatus " " 128.
" rhodops " " 43.
" riciniatus " " 125.
" robustus III P. 33; III P. R. 9.
" rosa " " 81.
" rosaceus " " 142.
" roseicollis " " 71.
" ruber " " 123.
" rubrifrons " " 114.
" rufifrons " " 24.
" rüppellii " " 36; III P. R. 10.
" sancti thomae III P. 31.
" saphirinus " " 117.
" scapulatus " " 89.
" scintillans " " 122.
" scintillatus " " 122.
" semitorquatus " " 93.
" senegalus III P. 35; III P. R. 9.
" senilis " " 62.
" seniloides III P. R. 29.
" setarius III P. 45.
" severus " " 6.
" sinensis " " 40.
" smaragdinus " " 22.
" solandri " " 152, 153.
" solitarius " " 116.
" solstitialis " " 17.
" sordidus " " 61.
" sosove " " 28.
" spadiceocephalus " 43.
" sparrmanni " " 117.
" splendidus " " 96.
" squamosus " " 23.
" stigmatus " " 131.
" sulphureus " " 137, 140.
" sumatranus III P. R. 25.
" surdus III P. 70.
" tabuensis " " 88, 89; III P. R. 37.
" taitianus III P. 117.
" taranta " " 72.
" temminckii " " 152, 153.
Psittacus tenuirostris III P. 146.
" terrestris " " 106.
" timneh III P. R. 10.
" tirica III P. 14.
" torquatus " " 72, 78, 80.
" tovi " " 29.
" tricolor " " 4.
" triton " " 135.
" tui " " 29.
" tuipara " " 28.
" undulatus " " 24, 105.
" unicolor " " 123.
" vasa " " 37.
" velatus " " 114.
" venustus " " 96, 103.
" vernalis " " 132.
" versicolor " " 25.
" vibrisca " " 85.
" vigorsi " " 23.
" vinaceus " " 50.
" violaceus " " 63, 67.
" virescens " " 27.
" viridicollis " " 83.
" viridis " " 40, 94.
" viridissimus " " 14, 66.
" vittatus " " 24, 58.
" vulturinus " " 66.
" xanthops " " 55, 57.
" zonarius " " 94.
Psophia undulata IV Cur. 3.
pteneres (Anas) VI A. 13.
pterocles (Butco) II But. 13; II Acc. 110.
" (Falco) " " 13.
Pterocyanea coerulata VI A. 51.
" cyanoptera " " 62.
" discors " " 50.
" humeralis " " 49.
" querquedula " " 49.
" rafflesii " " 51.
" versicolor " " 57.
Pterodroma aterrima VI Proc. 9.
" atlantica " " 8.
" macroptera " " 8.
Pterura tyrannus II Ass. 2.
Ptilinope de Clementine IV Col 6.
Ptilinopus aemiliae " " 14.
" albocinctus " " 34.
" auranticollis " " 18.
" caesarinus " " 10.
" chalcurus " " 14.
" chrysogaster " " 14.
" cinctus " " 34.
" coralensis " " 14.
" coronulatus " " 9.
" du petit thouarsii " " 14.
" elphinstonii " " 70.
" erythrocephalus " " 33.
" ewingii " " 5.
" fasciatus " " 6.
" formosus " " 30.
" furcatus " " 15.
" greyi " " 7.
" holosericeus " " 41.

Ptiliuopus humeralis IV Col. 16.
" hyogaster " " 20.
" ioxonus " " 17.
" jambu " " 37.
" leucocephalus " " 14.
" leucogaster " " 30.
" macrognathus " " 60.
" madagascariensis " " 42.
" magnificus " " 38.
" mariae " " 10.
" melanocephalus " " 28.
" monachus " " 12.
" naina " " 21.
" occipitalis " " 35.
" perlatus " " 17.
" perousii " " 10.
" prasinorrhous " " 25.
" pulchellus " " 2.
" pulcherrimus " " 44.
" purpuratus IV Col. 5, 11, 15.
" purpureicinctus IV Col. 8.
" rivoli " " 24.
" roseipectus " " 23.
" superbus " " 30.
" swainsonii " " 4.
" taïtensis " " 14.
" turturoides " " 60.
" viridis " " 22.
" wallacei " " 18.
Ptiloleptis pluvialis I Cuc. 39.
Ptiloleptus cristatus " " 43.
Ptilonopus flavicollis IV Col. 5.
" flavipectus " " 5.
" greyi " " 7.
" xanthogaster " " 11.
ptilonorhynchus (Falco) II Per. 2.
" macleayii I Cor. 117.
" squamulosus " " 117.
Ptilopus IV Col. 1.
Ptilopus apicalis " " 6.
" assimilis " " 38.
" auranticollis " " 18.
" aurantiiventris " " 11.
" bernsteinii " " 40.
" cinctus " " 34.
" " florensis " " 34.
" " lettiensis " " 35.
" clementinae " " 6.
" coralensis " " 14.
" coronulatus " " 9.
" diadematus " " 11.
" du petit thouarsii " " 13.
" ewingii " " 5.
" fasciatus " " 6.
" flavicollis " " 5.
" geversii " " 36.
" greyi " " 7.
" gularis " " 37.
" holosericeus " " 41.
" hugonianus " " 36.
" humeralis " " 16.
" " iobensis " " 16.
" insolitus " " 16.
Ptilopus iogaster IV Col. 20.
" iozonus " " 17.
" jambu " " 36.
" luteovirens " " 41.
" madagascariensis " " 42.
" magnificus " " 38.
" melanocephalus " " 28.
" miqueli " " 26.
" monachus " " 12.
" musschenbroekii " " 23.
" nanus " " 21.
" neglectus " " 7.
" occipitalis " " 35.
" ochrogaster " " 40.
" ornatus " " 19.
" pectoralis " " 23.
" perlatus " " 17.
" perousii " " 10.
" porphyraceus " " 8.
" porphyreus " " 33.
" puellus " " 38.
" pulchellus " " 2.
" pulcherrimus " " 44.
" purpuratus " " 7, 15.
" rivoli " " 24.
" roseicapillus " " 8.
" sganzini " " 43.
" speciosus " " 27.
" superbus " 23, 30.
" swainsonii " " 4.
" viridis " " 22.
" " geelvinkianus " " 23.
" " stirps geelvinkiana " 23.
" viridissimus " " 6.
" wallacei " " 18.
Ptilorhynchus I Cor. 116.
Ptilorhynchus buccoides " " 118.
" holosericeus " " 117.
" maculatus " " 119.
" melanotis " " 118.
" nuchalis " " 119.
" smithii " " 117.
" viridis " " 117.
Ptiloris paradiseus " " 97.
Ptilostomus senegalensis " " 78.
" poëcilorhynchos " " 78.
Ptychorhamphus aleuticus VI U. 26.
Ptynx fuscescens II Str. 11.
" uralensis " " 10.
pucherani (Asturina) II Acc. 101.
" (Geoffroyus) III P. R. 20.
" (Podoa) VI U. 49.
puella (Carpophaga) IV Col. 39.
" (Chalcopelia) " " 134.
" (Cissa) I Cor. 69.
" (Columba) IV Col. 38.
" (Megaloprepia) " " 39.
" (Peristera) " " 134
puellus (Ptilopus) " " 38.
Puffinuria garnotii VI Proc. 37.
" urinatrix " " 37.
Puffinus anglorum " " 28.
" assimilis " " 31.

Puffinus baroli VI Proc. 28.
" brevicaudus " " 27.
" carneipes " " 26.
" chlororhynchus " " 25.
" cinereus " " 24, 26.
" columbinus " " 9.
" curilicus " " 26.
" fuliginosus " " 26.
" kuhlii " " 24.
" leucomelas " " 24.
" major " " 27.
" nugax " " 31.
" nugax bailloni " " 30.
" obscurus " " 30.
" (Procellaria) " " 28.
" sphenurus " " 25.
" yelkuan " " 29.
pugnax (Machetes) V Sc. 51.
" (Tringa) " " 51.
pulchella (Charmosyne) III P. 130; III P. R. 52.
" (Columba) IV Col. 2.
" (Dacelo) III Al. 21; III Al. R. 13.
" (Euphema) III P. 103; III P. R. 41.
" (Halcyon) III Al. 21.
pulchellus (Lorius) III P. 130.
" (Nanodes) III P. R. 52.
" (Nettapus) VI A. 77.
" (Psittacus) III P. 103.
" (Ptilinopus) IV Col. 2.
" (Ptilopus) " " 2.
" (Trichoglossus) III P. R. 52.
pulcher (Nisaëtus) II Ass. 6.
pulcherrima (Columba) IV Col. 44.
" (Erythroena) " " 44.
" (Euphema) III P. 101; III P. R. 41.
pulcherrimus (Platycercus) III P. 101.
" (Psephotus) " " 101.
" (Ptilinopus) IV Col. 44.
" (Ptilopus) " " 44.
pulchra (Alcedo) III Al. 17.
" (Alcyone) III Al. R. 9.
" (Crex) V Ra. 26.
pulchricollis (Columba) IV Col. 71.
" (Lepidoenas) " " 71.
" (Palumbus) " " 71.
pulchrirostris (Buceros) I Buc. 15.
pulih (Pitta) III Pit. 12.
pullaria (Psittacula) III P. 71; III P.R.31.
pullarius (Psittacus) " " 71.
pullus (Psittacus amazonicus) III P. 57.
pulmentum (Bucco) I Bucc. 80.
" (Nyctactes) " " 80.
" (Tamatia) " " 80.
pulsatrix (Strix) II Str. 17; II Noc. 20.
" (Ulula) " " 17.
pulverulenta (Gambetta) V Sc. 74.
" (Treron) IV Col. 53.
pulverulentus (Porphyrio) V Ra. 54, 55.
" (Psittacus) III P. 52.
" (Totanus) V Sc. 74.
pumila (Strix) II Str. 31, 32; II Noc. 29.
pumilis (Psittacus) III P. 66.
punctata (Anas) VI A. 47, 59.
" (Mareca) " " 47.
" (Strix) II Str. 6.
punctatus (Capito) I Bucc. 55.
" (Carbo) VI Pe. 21.
" (Cuculus) I Cuc. 16.
" (Eudynamis) " " 19, 20.
" (Falco) II Fal. 28; II Acc. 44.
" (Graculus) VI Pe. 21.
" (Sticticarbo) " " 21.
punctulata (Athene) II Str. 29.
" (Noctua) " " 29; II Noc. 29.
" (Nothura) VIII Ti. 41.
punctulatus (Cuculus) I Cuc. 42.
" (Rhynchotus) VIII Ti. 41.
punicea (Parra) V Ra. 66.
puniceus (Falco) II Fal. 5.
" (Psittacus) III P. 39.
Purple crowded pigeon IV Col. 15.
purpurascens (Carbo) VI Pe. 20.
" (Colaris) I Cor. 142.
" (Leucocarbo) VI Pe. 20.
purpurata (Columba) IV Col. 4, 7, 8, 15.
" (Psittacula) III P. 68; III P. R. 30.
purpuratus (Capito) I Bucc. 71.
" (Psittacus) III P. 68.
" (Ptilinopus) IV Col. 5, 11, 15.
" (Ptilopus) " " 7, 15.
" (Trachyphonus) I Bucc. 71.
purpurea (Alcedo) III Al. 49.
" (Ardea) V Ar. 8.
" (Columba) IV Col. 49.
" (Fulica) V Ra. 38.
" (Musophaga) I Cuc. 77.
purpureicinctus (Ptilinopus) IV Col. 8.
purpureocephalus (Psittacus) III P. 94.
purpureodorsalis (Arara) " " 7.
purpureo-leucocephala (Columba) IV Col. 13.
purpereo leucocephalus (Kurukuru) IV Col. 14.
purpureo-viridis (Anas) VI A. 73.
purpureus (Corythaix) I Cuc. 76.
" (Palaeornis) III P. R. 35.
" (Psittacus) III P. 63.
pusilla (Alcedo) III Al. 17; III Al. R. 10.
" (Alcyone) " " 18.
" (Ardea) V Ar. 39.
" (Ardeola) " " 39.
" (Carpophaga) IV Col. 86.
" (Ceyx) III Al. 18.
" (Megalaema) I Bucc. 40.
" (Megalaima) " " 40.
" (Tringa) V Sc. 43, 48, 55.
" (Uria) VI U. 23.
pusillus (Bucco) I Bucc. 40.
" (Charadrius) IV Cur. 28.
" (Ereunetes) V Sc. 55.
" (Loriculus) III P. 132; III P. R. 60.

pusillus (Megapodius) VIII Ti. 72.
" (Nanodes) III P. 115; III P. R. 53.
" (Numenius) V Sc. 49.
" (Phaleris) VI U. 23.
" (Psittacus) III P. 115.
" (Rallus) V Ra. 31.
pusio (Strix) II Str. 32.
pygmaea (Alca) VI U. 23.
" (Crex) V Ra. 30.
" (Dacelo) III Al. 32.
" geelvinkiana (Nasiterna) III P. R. 71.
" (Limicola) V Sc. 49.
" (Micropsitta) III P. 74.
" (Nasiterna) " " 74; III P. R. 71.
" (Platalea) V Sc. 50.
" (Porzana) V Ra. 30.
" (Psittacula) III P. 74.
" (Scolopax) V Sc. 4.
" (Tringa) " " 33, 50.
" (Zapornia) V Ra. 30.
pygmaeus algeriensis (Haliaeus) VI Pe. 13.
" (Anser) VI A. 111.
" (Centropus) I Cuc. 68.
" (Charadrius) IV Cur. 28.
" (Eurynorhynchus) V Sc. 50.
" (Graculus) VI Pe. 13.
" (Haliaeus) " " 13.
" (Numenius) V Sc. 49.
" (Pelecanus) VI Pe. 13.
" (Psittacus) III P. 74.
" (Simorhynchus) VI U. 23.
" (Tylorhamphus) " " 23.
Pygoscelis " " 1.
Pygoscelis antarctica " " 5.
" antipoda " " 9.
" brevirostris " " 4.
" wagleri " " 5.
pykii (Sterna) VI Ster. 24.
pyrolopha (Megalaima) I Bucc. 37.
pyrolophus (Bucco) " " 37.
" (Pseudobucco) " " 37.
" (Psilopogon) " " 37.
pyrrhetraea (Tringa) V Sc. 18.
Pyrrhocentor bicolor I Cuc. 73.
pyrrhocephalus (Charadrius) IV Cur. 36.
" (Cuculus) I Cuc. 53.
" (Phoenicophaës) " " 53.
" (Psittacus) III P. 18.
Pyrrhococcyx columbianus I Cuc. 57.
" guianensis " " 58.
" mehleri " " 58.
" mesurus " " 57.
Pyrrhocorax I Cor. 55.
pyrrhocorax (Corvus) " " 55.
" graculus " " 55.
" leucopterus " " 56.
" melanorhynchus " " 56.
" violaceus " " 117.
pyrrhocyanea (Cissa) " " 68.
pyrrhogaster (Anas) VI A. 39.
pyrrhogenys (Buteo) II But. 22.
pyrrhophanes (Cuculus) I Cuc. 26.
pyrrhoptera (Pica) I Cor. 131.
pyrrhopterus (Corvus) " " 131.
" (Corydonix) I Cuc. 65.
" (Lycocorax) I Cor. 131.
" (Poliornis) II But. 23.
pyrrhopygia (Dacelo) III Al. 39; III Al. R. 28.
" (Halcyon) III Al. 39.
pyrrhopygius (Tallegallus) VIII Ti. 82.
pyrrhorhyncha (Anas) VI A. 56.
pyrrhothorax (Charadrius) IV Cur. 41.
" (Cirrepidesmos) " " 41.

Q.

quadribrachys (Alcedo) III Al. 9; III Al. R. 5.
quadricolor (Bucco) I Bucc. 18.
quadristrigatus (Rallus) V Ra. 32.
querquedula (Anas) VI A. 49.
" angustirostris " " 59.
" bernieri " " 60.
" brasiliensis " " 61.
" capensis " " 59.
" circia " " 49.
" coerulata " " 51.
" crecca " " 52.
" creccoides " " 59.
" discors " " 50.
" dominicensis " " 9.
" erythrorhyncha " " 56,61.
" formosa " " 54.
" hottentota " " 60.
" inornata " " 50.
" javanensis " " 72.
" larvata " " 60.
" maculirostris " " 57.
" multicolor " " 72.
" (Pterocyanea) " " 49.
" torquata " " 61.
querulus (Cacomantis) I Cuc. 23.
quinticolor (Merops) III Me. 9.
Quiriva I Cuc. 80.
quiriva (Colius) I Cuc. 80.
quopopa (Polysticte) I Bucc. 65.
quoyi (Barita) I Cor. 124.
" (Cracticus) " " 124.
" (Megapodius) VIII Ti. 66.

R.

radiata (Athene) II Str. 34.
" (Carpophaga) IV Col. 93.
" (Noctua) II Str. 34; II Noc. 27.
" (Strix) " " 34.
" (Zonaenas) IV Col. 93.
radiatus (Astur) II Ass. 15, 42; II Acc. 61, 79.
" (Bucco) I Bucc. 83.
" (Calobates) I Cuc. 60.
" (Carpococcyx) " " 60.
" (Falco) II Ass. 15; II Acc. 79.

radiatus (Neomorphus) I Cuc. 60.
" (Nisus) II Ass. 54; II Acc. 100.
" (Polyboroides) II Ass. 54.
" (Vultur) " " 54.
Radja eytoni VI A. 69.
radja (Psittacus) III P. 120.
" (Tadorna) VI A. 69.
radjah (Anas) " " 69.
rafflesia (Bucco) I Bucc. 15.
rafflesii (Anas) VI A. 51.
" (Pterocyanea) " " 51.
rafflesius (Bucco) I Bucc. 24.
raja (Psittacus) III P. 120.
râle de cayenne (Petit) V Ra. 31.
rales (Hérons-) V Ar. 31.
Ralli V Ra. 1.
Rallina " " 15.
Rallina abyssinica " " 16.
" castanea " " 17.
" cayanensis " " 17.
" erythrothorax " " 21.
" fasciata " " 19.
" fusca " " 20.
" isabellina " " 16.
" minahasa " " 18.
" oculea " " 20.
" plumbeiventris " " 17.
" tricolor " " 18.
ralloides (Ardea) V Ar. 32.
Rallus V Ra. 8.
Rallus abyssinicus " " 16.
" actiops " " 34.
" albicollis " " 34.
" aquaticus " " 10.
" aquaticus minor " " 29.
" ardeoides " " 7.
" australis " " 73.
" bengalensis V Sc. 16.
" bicolor V Ra. 8.
" brachypus " " 12.
" caesius " " 8.
" caffer " " 9.
" carinatus " " 34.
" carolinus " " 28.
" castaneus " " 17.
" cayanensis " " 17.
" cayennensis " " 14, 17.
" celebensis " " 22.
" chirocote " " 15.
" cinereus " " 32, 34.
" cinnamomeus " " 27.
" coerulescens " " 9.
" concolor " " 17.
" crepitans " " 12.
" cuvieri " " 13.
" elegans " " 12.
" etorques " " 23.
" exilis " " 35.
" fasciatus " " 19.
" flaviventer " " 31.
" fuscus " " 20.
" giganteus " " 7.
" gigas " " 7.
Rallus griseopectus V Ra. 24.
" guarauna " " 7.
" gularis " " 13, 24, 34.
" hydrogallina " " 14.
" immaculatus " " 8.
" indicus " " 24.
" jamaicensis " " 36.
" kiolo " " 17.
" lewinii " " 12.
" limicola " " 10.
" lineatus " " 22.
" longirostris " " 11.
" maculatus " " 13.
" madagascariensis " " 10.
" maruetta " " 29.
" maximus " " 14.
" melanophaios " " 35.
" melanops " " 28, 50.
" melanurus " " 15.
" minutus " " 31.
" niger " " 34.
" nigricans " " 8.
" nivosus " " 13.
" olivaceus " " 34.
" parvus " " 31.
" pectoralis " " 12, 23.
" peyrousei " " 31.
" philippensis " " 23, 24.
" philippensis fuscus " " 20.
" philippinus " " 24.
" phoenicurus " " 41.
" plumbeiventris " " 17.
" plumbeus " " 15.
" porzana " " 29.
" pusillus " " 31.
" quadristrigatus " " 32.
" rhytirhynchos " " 12.
" ricordi " " 8.
" rougetii " " 16.
" ruficollis " " 14, 15, 26.
" sandwichensis " " 25, 32.
" semiplumbeus " " 11.
" stolidus " " 28.
" striatus " " 24.
" sulcirostris " " 22.
" superciliaris " " 31, 32.
" torquatus " " 22.
" troglodytes " " 73.
" variegatus " " 13.
" virginianus " " 10.
" ypecaha " " 14.
ramphastinus (Tetragonops) I Bucc. 93.
Ramphiculus occipitalis IV Col. 35.
ranivorus (Circus) II Cir. 11; II Acc. 50
ransomi (Eudynamis) I Cuc. 18.
rapax (Falco) II Aq. 3.
recentiorum (Nisus) II Ass. 28.
rectirostra (Psittacara) III P. 22.
rectirostris (Ardea) V Ar. 3.
" (Typhon) " " 3.
rectunguis (Centrococcyx) I Cuc. 68.
" (Centropus) " " 67.
Recurvirostra V Sc. 102.

Recurvirostra americana V Sc. 104.
" avocetta " " 103.
" (Limosa) " " 77.
" occidentalis " " 104.
" rubricollis " " 104.
recurvirostris (Dacelo) III Al. R. 29.
" (Esacus) IV Cur. 23.
" (Oedicnemus) " " 23.
" (Podiceps) VI U. 40.
" (Todirhamphus) III Al. R. 29.
Red-crowned barbet I Bucc. 26.
regulis (Falco) II Ass. 17.
" (Milvus) II Mil. 1; II Acc. 126.
regens (Oriolus) I Cor. 99.
regia (Anas) VI A. 73, 74.
" (Paradisea) I Cor. 88.
" (Platalea) V Cic. 23.
" (Sarkidiornis) VI A. 74.
" (Sterna) VI Ster. 7.
regius (Cincinnurus) I Cor. 89.
" (Epimachus) " " 97.
" (Oriolus) " " 99.
" (Sarkidiornis) VI A. 74.
regulus (Cuculus) I Cuc. 35.
" (Indicator) " " 35.
" (Prodotiscus) " " 35.
reichenbachii (Crossophthalmus) IV Col. 69.
" (Dacelo) III Al. R. 29.
" (Halcyon) " " 29.
reinwardtii (Baza) II Per. 5; II Acc. 133, 135.
" (Columba) IV Col. 104.
" (Lophotes) II Per. 5.
" (Macropygia) IV Col. 104.
" (Megapodius) VIII Ti. 57.
" minor (Macropygia) IV Col. 106.
Reinwardtoena typica IV Col. 104.
religiosa (Ibis) V I. 12.
religiosus (Falco) II Acc. 39.
resplendens (Lamprococcyx) I Cuc. 30.
respublica (Diphyllodes) I Cor. 87.
ressa (Sterna) VI Ster. 9.
reticulatus (Lorius) III P. 128; III P. R. 58.
" (Psittacus) III P. 128.
rex (Aptenodytes) VI U. 3.
" (Paradisea) I Cor. 83.
Rhaad IV Cur. 4.
Rhaad (Otis) " " 4, 5.
" (Trachelotis) " " 4.
rhadama (Falco) II Acc. 32.
Rhagorina IV Col. 65.
Rhamphalcyon gurial III Al. 14.
Rhamphastus momota III Mo. 2.
Rhamphiculus jambu IV Col. 36.
Rhamphococcyx I Cuc. 48.
Rhaphipterus chilensis VI A. 12.
Rhea IV St. 3, 6.
Rhea americana " " 6.
" darwinii " " 7.
" (Struthio) " " 6.
Rhigelura senegalensis VI U. 49.
rhingvia (Uria) " " 15.
rhinoceroides (Buceros) I Buc. 5.
rhinoceros (Buceros) " " 3.
" (" bornensis) " " 5.
" (" borneoensis) " " 4.
" (" indica) " " 6.
" (" lunatus) " " 6.
" (" sumatranus) " " 4.
Rhinoptilus bicinctus IV Cur. 11.
" chalcopterus " " 12.
Rhinorta caniceps I Cuc. 51.
rhodinopterus (Tantalus) V Cic. 18.
rhodogaster (Conurus) III P. 27; III P. R. 7.
" (Nisus) II Acc. 76.
" (Nisus virgatus) II Ass. 32; II Acc. 76.
Rhodonessa caryophyllacea VI A. 62.
rhodops (Eclectus) III P. 43; III P. R. 18.
" (Psittacus) " " 43.
rhodoptera (Anas) VI A. 61.
Rhopodytes elongatus I Cuc. 55.
Rhynchaea V Sc. 16.
Rhynchaea atricapilla " " 18.
" australis " " 17.
" curvirostris " " 18.
" hilarea " " 18.
" indica " " 17.
" occidentalis " " 18.
" orientalis " " 17.
" picta " " 17.
" semicollaris " " 18.
" variabilis " " 17.
" variegata " " 16.
Rhynchaspis capensis VI A. 33.
" clypeata " " 33.
" rhynchotis " " 35.
" variegata " " 35.
Rhynchophilus affinis V Sc. 71.
" caligatus " " 73.
" chloropygius V Sc. 73.
" glareola V Sc. 71.
rhynchomega (Squatarola) IV Cur. 54.
Rhynchops VI Ster. 39.
Rhynchops albicollis " " 40.
" albirostris " " 40.
" borealis " " 39.
" brevirostris " " 39.
" cinerascens " " 39.
" flavirostris " " 40.
" fulva " " 39.
" melanura " " 39.
" nigra " " 39.
" orientalis " " 40.
Rhynchopsitta pachyrhyncha III P. 11.
rhynchotis (Anas) VI A. 35.
" (Rhynchaspis) " " 35.
Rhynchotus VIII Ti. 35.
Rhynchotus cinerascens " " 40.
" fasciatus " " 35.
" maculicollis " " 38.
" perdicarius " " 40.
" punctulatus " " 41.
" rufescens " " 35.

rhytirhynchos (Rallus) V Ra. 12.
richardsoni (Capito) I Bucc. 59.
" (Lestris) VI L. 47.
" (Eubucco) I Bucc. 59.
richardsonii (Strix) II Noc. 18.
riciniata (Eos) III P. 125.
riciniatus (Lorius) III P. 125; III P. R. 56, 57.
" (Psittacus) III P. 125.
ricordi (Rallus) V Ra. 8.
ridibundus (Larus) VI L. 37.
riedeli (Tanysiptera) III Al. R. 40.
riocourii (Elanoides) II Mil. 5; II Acc. 129.
" (Falco) " " 5.
" (Milvus) " " 5.
" (Nauclerus) " " 5; II Acc. 129.
risoria (Columba) IV Col. 125.
" (Scolopax) V Sc. 7.
risorius ferus (Turtur) IV Col. 123.
" (Larus) VI 37.
" (Turtur) IV Col. 125.
Rissa kotzebui VI L. 30.
" tridactyla " " 30.
rivoli (Columba) IV Col. 24.
" (Jotreron) " " 24.
" (Ptilinopus) " " 24.
" (Ptilopus) " " 24.
robusta (Ardea) V Ar. 3.
" (Typhon) " " 3.
robustus (Bucco) I Bucc. 31.
" (Cracticus) I Cor. 128.
" (Psittacus) III P. 33; III P. R. 9.
" (Tinamus) VIII Ti. 2, 11.
Rollandia leucotis VI U. 42.
rollandii (Podiceps) " " 42.
rolleti (Pogonias) I Bucc. 2.
" (Pogonorhynchus) " " 2.
rosa (Palaeornis) III P. 81; III P. R. 35.
" (Psittacus) " " 81.
rosacea (Carpophaga) IV Col. 87.
" (Columba) " " 87.
" (Ducula) " " 88.
rosacei-collis (Bucco) I Bucc. 27.
rosaceus (Palaeornis) III P. 98.
" (Platycercus) " " 98; III P. R. 40.
" (Psittacus) III P. 142.
rosea (Ajaja) V Cic. 24.
" (Cacatua) III P. 145.
" (Megalaima) I Bucc. 27.
roseicapilla (Cacatua) III P. 145; III P. R. 67.
" (Columba) IV Col. 8.
roseicapillus (Eulophus) III P. 145.
" (Ptilopus) IV Col. 8.
roseicollis (Bucco) I Bucc. 27.
" (Columba) IV Col. 33.
" (Psittacula) III P. 71; III P. R. 31.
" (Psittacus) III P. 71.
roseinucha (Carpophaga) IV Col. 81. 82.
roseipectus (Ptilinopus) " " 23.
roseipes (Anser) VI A. 110.
rosenbergii (Pitta) III Pit. R. 8.
" (Strix) II Noc. 16.
" (Trichoglossus) III P. R. 47.
roseus (Bucco) I Bucc. 27.
" (Phoenicopterus) VI A. 116.
rossii (Anser) " " 108.
Rosthramus sociabilis II Pol. 7.
rostrata (Aestrelata) VI Proc. 10.
" (Procellaria) " " 10.
" (Procellaria desolata) " " 13.
rostratus (Turtur) IV Col. 130.
rougetii (Rallus) V Ra. 16.
Rougetius abyssinicus " " 16.
" bernieri " " 13.
" gularis " " 13.
Rougri II But. 5.
Rounoir " " 14.
rousseau (Pampusana) IV Col. 162.
rousseaui (Anous) VI Ster. 36.
rubecola (Charadrius) IV Cur. 48.
rubecula (Bucco) I Bucc. 87.
" (Lypornix) " " 87.
" (Malacoptila) " " 87.
" (Nonnula) " " 87.
rubeculus (Cuculus) I Cuc. 11.
rubens (Anas) VI A. 52.
ruber (Eudocimus) V I. 6.
" (Falco) II Fal. 5; II Acc. 34.
" indicus (Falco) " " 5.
" (Lorius) III P. 123; III P. R. 56.
" (Phoenicopterus) VI A. 116, 117.
" (Psittacus) III P. 123.
" (Tantalus) V I. 6.
rubescens (Eurystomus) I Cor. 142.
" (Pogonias) I Bucc. 6.
rubida (Anas) VI A. 11.
" (Biziura) " " 11.
" (Erismatura) " " 11.
rubidiceps (Anser) " " 102.
" (Chloëphaga) " " 102.
rubidoptera (Anas) " " 61.
rubidus (Charadrius) V Sc. 55.
rubiginosa (Chalcopsitta) III P. 129.
" (Eos) III P. 129.
" (Gallinula) V Ra. 20.
rubiginosus (Lorius) III P. 129; III P. R. 58.
rubra (Alcedo) III Al. 49.
" (Ceyx) " " 49.
" (Dacelo) " " 49; III Al. R. 33.
" (Ibis) V I. 6.
" (Paradisea) I Cor. 84.
rubricapilla (Columba) IV Col. 44.
" (Megalaima) I Bucc. 26, 74.
rubricapillus (Bucco) " " 26.
rubricatus (Colaptes) " " 65.
" (Picus) " " 65.
rubricauda (Phaëton) VI Pe. 44.
" (Phoenicurus) " " 44.
rubricera (Carpophaga) IV Col. 81.
" (Globicera) " " 81.
rubricollis (Accipiter) II Acc. 78.
" (Bucco) I Bucc. 24.
" (Capito) " " 53.

rubricollis (Charadrius) IV Cur. 41.
" (Colymbus) VI U. 38.
" (Podiceps) " " 38.
" (Recurvirostra) V Sc. 104.
rubrifrons (Bucco) I Bucc. 40.
" (Chalcopsitta) III P. 122.
" (Eos) " " 122.
" (Lathamus) " " 114.
" (Megapodius) VIII Ti. 65.
" (Pogonias) I Bucc. 5.
" (Psittacula) III P. 130.
" (Psittacus) " " 114.
rubrigena (Arara) III P. 5; III P. R. 2.
rubrigenys (Ara) " " 5.
rubriginosa (Euryzona) V Ra. 20.
rubrinucha (Pitta) III Pit. R. 12.
rubripes (Megapodius) VIII Ti. 57.
" (Sula) VI Pe. 40.
rubrirostris (Anas) VI A. 55.
" (Coccyzus) I Cuc. 55.
rubritorques (Trichoglossus) III P. 108; III P. R. 48.
rubriventer (Aquila) II Aq. 9.
rubrocristata (Cacatua) III P. 142.
rubrolarvatus (Conurus) " " 12.
rubronotatus (Nanodes) III P. R. 51.
rudis (Alcedo) III Al. 2; III Al. R. 1
" (Ceryle) " " 2.
rufa (Anas) VI A. 23.
" (Ardea) V Ar. 21.
" (Athene) II Str. 40.
" (Baza) II Acc. 133.
" (Dendrocitta) I Cor. 77.
" (Glaucopis) " " 77.
" (Limosa) V Sc. 23, 25.
" (Tringa) " " 29.
rufaxilla (Leptopila) IV Col. 160.
rufescens (Actitis) V Sc. 79.
" (Actiturus) " " 79.
" (Anadacnes) I Cuc. 52.
" (Ardea) V Ar. 21.
" (Crypturus) VIII Ti. 35.
" (Gallinula) V Ra. 40.
" (Herodias) V Ar. 21.
" (Numenius) V Sc. 91.
" (Pelecanus) VI Pe. 33.
" (Phalaropus) V Sc. 58.
" (Rhynchotus) VIII Ti. 35.
" (Scops) II Oti. 25; II Noc. 10.
" (Strix) " " 10.
" (Tinamus) VIII Ti. 35.
" (Tringa) V Sc. 38, 79.
" (Tryngites) " " 79.
Rufibrenta ruficollis VI A. 102.
ruficapilla (Lypornix) I Bucc. 87.
" (Malacoptila) " " 87
ruficapillus (Baryphonus) III Mo. 5.
" (Charadrius) IV Cur. 42.
" (Coccyzes) I Cuc. 42.
" (Momotus) III Mo. 5.
" (Prionites) " " 5.
ruficauda (Anadaenus) I Cuc. 52.
" (Asturina) II Acc. 100.
ruficauda (Peristera) IV Col. 141.
" (Zenaida) " " 141.
ruficaudus (Accipiter) II But. 8.
" (Leptorhynchus) III P. 22.
ruficeps (Columba) IV Col. 110.
" (Gallinula) V Ra. 14.
" (Ispidina) III Al. R. 9.
" (Macropygia) IV Col. 110.
" (Tinamus) VIII Ti. 15.
" (Tinamus major) " " 15.
ruficollis (Anas) VI A. 23.
" (Anser) " " 102.
" (Aramides) V Ra. 15.
" (Bernicla) VI A. 102.
" (Bucco) I Bucc. 81.
" (Buceros) I Buc. 3.
" (Capito) I Bucc. 81.
" (Charadrius) IV Cur. 39, 41.
" (Crex) V Ra. 27.
" (Cuculus) I Cuc. 6.
" (Falco) II Fal. 20.
" (Fulica) V Ra. 15.
" (Gallinula) " " 17.
" (Nisus) II Ass. 50; II Acc. 98.
" (Oreophilus) IV Cur. 47.
" (Otis) " " 7.
" (Pernis) II Per. 2.
" (Rallus) V Ra. 14, 15, 26.
" (Rufibrenta) VI A. 102.
" (Sparvius) II Acc. 98.
ruficrista (Bubulcus) V Ar. 31.
" (Lophotis) IV Cur. 5.
" (Otis) " " 5.
rufidorsa (Ceyx) III Al. R. 33.
" (Dacelo) III Al. 48; III Al. R 33.
rufifrons (Bucco) I Bucc. 7.
" (Falco) II Mil. 9.
" (Fulica) V Ra. 64.
" (Psittacus) III P. 94.
rufigaster (Carpophaga) IV Col. 97.
" (Zonoenas) " " 97.
rufigula (Peristera) " " 157.
" (Phlegoenas) " " 157.
rufigularis (Falco) II Fal. 24.
rufina (Anas) VI A. 25.
" (Callichen) " " 25.
" (Chloroenas) IV Col. 79.
" (Columba) " " 79.
" (Fuligula) VI A. 25.
rufinellus (Charadrius) IV Cur. 41.
rufinus (Charadrius) " " 39.
" (Circus) II But. 9.
" (Cuculus) I Cuc. 68.
" (Falco) II But. 10.
rufipectus (Circaëtus) II But. 27; II Acc. 114.
" (Podiceps) VI U. 43.
" (Spilornis) II Acc. 114.
" sulaënsis (Circaëtus) II Acc. 114.
rufipennis (Buteo) II But. 23; II Acc. 111.
" (Centrococcyx) I Cuc. 66.
" (Centropus) " " 65.
" (Chamaepelia) IV Col. 136.

rufipennis (Peristera) IV Col. 136.
" (Talpacotia) " " 136.
rufipes (Falco) II Fal. 32.
" (Himantopus) V Sc. 105.
Rufirallus boeckii V Ra. 17.
" castaneus " " 17.
" cayanensis " " 17.
rufirostris (Tirica) III P. 14.
rufistrigata (Noctua) II Noc. 31.
rufitorques (Accipiter) II Acc. 80.
" (Anas) VI A. 26.
" (Nisus) II Ass. 40; II Acc. 80.
rufiventer (Alcedo) III Al. 29.
" (Bidens) II Fal. 35.
" (Buteo) II But. 9.
" (Nisus) II Ass. 30; II Acc. 69.
rufiventris (Accipiter) II Ass. 30.
" (Coloburis) III Pit. 7.
" (Pitta) III Pit. 7; III Pit. R. 12.
" (Vanellus) IV Cur. 59.
rufostrigata (Athene) II Noc. 31.
rufulus (Corvus) I Cor. 66.
" (Garrulus) " " 66.
rufus (Circus) II Cir. 10.
" (Corvus) I Cor. 77.
" (Numenius) V Sc. 85.
" (Phalaropus) " " 58.
" (Totanus) " " 19.
rugirostra (Crotophaga) I Cuc. 47.
rupestris (Columba) IV Col. 64.
rupicola (Columba) " " 118.
" (Falco) II Fal. 27; II Acc. 41.
" (Turtur) IV Col. 118.
rupicoloides (Falco) II Fal. 29; II Acc. 43.
Rupornis gularis II Ase. 4; II Acc. 101.
" magnirostris II Ase. 5.
" meridionalis II But. 17.
" urubitinga II Ase. 6.
rüppellii (Psittacus) III P. 36; III P. R. 10.
" (Vultur) II Vul. 7; II Acc. 140.
" (Vultur fulvus) II Vul. 7; II Acc. 140.
russata (Ardea) V Ar. 30, 31.
rustica (Anas) VI A. 22.
Rusticola minor V Sc. 3.
" (Scolopax) " " 2.
rusticula (Scolopax) " " 2.
rutila (Anas) VI A. 66.
" (Casarca) " " 66.
" (Coccyzusa) I Cuc. 59.
rutilans (Falco) II But. 17.
rutilus (Cuculus) I Cuc. 59.
" (Scops) II Noc. 12.
ruyssenaersi (Ciconia) V Cic. 9.

S.

sabinei (Larus) VI L. 44.
" (Xema) " " 44.
sabinii (Scolopax) V Sc. 4.
sabrina (Dacelo) III Al. 46; III Al. R. 34.
" (Tanysiptera) III Al. 46; III Al. R. 39.
sacra (Alcedo) III Al. 38.
" (Ardea) V Ar. 25.
" (Dacelo) III Al. 38; III Al. R. 28.
" (Halcyon) " " 38; " " 29.
Sacre II Fal. 1, 16.
Saf-saf IV Cur. 4.
sagittata (Coracias) I Cor. 110.
sagittatus (Ephialtes) II Oti. 23; II Noc. 9.
sagittifer columboides (Conurus) III P. 83.
Sagmathorina lathami VI U. 26.
saker (Falco) II Fal. 16; II Acc. 36.
sakhalina (Gallinago) V Sc. 4.
sallaei (Amazona) III P. 58; III P. R. 28.
" (Chrysotis) " " 58.
" (Crypturus) VIII Ti. 31.
" (Nothocercus) " " 31.
" (Tinamus) " " 31.
saltii (Bucco) I Bucc. 5.
Sambé VI Ster. 14.
samoensis (Kurukuru) IV Col. 10.
" (Porphyrio) V Ra. 56.
sancta (Dacelo) III Al. 35; III Al. R. 26.
sanctae thomae (Psittacula) III P. 31.
sancti johannis (Buteo) II But. 2.
" (Falco) " " 2.
sancti thomae (Psittaculus) III P. 31; III P. R. 8.
" (Psittacus) III P. 31.
" (Treron) IV Col. 45.
sanctus (Halcyon) III Al. 35.
sandwichensis (Anas superciliosa) VI A. 42.
" (Anser) VI A. 106.
" (Bernicla) " " 106.
" (Crex) V Ra. 25.
" (Rallus) " " 25, 32.
" (Zapornia) " " 25, 32.
sanghirana (Pitta atricapilla) III Pit. R. 5.
sanghirensis (Cittura) III Al. R. 14.
" (Dacelo) " " 14.
" (Megapodius) VIII Ti. 73.
sanguinea (Cacatua) III P. 144; III P. R. 67.
" (Lophochroa) III P. 144.
" (Paradisea) I Cor. 84.
sanguineus (Charadrius) IV Cur. 41.
sanguinolentus (Calorhamphus) I Bucc. 73.
saphirinus (Psittacus) III P. 117.
Sarcelles VI A. 49.
Sarciophorus bilobus IV Cur. 64.
" pectoralis " " 65.
" pileatus " " 65.
Sarcogrammus goensis " " 68.
" inornatus " " 69.
Sarcorhamphus californianus II Vul. 2.
" condor " " 1.
" cuntur " " 1.
Sarkidiornis africana VI A. 74.
" africanus " " 74.
" melanota " " 74.
" regia " " 74.
" regius " " 74.
sarracura (Gallinula) V Ra. 15.
satrapa (Nisus) II Ass. 46.
Sasa cristata I Cuc. 81.

saturata (Scolopax) V Sc. 3, 4.
saturatus (Cuculus) I Cuc. 7.
saurophaga (Halcyon) III Al. 42.
Saurothera I Cuc. 39.
Saurothera bottae " " 40.
" californiana " " 40.
" dominicensis " " 40.
" jamaicensis " " 39.
" marginata " " 41.
" merlini " " 40.
" vetula " " 39, 40.
savignyi (Merops) III Me. 2.
scandiaca (Anas) VI A. 28.
" (Bubo) II Oti. 7.
" (Strix) " " 7.
scapularis (Ardea) V Ar. 42, 44.
" (Butorides) " " 42.
" (Uria) VI U. 18.
scapulata (Anas caesio-) VI A. 35.
scapulatus (Corvus) I Cor. 3.
" (Platycercus) III P. 89; III P. R. 37.
" (Psittacus) III P. 89.
Scardafella inca IV Col. 133.
" squamosa " " 133.
schimperi (Chroicocephalus) VI L. 40.
" (Columba) IV Col. 65.
" (Gelastes) VI L. 40.
" (Larus) " " 40.
schinzii (Pelidna) V Sc. 42.
" (Tringa) " " 33, 42.
schistacea (Ardea) V Ar. 23.
" (Asturina) II Ase. 8; II Acc. 103.
schistaceus (Herodias) V Ar. 23.
schisticeps (Palaeornis) III P. 82; III P. R. 35.
Schizaerhis leucogaster I Cuc. 78.
" zonura " " 79.
Schizorrhis concolor " " 78.
schlegeli (Domicella) III P. R. 56.
" (Halcyon) III Al. 25.
Schlegelia calva I Cor. 87.
schlegelii (Actitis) V Sc. 80.
" (Tanysiptera) III Al. R. 40.
Schoeniclus australis V Sc. 38.
" magnus " " 28.
schomburgkii (Corethrura) V Ra. 37.
" (Macropygia) " " 37.
" (Porzana) " " 37.
schwaneri (Pitta) III Pit. 14; III Pit. R. 17.
scintillans (Lorius) III P. 122.
" (Psittacus) " " 122.
scintillatus (Chalcopsitta) " " 122.
" (Eos) " " 122.
" (Lorius) III P. 122; III P. R. 56.
" (Psittacus) III P. 122.
sclateri (Loriculus) III P. 132; III P. R. 61.
" (Macropygia) V Ra. 37.
" (Psittacula) III P. 32.
" (Psittaculus) " " 32; III P. R. 8.
sclavus (Podiceps) VI U. 36.
scolopacea (Ardea) V Ra. 7.
" (Megalaima) I Bucc. 47.
" (Otis) IV Cur. 5.
" (Trachelotis) " " 5.
Scolopaces V Sc. 1.
scolopaceus (Aramus) V Ra. 7.
" (Bucco) I Bucc. 47.
" (Cuculus) I Cuc. 16.
" (Macrorhamphus) V Sc. 26.
scolopacina (Gallinago) " " 4.
scolopacinus (Gallinago) " " 4.
Scolopax " " 1.
Scolopax aegocephala " " 19.
" aequatorialis " " 10.
" arquata " " 85.
" australis " " 10.
" belgica " " 19.
" biclavata " " 13.
" borealis V Sc. 100, 101.
" brasiliensis " " 9.
" brehmi " " 6.
" brehmii " " 4.
" calidris " " 65.
" capensis " " 16.
" chinensis " " 16.
" cinerea " " 77.
" delamottei " " 4.
" delicata " " 6.
" douglasii " " 6.
" drummondi " " 6.
" fasciolata " " 6.
" fedoa " " 23.
" flavipes " " 69.
" frenata " " 9.
" fusca " " 64.
" gallinago " " 4, 6, 13.
" gallinagoides " " 6.
" gallinaria " " 4.
" gallinula " " 14.
" gigantea " " 6, 8.
" glottis " " 61.
" grisea " " 26.
" hardwickii " " 10.
" heterura " " 13.
" horsfieldii " " 13.
" hudsonica " " 22.
" incana " " 74.
" indica " " 2, 13.
" javanica " " 3.
" leucophaea " " 26.
" leucura " " 6.
" limosa " " 19.
" longirostris " " 10.
" maderaspatana " " 16.
" magellanica " " 11.
" major " " 7, 10.
" marmorata " " 23.
" media " " 4, 7.
" melanoleuca " " 63.
" meridionalis " " 8.
" minima " " 14.
" minor " " 3, 14.
" montagui " " 7.
" nemoricola " " 16.
" noveboracensis " " 26.
" paludosa " " 7, 8.
" palustris " " 7.

Scolopax paraguaiae V Sc. 9, 11.
" paykulli " " 26.
" pectinicauda " " 13.
" peregrina " " 4.
" picta " " 4.
" platyura " " 2.
" pygmaea " " 4.
" risoria " " 7.
" rusticola " " 2.
" rusticula " " 2.
" sabinii " " 4.
" saturata " " 3, 4.
" scoparia " " 2.
" semipalmatus " " 76.
" sinensis " " 17.
" solitaria " " 15.
" spectabilis " " 8.
" stagnatilis " " 14.
" stenoptera " " 13.
" stenura " " 12.
" sthenura " " 12.
" strenua " " 13.
" subarquata " " 31.
" terek " " 77.
" totanus " " 68.
" trachydactyla " " 6.
" tringa glareola " " 74.
" undulata " " 8, 74.
" uniclavatus " " 12.
" vociferus " " 63.
" wilsoni " " 6.
scoparia (Scolopax) " " 2.
Scops II Oti. 19; II Noc. 7.
Scops asio " " 26; " " 9.
" brasiliensis " " 21; " " 11.
" capensis " " 20; " " 14.
" carolinensis " " 26.
" (Ephialtes) " " 19.
" flammeola " " 27; II Noc. 14.
" gymnopodus " " 20.
" japonicus " " 20.
" lempyi " " 24; II Noc. 10.
" lettia " " 23; " " 9.
" leucotis " " 17.
" lophotes II Noc. 11.
" maccelli II Oti. 27.
" madagascariensis II Noc. 12.
" magicus II Oti. 22; II Noc. 11.
" mantis " " 25; " " 10.
" menadensis " " 20; " " 12.
" noctula " " 24; " " 10.
" novae zeelandiae " 27; " " 13.
" pennatus " " 14.
" rufescens II Oti. 25; " " 10.
" rutilus " " 12.
" semitorques II Oti. 23; " " 9.
" senegalensis " " 20.
" siaoënsis II Noc. 8, 13.
" (Strix) II Oti. 19.
" sunia " " 20; II Noc. 14.
" trichopsis " " 14.
" ustus " " 11.
" virgo V Ra. 6.
Scops watsonii II Noc. 11.
" zorca II Oti. 19; " " 13.
" zorca africanus " 20; " " 14.
" zorca asiaticus " " 20; " " 14.
scopulinus (Larus) VI L. 28.
" major (Larus) " " 29.
Scopus V I. 15.
" umbretta " " 15.
Scotocharis I Bucc. 88.
Scotopelia pelii II Str. 23.
scotoptera (Asturina) II Ase. 11; II Acc. 104.
scotopterus (Falco) " " 11.
scripta (Columba) IV Col. 155.
" (Geophaps) " " 155.
" (Phaps) " " 155.
scutatus (Buceros) I Buc. 1.
scutellata (Athene) II Str. 25.
scutulata (Anas) VI A. 64.
" (Strix) II Str. 25.
Scythrops I Cuc. 36.
Scythrops novae hollandiae " " 36.
Seccoucou " " 9.
secretarius (Astur) II Ass. 28; II Acc. 68.
" (Gypogeranus) II Ass. 28; II Acc. 68.
" (Serpentarius) II Ass. 28.
seena (Sterna) VI Ster. 15.
segetum (Anas) VI A. 112.
" (Anser) " " 112.
" (Corvus) I Cor. 27.
selaputo (Strix) II Str. 22.
seloputo (Uluia) " " 22; II Noc. 21.
seleucides (Diphyllodes) I Cor. 86.
semicoerulea (Alcedo) III Al. 29.
" (Dacelo) III Al. 29; III Al. R. 19.
semicollaris (Rhynchaea) V Sc. 18.
semifasciatus (Buceros) I Buc. 13.
semilarvata (Eos) III P. 124.
semilarvatus (Lorius) " " 124; III P. R. 57.
Semioptera wallacei I Cor. 91.
semipalmata (Anas) VI A. 92.
" (Limosa) V Sc. 26.
" (Symphemia) " " 76.
" (Tringa) " " 55.
semipalmatus (Aegialeus) IV Cur. 30.
" (Catoptrophorus) V Sc. 76.
" (Charadrius) IV Cur. 30.
" (Macrorhamphus) V Sc. 26.
" (Macrorhamphus griseus) V Sc. 26.
" (Pseudoscolopax) V Sc. 26.
" (Scolopax) " " 76.
" (Totanus) " " 76.
semiplumbeus (Rallus) V Ra. 11.
semirufa (Ardea) V Ar. 35.
semirufus (Momotus) III Mo. 5.
semisulcata (Crotophaga) I Cuc. 47.
semitorquata (Alcedo) III Al. 10; III Al. R. 5.
" (Columba) IV Col. 121.
" (Otis) IV Cur. 4.
semitorquatus (Platycercus) III P. 93; III P. R. 39.

semitorquatus (Psittacus) III P. 93.
" (Sparvius) II Ass. 52.
" (Sphenurus) IV Col. 62.
" (Turtur) " " 124.
semitorques (Otus) II Oti. 23.
" (Scops) " " 23; II Noc. 9.
senex (Corvus) I Cor. 22, 36.
" (Gymnocorvus) " " 36.
" (Megapodius) VIII Ti. 65.
" (Sterna) VI Ster. 37.
senicula (Uria) VI U. 21.
seniculus (Coccygus) I Cuc. 38.
" (Coccyzus) " " 38.
" (Cuculus) " " 38.
senilis (Amazona) III P. 62; III P. R. 29.
" (Psittacus) " " 62.
seniloides (Psittacus) III P. R. 29.
senegala (Parra) IV Cur. 68.
senegalensis (Alcedo) III Al. 29, 30.
" armata (Pluvialis) IV Cur. 61.
" (Centropus) I Cuc 71, 72.
" (Ciconia) V Cic. 7.
" (Colius) I Cuc. 80.
" (Columba) IV Col. 119.
" (Coracias) I Cor. 134.
" (Corythaix) I Cuc. 77.
" (Corvus) I Cor. 77.
" (Cursorius) IV Cur. 13.
" (Dacelo) III Al.30; IIIAl.R.21.
" (Ephippiorhynchus) V Cic. 7.
" (Glareola) IV Cur. 15.
" (Glaucopis) I Cor. 77.
" (Halcyon) III Al. 30; III Al. R. 21.
" (Heliornis) VI U. 49.
" (Ispida) III Al. 7.
" (Musophaga) I Cuc. 79.
" (Mycteria) V Cic. 7.
" (Oedicnemus) IV Cur. 20.
" (Otis) " " 5.
" (Podica) VI U. 49.
" (Podoa) " " 49.
" (Pogonias) I Bucc. 6.
" (Poicephalus) III P. 35.
" (Ptilostomus) I Cor. 78.
" (Rhigelura) VI U. 49.
" (Scops) II Oti. 20.
" (Sterna) VI Ster. 16.
" (Turtur) IV Col. 119.
" (Vanellus) IV Cur. 68.
senegallus (Falco) II Aq. 3.
senegalus (Lobivanellus) IV Cur. 68.
" (Psittacus) III P. 35; III P. R. 9.
septentrionalis (Cathartes) II Vul. 3.
" (Colymbus) VI U. 32.
septorum (Coccyzes) I Cuc. 42.
sepulcralis (Cuculus) " " 23.
Serendit III P. 133.
sericea (Pica) I Cor. 39.
sericeus (Falco) II Fal. 34; II Acc. 47.
Sericulus I Cor. 98.
Sericulus anaïs " " 98.
" aureus " " 98.
Sericulus melinus I Cor. 99.
Serisoma delalandei I Cuc. 46.
serpentarius (Gypogeranus) II Ass. 28.
" secretarius " " 28.
serranus (Larus) VI L. 35, 44.
serrata (Sterna) VI Ster. 25.
serrator (Mergus) VI A. 3.
" (Sula) VI Pe. 38.
serratus (Coccystes) I Cuc. 45.
" (Cuculus) " " 45.
" (Pezus) VIII Ti. 13.
serriana (Cua) I Cuc. 46.
setarius (Eclectus) III P. R. 22.
" (Psittacus) III P. 45.
severa (Arara) III P. 6; III P. R. 2.
severus (Falco) II Fal. 23; II Acc. 39.
" (Psittacus) III P. 6.
sexfasciatus (Astur) II Ass. 35.
" (Nisus) " " 35.
sexpennis (Paradisea) I Cor. 92.
sexsetacea (Paradisea) " " 92.
sganzini (Columba) IV Col. 43.
" (Funingus) " " 43.
" (Ptilopus) " " 43.
shahi (Falco) II Fal. 5.
sharpei (Ceryle) III Al. R. 1.
" (Ceycopsis) " " 33.
siaoënsis (Scops) II Noc. 8, 13.
sibilatrix (Agamia) V Ar. 36.
" (Anas) VI A. 46.
" (Ardea) V Ar. 36.
" (Buphus) " " 36.
sibilus (Cygnus) VI A. 78.
sibiricus (Bubo) II Oti. 7; II Noc. 4.
" (Charadrius) IV Cur. 46.
" (Morinellus) " " 46.
" (Strix) II Oti. 7.
sieberi (Cyanocitta) I Cor. 64.
sieboldii (Columba) IV Col. 61.
" (Sphenocercus) " " 61.
" (Treron) " " 61.
siffleurs (Coucous) I Cuc. 21.
signapa (Otus) II Oti. 6.
Sima flavirostris III Al. R. 15.
similis (Sterna) VI Ster. 33.
simillima (Pitta) III Pit. R. 13.
Simorhynchus VI U. 23.
Simorhynchus aleuticus " " 26.
" camtschaticus " " 25.
" cristatellus " " 25.
" monoceratus " " 26.
" psittaculus " " 24.
" pygmaeus " " 23.
Simotes albivertex I Cuc. 16.
" leucolophus " " 16.
simplex (Charadrius) IV Cur. 28.
" (Porphyrio) V Ra. 39.
simus (Cuculus) I Cuc. 27.
sinense (Syrnium) II Str. 21.
sinensis (Ardea) V Ar. 40.
" (Ardeola) " " 40.
" (Calocitta) I Cor. 70.
" (Centrococcyx) I Cuc. 66.

sinensis (Centropus) I Cuc. 65.
" (Cissa) I Cor. 68.
" (Coracias) " " 68.
" (Corvus) " " 16, 68, 76.
" (Cuculus) " " 69.
" (Dendrocitta) " " 76.
" (Galgulus) " " 68.
" (Garrulus) " " 60.
" (Glaucopis) " " 69, 76.
" (Graculus) VI Pe. 8.
" (Hydrophasianus) V Ra. 71.
" (Loriculus) III P. R. 60.
" (Parra) V Ra. 71.
" (Phalacrocorax carbo) VI Pe. 8.
" (Psittacus) III P. 40.
" (Scolopax) V Sc. 17.
" (Strix) II Str. 21.
" (Ulula) " " 21; II Noc. 21.
" (Urocissa) I Cor. 70.
sinuata (Anas) VI A. 87.
sirkie (Phoenicophaës) I Cuc. 56.
Sittace III P. 77.
Sittace acuticaudata " " 11.
" hyacinthina " " 2.
" nobilis " " 8.
" primoli " " 7.
Siy " " 61.
siy (Pionus) " " 61.
smaragdina (Microsittace) " " 22.
smaragdineus (Chalcites) I Cuc. 29.
" (Cuculus) " " 29.
smaragdinus (Chrysococcyx) " " 32.
" (Conurus) III P. 22; III P.R.6.
" (Coriphilus) " " 117.
" (Lamprococcocyx) I Cuc. 32.
" (Nanodes) III P. 117; III P. R. 54.
" (Porphyrio) V Ra. 53, 55.
" (Psittaculus) III P. 117.
" (Psittacus) " " 22.
smaragnotus (Porphyrio) V Ra. 53, 54.
smithii (Ailuroedes) I Cor. 117.
" (Astur) II Ass. 15.
" (Columba) IV Col. 155.
" (Falco) II Fal. 29; II Acc. 43.
" (Geophaps) IV Col. 155.
" (Merops) III Me. 9.
" (Phaps) IV Col. 155.
" (Procellaria) VI Proc. 22.
" (Ptilorhynchus) I Cor. 117.
smyrnensis (Alcedo) III Al. 28.
" (Halcyon) III Al. R. 18.
sociabilis (Ibicter) II Pol 7; II Acc. 138.
" (Herpetotheres) II Pol. 8.
" (Pluvianellus) IV Cur. 42.
" (Rosthramus) II Pol. 7.
solandri (Calyptorhynchus) III P. 153; III P. R. 69
" (Cookilaria) VI Proc. 12.
" (Procellaria) " " 12.
" (Psittacus) III P. 152, 153.
solitaire (Coucou) I Cuc. 11.
solitaria (Alcedo) III Al. 17; III Al. R. 9.
solitaria (Alcyone) III Al. 17.
" (Gallinago) V Sc. 15.
" (Halcyone) III Al. 17.
" japonica (Spilura) V Sc. 15.
" (Scolopax) " " 15.
" (Spilura) " " 15.
" (Tringa) V Sc. 73.
solitarius (Circaëtus) II Asc. 8.
" (Coriphilus) III P. 116.
" (Corvus) I Cor. 24.
" (Cuculus) I Cuc. 11.
" (Lorius) III P. R. 59.
" (Nanodes) III P. 116; III P.R.59.
" (Pezophaps) IV St. 4.
" (Psittacus) III P. 116.
" (Tinamus) VIII Ti. 8, 10.
" (Totanus) V Sc. 71.
soloënsis (Falco) II Ass. 44; II Acc. 97.
" (Nisus) " " 44; " " 97.
solstitialis (Conurus) III P. 17; III P. R. 4.
" (Psittacus) " " 17.
Somateria mollissima VI A. 14.
" spectabilis " " 13.
somnolentus (Bucco) I Bucc. 84.
sondaica (Strix) II Oti. 24.
sonnerati (Cuculus) I Cuc. 23.
sonneratii (Cuculus) " " 12.
" (Strix) II Noc. 25.
sonnini (Guêpier) III Me. 10.
sordida (Amazona) III P. 61; III P. R. 28.
" (Cyanocitta) I Cor. 64.
" (Pitta) III Pit. R. 5.
sordidus (Garrulus) I Cor. 64.
" (Halcyon) III Al. 32; III Al. R. 21.
" (Psittacus) III P. 61.
soresbyi (Larus) VI L. 33.
sosove (Psittacus) III P. 28.
Soui VIII Ti. 24.
soui (Tinamus) " " 24.
sovi (Crypturus) " " 24.
" (Tetrao) " " 24.
spadicea (Columba) IV Col. 98.
" (Hemiphaga) " " 98.
" (Strix) II Str. 35.
spadiceocephalus (Psittacus) III P. 43.
sparrmannii (Indicator) I Cuc. 2.
" (Psittacus) III P. 117.
sparsa (Anas) VI A. 49.
sparverinus (Hiracococcyx) I Cuc. 15.
sparveroides (Cuculus) " " 15.
" (Falco) II Fal. 30.
sparverius (Falco) " " 30; II Acc. 45.
Sparvius cirrhocephalus II Ass. 38.
" melanoleucos " " 52.
" niger II Acc. 96.
" niveus II Ass. 20.
" platypterus II But. 20.
" ruficollis II Acc. 98.
" semitorquatus II Ass. 52.
Spatherodia flavipes V Cic. 24.
Spatula clypeata VI A. 33
" maculata " " 35.
spatules (Canards-) " " 33.

speciosa (Ardea) V Ar. 34.
" (Ardea leucoptera) " " 34.
" (Columba) IV Col. 70.
" (Diphyllodes) I Cor. 86.
" (Kitta) " " 68.
" (Lepidoenas) IV Col. 70.
" (Paradisea) I Cor. 86.
" (Upupa) " " 94.
speciosus (Buphus) V Ar. 34.
" (Charadrius) IV Cur. 62.
" (Corvus) I Cor. 68.
" (Epimachus) " " 94.
" (Hoplopterus) IV Cur. 62.
" (Lorius) III P. 119.
" (Ptilopus) IV Col. 27.
" (Vanellus) IV Cur. 62.
spectabilis (Anas) VI A. 13.
" (Astur) II Ass. 27; II Acc. 68.
" (Fuligula) VI A. 13.
" (Scolopax) V Sc. 8,
" (Somateria) VI A. 13.
specularis (Anas) " " 46.
specularoides (Anas) " " 39.
speculiferus (Totanus) V Sc. 76.
Spelectos corythaix I Cuc. 77.
spermologus (Corvus) I Cor. 33.
Sphecothera " " 115.
Sphecothera viridis " " 115.
Sphecotheres australis " " 115.
" canicollis " " 115.
" flaviventris " " 116.
" maxillaris " " 115.
" virescens " " 115.
Spheniscus VI U. 1.
Spheniscus adeliae " " 4.
" antarcticus " " 5.
" antipodes " " 9.
" catarractes " " 8.
" chrysocome " " 6.
" chrysolophus " " 7.
" demersus " " 10.
" diadematus " " 8.
" humboldtii " " 10.
" minor " " 10.
" naevius " " 10.
" papua " " 5.
" patagonicus " " 3.
" pennantii " " 3.
Sphenocercus apicaudus IV Col. 62.
" cantillans " " 60.
" korthalsii " " 60.
" sieboldii " " 61.
" sphenurus " " 60.
sphenorhyncha (Abdimia) V Cic. 5.
Sphenura apicauda IV Col. 62.
" (Columba) " " 60.
" (Procellaria) VI Proc. 25.
" (Treron) IV Col. 60.
" (Vinago) " " 60.
sphenurus (Haliaetus) II Aq. 14, 21; II Acc. 123.
" (Milvus) II Aq. 21.
" (Nisus) II Acc. 92.
Sphenurus oxyurus IV Col. 62.
" (Puffinus) VI Proc. 25.
" semitorquatus IV Col. 62.
" (Sphenocercus) " " 60.
" (Thiellus) VI Proc. 25.
spilogaster (Spizaetus) II Ass. 7, 12; II Acc. 59.
spiloptera (Columba) IV Col. 133.
spilopterus (Centropus) I Cuc. 61.
Spilornis II But. 25.
Spilornis hoya II Acc. 113.
" orientalis " " 113.
" rufipectus " " 114.
spilorrhoa (Carpophaga) IV Col. 98.
Spilura horsfieldii V Sc. 13.
" solitaria " " 15.
" solitaria japonica " " 15.
spinicauda (Anas) VI A. 38.
" (Dafila) " " 38.
" (Lestris) VI L. 49.
spinicollis (Carphibis) V I. 12.
" (Ibis) " " 12.
spinosa (Anas) VI A. 9, 93.
spinosus (Charadrius) IV Cur. 60.
" (Hoplopterus) " " 61.
" (Melanorhynchus) I Bucc. 73.
" (Philomachus) IV Cur. 61.
" (Vanellus) " " 60.
spinturnix (Cincinnurus) I Cor. 89.
spixii (Charadrius) IV Cur. 63.
" (Stephanilyx) " " 63.
" (Vanellus) " " 63.
Spizaëtus II Ass. 1; II Acc. 51.
Spizaëtus africanus " " 59.
" alboniger " " 52.
" andamanensis " " 52.
" atricapillus II Ass. 14.
" bellicosus II Ass. 5; II Acc. 59.
" borneoensis " " 10.
" braccatus " " 2; II Acc. 59.
" cirratus " " 6; " " 52.
" coronatus " " 3; " " 59.
" fasciolatus " " 9.
" gurneyi " " 14; II Acc. 60; II Aq. 11.
" kieneri II Ass. 7; II Acc. 58.
" kienerii " " 11.
" limnaëtus " " 7.
" melanoleucus " " 14; II Acc. 60; II Ass. 5.
" nanus II Acc. 52.
" niveus II Ass. 7.
" occipitalis " " 1; II Acc. 51.
" ornatus II Ass. 2; II Acc. 52, 59.
" spilogaster II Ass. 7, 12; II Acc. 59.
" tyrannus " " 2; II Acc. 52, 59.
" zonurus " " 12.
Spizastur atricapillus " " 14.
splendens (Corvus) I Cor. 10, 12.
" (Platycercus) III P. 88; III P. R. 36.
splendida (Euphema) III P. 102; III P. R. 41.

splendidus (Corvus) I Cor. 50.
" (Psittacus) III P. 96.
sponsa (Aix) VI A. 71.
" (Anas) " " 71.
squamatus (Lorius) III P. 124; III P. R. 56.
" (Mergus) VI A. 2.
squamiceps (Capito) I Bucc. 70
" (Trachyphonus) " " 70.
squamigera (Atelornis) I Cor. 138.
" (Brachypteracias) " " 138.
squamipila (Athene) II Str. 27.
" (Noctua) " " 27; II Noc. 22.
squamosa (Columba) IV Col. 133.
" (Geopelia) " " 133.
" (Scardafella) " " 133.
squamosus (Conurus) III P. 23.
" (Psittacus) " " 23.
squamulata (Strix) II Str. 15.
squamulosus (Ptilonorhynchus) I Cor. 117.
Squatarola australis IV Cur. 54.
" cinerea " " 54.
" helvetica " " 54.
" rhynchomega " " 54.
" (Tringa) " " 54.
" urvilli " " 48.
" (Vanellus) " " 53.
" wilsoni " " 54.
stagnatilis (Ardetta) V Ar. 43.
" (Butorides) " " 43.
" (Lymnocryptes) V Sc. 14.
" (Scolopax) " " 14.
" (Totanus) " " 28, 68.
stairi (Megapodius) VIII Ti. 64.
stairii (Caloenas) IV Col. 162.
" (Leptopila) " " 162.
" (Phlegoenas) " " 162.
stanleyana (Grus) V Ra. 6.
stanleyanus (Anthropoides) " " 6.
stanleyi (Otis) IV Cur. 7.
" (Platycercus) III P. 97.
Starnoenas IV Col. 163.
Starnoenas albifacies " " 164.
" cristata " " 164.
" cuprea " " 165.
" cyanocephala " " 166.
" linearis " " 164.
" montana " " 165.
" mystacea " " 164.
" terrestris " " 166.
" violacea " " 165.
St. Cuthberti (Anas) VI A. 14.
stellaris (Ardea) V Ar. 47.
" (Botaurus) " " 47.
" capensis (Ardea) " " 48.
stellata (Megaceryle) III Al. 4.
stellatus (Calyptorhynchus) III P. 152.
" (Colymbus) VI U. 32.
" (Mergus) VI A. 6.
stelleri (Anas) " " 15.
" (Eniconetta) " " 15.
" (Garrulus) I Cor. 62.
" (Polysticta) VI A. 15.
Stelleria dispar " " 15.
stenodactylus (Phalaropus) V Sc. 60.
stenoptera (Scolopax) " " 13.
stenozoma (Baza) II Per. 5; II Acc. 133.
stenura (Gallinago) V Sc. 12.
" (Scolopax) " " 12.
" (Zenaida) IV Col. 142.
stephani (Chlorophapsis) " " 151.
" (Peristera) " " 151.
Stephanibyx coronatus IV Cur. 62.
" spixii " " 63
stephensi (Pogonia) I Bucc. 7.
Stercorarius VI L. 45.
Stercorarius antarcticus " " 46.
" catarractes " " 45.
" cephus " " 49.
" parasiticus " " 47.
" pomarinus " " 47.
Sterna VI Ster. 1, 5.
Sterna acuticauda " " 21.
" acuflavida " " 5.
" affinis " " 6, 34.
" alba " " 35.
" albifrons " " 24.
" albigena " " 20.
" albostriata " " 33.
" anglica " " 34.
" antarctica " " 21, 26.
" aranea " " 34.
" arctica " " 15.
" argentata " " 15.
" argentea " " 23.
" aurantia " " 15.
" bengalensis " " 6.
" bergii " " 5, 11.
" bernsteinii " " 9.
" bicuspis " " 19.
" boysii " " 5.
" brachypus " " 16.
" brevirostris " " 15.
" camtschatica " " 24.
" candida " " 35.
" cantiaca " " 5, 11.
" caspia " " 13.
" cayana " " 8.
" cayennensis " " 8.
" chloropoda " " 12.
" cinerea " " 38.
" coccinirostris " " 16.
" cristata " " 7.
" delamottei " " 32.
" dougalli " " 24.
" douglasii " " 24.
" elegans " " 7.
" fissipes " " 29, 31.
" fluviatilis " " 17, 35.
" forsteri " " 19.
" frenata " " 23.
" frontalis " " 24.
" fuliginosa " " 25, 26.
" fuligula " " 26.
" fusca " " 36.
" galericulata " " 7, 11.
" gracilis " " 19.

Sterna grisea VI Ster. 33.
" gouldii " " 25.
" guttata " " 25.
" havelli " " 29.
" hirundo " " 15, 17.
" hybrida " " 32.
" inca " " 39.
" indica " " 33.
" infuscata " " 25, 26.
" javanica " " 21.
" leucocapilla " " 37.
" leucoceps " " 36.
" leucogenys " " 32.
" leucopareia " " 32.
" leucoptera " " 31.
" longipennis " " 23.
" lunata " " 27.
" macrotarsa " " 34.
" macroura " " 15.
" magnirostris " " 12.
" maxuriensis " " 6.
" media " " 6.
" melanaucha " " 28
" melanogastra " " 21.
" melanoptera " " 25.
" melanorhyncha " " 24.
" melanotis " " 13.
" meridionalis " " 15, 34.
" minuta " " 21, 23.
" naevia " " 29, 31.
" nereis " " 21.
" nigra " " 29, 30.
" nilotica " " 17.
" nitzschii " " 16.
" panaya " " 26.
" panayensis " " 26.
" paradisaea " " 15.
" paradisea " " 24.
" pelecanoides " " 9.
" philadelphia VI L. 41.
" philippina VI Ster. 36.
" pikei " " 24.
" pileata " " 36.
" plumbea " " 29.
" poliocerca " " 12.
" pykii " " 24.
" regia " " 7.
" ressa " " 9.
" seena " " 15.
" senegalensis " " 16.
" senex " " 37.
" serrata " " 25.
" similis " " 33.
" stolida " " 36.
" striata " " 5.
" sumatrana " " 21.
" superciliaris " " 23.
" surinamensis " " 29.
" tenuirostris " " 36, 37.
" torresii " " 6.
" trudeaui " " 29.
" velox " " 11, 24.
" wilsonii " " 17.

Sternae VI Ster. 1.
Sternula " " 14.
Sternula australis " " 21.
" melanauchen " " 28.
" minuta " " 21.
" orientalis " " 21.
" sumatrana " " 23.
steursii (Columba) IV Col. 169.
stevensonii (Accipiter) II Acc. 74.
sthenura (Scolopax) V Sc. 12.
Sticticarbo gaimardii VI Pe. 22.
" punctatus " " 21.
stictocephalus (Haliaetus) " " 13.
" (Microcarbo) " " 13.
Stictoenas IV Col. 71.
Stictoenas albitorques " " 73.
" antarctica " " 74.
" arquatricula " " 72.
" arquatrix " " 72.
" guinea " " 72.
" hodgsonii " " 71.
" phaeonotus " " 73.
" polleni " " 72.
" trigonigera " " 73.
Stictonetta naevosa VI A. 63.
Stictopelia cuneata IV Col. 133.
stigmatus (Loriculus) IIIP. 131; IIIP.R. 60.
" (Psittacula) III P. 131.
" (Psittacus) " " 131.
Stiltia grallaria IV Cur. 18.
stolatus (Charadrius) " " 62.
stolida (Sterna) VI Ster. 36.
stolidus (Anous) " " 36.
" (Charadrius) IV Cur. 46.
" (Rallus) V Ra. 28.
strenua (Athene) II Str. 40.
" (Noctua) " " 40; II Noc. 31.
" (Scolopax) V Sc. 13.
strenuus (Cuculus) I Cuc. 15.
" (Hiracococcyx) " " 15.
strepera (Anas) VI A. 48.
" arguta I Cor. 123.
" (Chaulelasmus) VI A. 48.
" (Coracias) I Cor. 124.
" (Coronica) " " 124.
" fuliginosa " " 125.
" (Gracula) " " 124.
" graculina " " 124.
" melanoptera " " 123.
" plumbea " " 123.
" versicolor " " 123.
strepitans (Columbina) IV Col. 137.
" (Pitta) III Pit. 10; III Pit. R. 13.
" (Strix) II Oti. 12.
Strepsilas IV Cur. 42.
Strepsilas collaris " " 43.
" interpres " " 43.
" melanocephalus " " 43.
" novae zeelandiae " " 45.
" virgata " " 45.
Streptocitta caledonica I Cor. 1.
streperus (Cracticus) " " 124.
striata (Columba) IV Col. 131.

striata (Geopelia) IV Col. 131.
" (Hypotaenidia) V Ra. 24.
" (Lypornix) I Bucc. 85.
" (Sterna) VI Ster. 5.
" (Upupa) I Cor. 94.
" (Uria) VI U. 18.
striatus (Bucco) I Bucc. 85.
" (Colius) I Cuc. 80.
" (Colymbus) VI U. 32.
" (Cuculus) I Cuc. 7, 12.
" (Nisus) II Ass. 28.
" (Oriolus) I Cor. 112.
" (Rallus) V Ra. 24.
" (Totanus) V Sc. 65.
stricklandii (Fulica) V Ra. 63.
" (Gallinago) V Sc. 15.
" (Xylocota) " " 15.
strictipennis (Geronticus) V I. 14.
" (Ibis) " " 14.
" (Threskiornis) " " 14.
stridula (Strix) II Str. 12.
Striges " " 1.
Strigiceps II Cir. 1.
strigilatus (Bucco) I Bucc. 82.
" (Gymnops) II Pol. 5.
" (Vanellus) IV Cur. 68.
strigirostris (Didunculus) IV Col. 167.
" (Gnathodon) " " 167.
Strigopsis III P. 107; III P. R. 43.
Strigopsis habroptilus IIIP.107; IIIP.R.43.
strigulosus (Crypturus) VIII Ti. 27.
" (Tinamus) " " 27.
striolata (Alcedo) III Al. 31.
" (Dacelo) " " 31; IIIAl.R.21.
" (Halcyon) " " 31.
Strix II Str. 1; II Noc. 15.
Strix acadia " " 18.
" acadica II Str. 41.
" africana II Oti. 14; II Noc. 15.
" albescens " " 7.
" albifrons II Noc. 18.
" albimarginata II Str. 17.
" aluco " " 12.
" amaurotis II Noc. 16.
" americana II Str. 5
" ascalaphus II Oti. 8.
" asio " " 26.
" atricapilla " " 21.
" badia II Str. 23; II Noc. 17.
" bakkamuna " " 16.
" barbata II Str.9.
" brachyotus II Oti. 3.
" brama II Str. 29.
" bubo II Oti. 7.
" candida II Str. 6, 43; II Noc. 17.
" capensis " " 6; " " 17.
" carolinensis II Oti. 26.
" castanops II Str. 7; II Noc. 17.
" castanoptera " " 34.
" cayennensis " " 14.
" ceylonensis II Oti. 18, 19.
" choliba " " 21.
" chrysosticta II Str. 15.
Strix cinerea II Str. 9.
" coromandra II Oti. 9.
" cristata " " 16.
" crucigera " " 21.
" cunicularia II Str. 30.
" cyclops " " 6.
" delicatula " " 4; II Noc. 16.
" dominicensis " " 30.
" eluta " " 32.
" erythroptera " " 34.
" fasciata " " 14.
" ferox " " 32.
" ferruginea " " 30.
" flammea " " 15; IINoc.15.
" flammea americana IIStr.4; " " 16.
" forsteri II Noc. 16.
" frontalis " " 18.
" funerea II Str. 8, 42.
" furcata " " 5.
" fuscescens II Str. 11.
" griseata II Oti. 16.
" guteruhi II Str. 26.
" hardwickii II Oti. 19.
" hirsuta II Str. 25.
" hirsuta japonica " " 25.
" huhula " " 17.
" hylophila " " 13, 14.
" indica II Noc. 15.
" indranee II Str. 19.
" infuscata " " 31.
" javanica " " 4; II Noc. 15.
" ketupa II Oti. 18.
" kirtlandii II Noc. 18.
" lactea II Oti. 11.
" lapponica II Str. 9.
" larvata " " 17.
" lempyi II Oti. 23, 24.
" leptogrammica II Str. 20.
" leschenaltii II Oti. 19.
" leucotis " " 17.
" lettia " " 23.
" licua II Str. 36, 37.
" lineata " " 17.
" litturata " " 10
" longimembris " " 6
" longirostris II Oti. 2.
" lugubris II Str. 25.
" lulu II Noc. 16.
" magellanica II Oti. 10.
" macrocephala II Str. 10.
" macrorhyncha II Oti. 10.
" macroura II Str. 10.
" maculosa II Oti. 2, 14.
" melanonota II Noc. 20.
" meridionalis II Str. 29.
" mexicana II Oti. 2.
" minutissima II Str. 32.
" nana " " 31.
" nebulosa " " 11.
" nisoria " " 42.
" nivea " " 43.
" noctua " " 28.
" noctula II Oti. 24.

Strix novae hollandiae II Str. 6; II Noc. 17.
" novae zeelandiae II Str. 38.
" nyctea " " 43.
" occipitalis " " 36.
" orientalis II Str. 21; II Oti. 12.
" otus " " 1.
" pagodarum II Str. 22.
" passerina " " 8, 28, 41.
" passerinoides " " 31.
" pelii " " 23.
" perlata " " 5, 36.
" personata II Str. 6, 17; II Noc. 17.
" perspicillata II Str. 17.
" poënsis II Noc. 15.
" portoricensis II Oti. 21.
" pratincola II Str. 5.
" pulsatrix " " 17; II Noc. 20.
" pumila " " 31, 32; " " 29.
" punctata " " 6.
" pusio " " 32.
" radiata " " 34.
" richardsonii II Noc. 18.
" rosenbergii " " 16.
" rufescens " " 10.
" scandiaca II Oti. 7.
" scops " " 19.
" scutulata II Str. 25.
" selaputo " " 22.
" sibiricus II Oti. 7.
" sinensis II Str. 21.
" sondaica II Oti. 24.
" sonneratii II Noc. 25.
" spadicea II Str. 35.
" squamulata " " 15.
" strepitans II Oti. 12.
" stridula II Str. 12.
" sumatrana II Oti. 12.
" superciliosa II Str. 17.
" sylvatica " " 36.
" tenebricosa " " 7; II Noc. 17.
" tengmalmi " " 8.
" thomensis II Noc. 15.
" torquata II Str. 17.
" ulula " " 42.
" undulata II Oti. 21.
" uralensis II Str. 10.
" virginiana II Oti. 10.
" walleri II Noc. 16.
" zorca II Oti. 19.
strophiatus (Archibuteo) II But. 3.
" (Clorhynchus) V Sc. 102.
struthersii (Ibidorhynchus) " " 102.
" (Numenius) " " 102
Struthidea cinerea I Cor. 73.
" (Glaucopis) " " 73.
Struthio IV St. 2, 6.
Struthio camelus " " 6.
" casuarius " " 9.
" (Grus) V Ra. 4.
" rhea IV St. 6.
sturmii (Ardea) V Ar. 45
" (Ardetta) " " 45.
stygius (Nyctalopus) II Oti. 6.
" (Otus) II Oti. 6; II Noc. 4.
Stylorhynchus erythrofrons III P. 22.
subarquata (Ancylocheilus) V Sc. 31.
" (Numenius) " " 31.
" (Pelidna) " " 31.
" (Scolopax) " " 31.
" (Tringa) " " 31.
Subbuteo II Fal. 22; II Acc. 38.
subbuteo (Falco) " " 22.
" frontatus (Falco) II Fal. 22; II Acc. 39.
subcristata (Baza) II Per. 4; II Acc. 135.
" (Pedeaithyia) VI U. 38.
subcristatus (Colymbus) " " 38.
" (Lepidogenys) II Per. 4.
" (Tinamus) VIII Ti. 11.
" (Tinamus major) " " 15.
" (Trachypelmus) " " 13.
sublunatus (Buceros) I Buc. 6.
subminuta (Tringa) V Sc. 48.
subniger (Falco) II Fal. 17; II Acc. 37.
subrufescens (Momotus) III Mo. 3.
subruficollis (Tringa) V Sc. 79.
subrufinus (Charadrius) IV Cur. 41.
subsulfurea (Barbatula) I Bucc. 44.
subsulphurea (Megalaima) " " 44.
subsulphureus (Bucco) " " 43.
" (Trachyphonus) " " 44.
subtectus (Bucco) " " 79.
subulatus (Todus) III Mo. 8.
subulirostris (Chroicocephalus) VI L. 37.
suckleyi (Cerorhina) VI U. 26.
" (Larus) VI L. 27.
suinda (Ulula) II Noc. 19.
Sula VI Pe. 37.
Sula alba " " 37.
" americana " " 37.
" australis " " 38.
" bassana " " 37.
" brasiliensis " " 41.
" capensis " " 39.
" cyanops " " 39.
" dactylatra " " 39.
" (Dysporus) " " 41.
" fiber " " 41.
" fusca " " 41.
" lefevri " " 38.
" leucogastra " " 41.
" melanura " " 39.
" (Pelecanus) " " 41.
" personata " " 39.
" piscatrix " " 40.
" rubripes " " 40.
" serrator " " 38.
sulaënsis (Circaëtus) II Acc. 114.
" (Circaëtus rufipectus) II Acc. 114.
" (Nisus) " " 76.
" (Urospiza) " " 76.
sulcatus (Buceros) I Buc. 10.
sulcirostris (Buceros) " " 11.
" (Crotophaga) I Cuc. 47.
" (Graculus) VI Pe. 13.

sulcirostris (Haliaeus) VI Pe. 13
" (Phalacrocorax) " " 13.
" (Pogonia) I Bucc. 1.
" (Rallus) V Ra. 22.
" (Tockus) I Buc. 11.
sulphuratus (Micropogon) I Bucc. 65.
sulphurea (Cacatua) III P. 135, 137; III P. R. 66.
sulphureus (Capito) I Bucc. 59.
" (Psittacus) III P. 137, 140.
sultaneus (Bubo) II Oti. 11.
" (Falco) II Fal. 5.
sumatrana (Ardea) V Ar. 3.
" (Sterna) VI Ster. 21.
" (Sternula) " " 23.
" (Strix) II Oti. 12.
" (Typhon) V Ar. 3.
sumatranus (Buceros rhinoceros) I Buc. 4.
" (Cuculus) I Cuc. 53.
" (Phoenicophaës) " " 53.
" (Psittacus) III P. R. 25.
sumatrensis (Avicida) II Per. 5; II Acc. 135.
" (Cuculus) I Cuc. 52.
sundewallii (Carpophaga) IV Col. 87.
sunia (Scops) II Oti. 20, II Noc. 14.
superba (Columba) IV Col. 30.
" (Lamprotreron) " " 30.
" (Lophorina) I Cor. 96.
" (Paradisea) " " 96.
" (Upupa) " " 94.
superbus (Epimachus) " " 94.
" (Lorius) III P. 119.
" (Ptilinopus) IV Col. 30.
" (Ptilopus) " " 23, 30.
superciliaris (Asturina) II Ase. 12; II Acc. 104.
" (Eumomota) III Mo. 7.
" (Leucopternis) II Ase. 12; II Acc. 104.
" (Momotus) III Mo. 7.
" (Noctua) II Noc 25.
" (Oedicnemus) IV Cur. 19.
" (Rallus) V Ra. 31, 32.
" (Sterna) VI Ster. 23.
" (Ulula) II Noc. 19.
superciliosa (Alcedo) III Al. 6; III Al. R. 2.
" (Anas) VI A. 42.
" (Ceryle) III Al. 6.
" (Gallinula) V Ra. 32.
" (Mormon) VI U. 25.
" (Ortygometra) V Ra. 32.
" (Parra) " " 67.
" (Phaleris) VI U 25.
" sandwichensis (Anas) VI A. 42.
" (Strix) II Str. 17.
superciliosus (Centropus) I Cuc. 72.
" (Circus) II Cir. 8.
" (Dasylophus) I Cuc. 51.
" (Phoenicophaës) " " 51.
suratensis (Columba) IV Col. 129.
" (Turtur) " " 129.
surda (Psittacula) III P. 70; III P. R. 31.
surdus (Psittacus) " " 70
surinamensis (Heliornis) VI U. 49.
" (Plotus) " " 49.
" (Sterna) VI Ster. 29.
Surnia funerea II Str. 42.
Surniculus I Cuc. 28
swainsonii (Buteo) II But. 3; II Acc. 107.
" (Circus) II Cir. 4; " " 49.
" (Elanus) II Mil. 9; " " 131.
" (Gampsonyx) II Mil. 9.
" (Ptilinopus) IV Col. 4.
" (Ptilopus) " " 4.
" (Trichoglossus) III P. 108.
swanghi (Bouron) V Sc 100.
swarbeg (Uria) VI U. 15.
swinhoei (Cuculus) I Cuc. 7.
Sylbeocyclus antarcticus VI U. 47.
" lineatus " " 47.
" podiceps " " 47.
Sylochelidon caspia VI Ster. 13.
" cayennensis " " 8.
" polyocerca " " 12.
sylvatica (Athene) II Str. 36.
" (Carpophaga) IV Col. 86.
" (Columba) " " 86.
" (Noctua) II Str. 36; II Noc. 28.
" (Strix) " " 36.
sylvestris (Accipiter) II Acc. 91.
" (Anser) VI A. 109, 112.
sylvia (Dacelo) III Al. 47; III Al. R. 42.
" (Tanysiptera) III Al. 47; III Al. R. 42.
sylvicola (Cryptura) VIII Ti. 29.
" (Ephialtes) II Noc. 8.
syma (Dacelo) III Al. 23.
Symphemia atlantica V Sc. 76.
" semipalmata " " 76.
syngenicos (Numenius) " " 92.
Synthliborhamphus antiquus VI U. 22.
" temminckii " " 22.
Syphestis bengalensis IV Cur. 10.
syrmatophora (Egretta) V Ar. 17.
" (Herodias) " " 17.
Syrnium II Str. 12.
Syrnium albigularis " " 16.
" albotarse " " 13.
" aluco " " 12.
" fulvescens II Noc. 19.
" maccabrum II Str. 16.
" nebulosum " " 11.
" ocellatum " " 21.
" philippense II Oti. 14.
" polygrammicum II Str. 14.
" sinense " " 21.
" virgatum " " 15.

T.

tabuensis (Platycercus) III P. 88; III P. R. 36.
" (Psittacus) III P. 88, 89; III P. R. 37.
Taccocua I Cuc. 56.
Tachard II But. 5
tachardus (Buteo) II But 5.

tachardus (Pernis) II Acc. 131.
tachiro (Falco) II Ass. 46.
„ (Nisus) „ „ 46; II Acc. 96.
Trachybaptus capensis VI U. 43.
„ minor „ „ 43.
Tachydromus burchellii IV Cur. 13.
„ orientalis „ „ 13.
„ temminckii „ „ 13.
Tachypetes aquilus VI Pe. 2.
„ minor „ „ 3.
Tachytriorchis II But. 13.
tacsanowskia (Micropalama) V Sc. 26.
tadorna (Anas) VI A. 67.
„ bellonii „ „ 67.
„ familiaris „ „ 67.
„ gibbera „ „ 67.
„ littoralis „ „ 67.
„ maritima „ „ 67.
„ radja „ „ 69.
„ vulpanser „ „ 67.
tadornoides (Anas) „ „ 65.
„ (Casarca) „ „ 65.
taeniata (Aptenodytes) VI U. 5.
tahiticus (Numenius) V Sc. 94.
tahitiensis (Numenius) „ „ 91, 94.
taïtensis (Charadrius) IV Cur. 50.
„ (Columba) IV Col. 15
„ (Cuculus) I Cuc. 21.
„ (Eudynamis) „ „ 21.
„ (Pluvialis) IV Cur. 50.
„ (Ptilinopus) IV Col. 14.
taitianus (Nanodes) III P. 117; III P.R. 53.
„ (Psittacus) „ „ 117.
Tallegallus VIII Ti. 79.
Tallegallus bruynii „ „ 82.
„ cuvieri „ „ 53, 80.
„ cuvieri jobiensis „ „ 82.
„ jobiensis „ „ 82.
„ lathamii „ „ 53, 79.
„ pyrrhopygius „ „ 82.
talpacoti (Columba) IV Col. 136.
„ (Peristera) „ „ 136.
Talpacotia cinnamomea „ „ 136.
„ rufipennis „ „ 136.
„ godinae „ „ 136.
tamajac (Tamatia) I Bucc. 84.
Tamatia à collier noir „ „ 76.
„ â gorge rousse „ „ 79.
„ à plastron noir „ „ 76.
„ à plastron noir (Petit) „ „ 78.
„ bicincta „ „ 81.
„ bitorquata „ „ 81.
„ brun „ „ 85.
„ (Bucco) „ „ 79.
„ (Chaunornis) „ „ 79.
„ collaris „ „ 76.
„ erythropygos „ „ 67.
„ gularis „ „ 81.
„ leucotis „ „ 82.
„ maculata „ „ 79.
„ (Nyctactes) „ „ 79.
„ pulmentum „ „ 80.
„ tamajac „ „ 84.
Tanagra macrura I Cuc. 80.
Tanas II Per. 6.
Tantalus V Cic. 16.
Tantalus albicollis V I. 7.
„ calvus „ „ 11.
„ cayennensis „ „ 8.
„ cristatus „ „ 6.
„ falcinellus „ „ 2.
„ gangeticus V Cic. 17.
„ ibis „ „ 18.
„ indicus „ „ 17.
„ lacteus „ „ 18.
„ leucocephalus „ „ 17.
„ loculator „ „ 17.
„ melanocephalus V I. 14.
„ melanopis „ „ 7.
„ plumicollis V Cic. 17.
„ rhodinopterus „ „ 18.
„ ruber V I. 6.
Tanygnathus III P. 46.
Tanygnathus affinis „ „ 48.
„ albirostris III P. R. 25.
„ lucionensis III P. 48.
„ megalorhynchus „ „ 46.
„ mülleri „ „ 48.
tanypterus (Falco) II Fal. 16; II Acc. 36.
Tanysiptera III Al. 43; III Al. R. 34.
„ acis „ „ 36.
„ carolinae „ „ 41.
„ dea III Al. 43; „ „ 34.
„ doris „ „ 46; „ „ 39.
„ elliotii „ „ 40.
„ emiliae „ „ 39.
„ galeata III Al. 43; III Al. R. 35.
„ hydrocharis III Al. 46; III Al. R. 41.
„ iris III Al. 43.
„ lepida „ „ 48.
„ margarethae III Al. 43; III R. 37.
„ naïs III Al. R. 36.
„ nympha III Al. 43; III Al. R. 41.
„ riedeli III Al. R. 40.
„ sabrina III Al. 46; III Al. R. 39.
„ schlegelii III Al. R. 40.
„ sylvia III Al. 47; III Al. R. 42.
tao (Tinamus) VIII Ti. 8, 10.
taranta (Psittacula) III P. 72; III P. R. 31.
„ (Psittacus) „ „ 72.
tarda (Otis) IV Cur. 2.
tarrali (Carpophaga) IV Col. 87.
tataricus (Charadrius) IV Cur. 46.
Tataupa VIII Ti. 21.
tataupa (Cryptura) „ „ 21.
„ (Crypturus) „ „ 21.
„ (Tinamus) „ „ 21.
tavoua (Porphyrio) V Ra. 38.
tectus (Bucco) I Bucc. 78.
teesa (Buteo) II But. 22; II Acc. 111.
„ (Poliornis) „ „ 22.
Teetee V Sc. 19.

telephonus (Cuculus) I Cuc. 7.
telfairi (Platalea) V Cic. 22.
temminckii (Actodromus) V Sc. 47.
" (Alca) VI U. 22.
" (Anser) VI A. 111.
" (Calyptorhynchus) III P. 153.
" (Carpophaga) IV Col. 89.
" (Columba) " " 65.
" (Coracias) I Cor. 138.
" (Kakadoe) III P. 153.
" (Nipponia) V I. 9.
" (Psittacus) III P. 152, 153.
" (Synthliborhamphus) VI U. 22.
" (Tachydromus) IV Cur. 13.
" (Tringa) V Sc. 47.
temnurus (Glaucopis) I Cor. 72.
tenebricosa (Strix) II Str. 7; II Noc. 17.
tenebrio (Monasa) I Bucc. 91.
tenebrosa (Brachypetes) " " 91.
" (Chelidoptera) " " 90.
" (Gallinula) V Ra. 44.
" (Lypornix) I Bucc. 91.
" (Monasa) " " 91.
tenebrosus (Chelidoptera) " " 90.
tengmalmi (Strix) II Str. 8.
" (Ulula) " " 8.
tenuiceps (Vultur) II Acc. 140.
tenuirostris (Cacatua) III P. 146.
" (Cuculus) I Cuc. 7, 8, 23, 27.
" (Kakatua) III P. 146.
" (Larus) VI L. 28.
" (Licmetis) III P. 146.
" (Macropygia) IV Col. 109.
" (Nectris) VI Proc. 27.
" (Numenius) V Sc. 92.
" (Platalea) V Cic. 22.
" (Procellaria) VI Proc. 22, 26.
" (Psittacus) III P. 146.
" (Sterna) VI Ster. 36, 37.
" (Totanus) V Sc. 68.
" (Tringa) " " 28.
" (Vultur) II Vul. 8; II Acc. 140.
tephrodes (Anous) VI Ster. 38.
tereckensis (Fedoa) V Sc. 77.
terek (Limosa) " " 77.
" (Scolopax) " " 77.
Terekia cinerea " " 77.
" guttifera " " 77.
termophila (Piaya) I Cuc. 58.
terrestre (Columba) IV Col. 125.
terrestris (Psittacus) III P. 106.
" (Starnoenas) IV Col. 166.
" (Trygon) " " 166.
tetracula (Uria) VI U. 26.
Tetragonops I Bucc. 93.
Tetragonops ramphastinus " " 93.
Tetrao cinereus VIII Ti. 20.
" major " " 13.
" pileatus " " 24.
" sovi " " 24.
" variegatus " " 32.
Tetrapterix capensis V Ra. 6.
Tetrax campestris IV Cur. 2.
tetrax (Otis) IV Cur. 2.
textus (Charadrius) " " 65.
thagus (Onocrotalus) VI Pe. 28.
Thalassea frontalis VI Ster. 24.
" melanorhyncha " " 24.
" paradisea " " 24.
Thalasseus affinis " " 6.
" cantiacus " " 5.
" elegans " " 7.
" poliocercus " " 12.
" trudeaui " " 29.
Thalassidroma bulweri VI Proc. 9.
" cinerea " " 3.
" leachii " " 3.
" leucogastra " " 5.
" melania " " 3.
" melanogastra " " 6.
" tropica " " 4.
thalassina (Cissa) I Cor. 67.
" (Egretta) V Ar. 42.
" (Kitta) I Cor. 67.
Thalassipora infuscata VI Ster. 26.
Thalassoica antarctica VI Proc. 15.
" glacialoides " " 22.
Thalassornis leuconota VI A. 8.
Theristicus albicollis V I. 7.
" melanopis " " 7.
thibetanus (Corvus) I Cor. 13.
Thiellus chlororhynchus VI Proc. 25.
" sphenurus " " 25.
Thinornis IV Cur. 45.
thomensis (Colymbus) VI U. 36.
" (Strix) II Noc. 15.
thoracicus (Circaëtus) II But. 24; II Acc 112.
Thoria nipalensis IV Col. 55.
Thouarsitreron diademata " " 11.
" du petit thoursii IV Col. 4.
Thrasaëtus coronatus II Asc. 12.
" harpyia II Ass. 25.
threnodes (Cacomantis) I Cuc. 21.
Threskiornis aethiopica V I. 12.
" strictipennis " " 14.
tibialis (Falco) II Fal. 16.
tibicen (Barita) I Cor. 125.
" (Coracias) " " 125.
" (Cracticus) " " 125.
" (Gymnorhina) " " 125.
tigrina (Ardea) V Ar. 52.
" (Columba) IV Col. 127.
tigrinum (Tigrisoma) V Ar. 52.
tigrinus (Turtur) IV Col. 127.
Tigrisoma brasiliense V Ar. 52.
" cabanisii " " 51.
" fasciata " " 52.
" leucolophum " " 50.
" tigrinum " " 52.
" undulatum " " 56.
timneh (Psittacus) III P. R. 10.
timoriensis (Cornix) I Cor. 19.
" (Oriolus) " " 115.
Tinami VIII Ti. 1.
Tinamotis pentlandii " " 47.
Tinamou cendré " " 20.

Tinamou de cayenne VIII Ti. 13.
" varié " " 32.
Tinamus " " 7.
Tinamus adspersus " " 28.
" bimaculatus " " 29.
" boraquira " " 44.
" boucardi " " 26.
" brasiliensis " " 10, 15.
" brevirostris " " 32.
" canus " " 8.
" cervinus " " 22.
" cinereus " " 20.
" erythropus " " 34.
" guttatus " " 12.
" julius " " 18.
" kleei " " 8.
" maculosus " " 42.
" major " "1,13,42.
" major ruficeps " " 15.
" major subcristatus " " 15.
" medius " " 45.
" meserythrus " " 25.
" minor " " 45.
" nanus " " 46.
" nigricapillus " " 17.
" noctivagus " " 33.
" obsoletus " " 22.
" pallescens " " 22.
" pileatus " " 25.
" robustus " " 2, 11.
" rufescens " " 35.
" ruficeps " " 15.
" sallaei " " 31.
" solitarius " " 8, 10.
" soui " " 24.
" strigulosus " " 27.
" subcristatus " " 11.
" tao " " 8, 10.
" tataupa " " 21.
" undulatus " " 29.
" variegatus " " 32.
" vermiculatus " " 28.
" weddelli " " 8.
tinnunculoides (Falco) II Fal. 29.
Tinnunculus " " 25.
tinnunculus (Falco) II Fal. 25; II Acc. 41.
tinus (Accipiter) II Ass. 33.
" (Falco) " " 33.
" (Hieraspiza) " " 33.
" (Nisus) II Ass. 33; II Acc. 77.
tiriacula (Conurus) III P. 14; III P. R. 4.
tiriba (Psittacara) " " 23.
tirica (Psittacus) " " 14.
" rufirostris " " 14.
Tockus camurus I Buc. 15.
" sulcirostris " " 11.
Todier de Juida III Al. 16.
Todirhamphus coronatus " " 38.
" funebris " " 40.
" occipitalis " " 32.
" recurvirostris III Al. R. 29.
Todus multicolor III Mo. 8.
" pictus III Al. 16
Todus subulatus III Mo. 8.
tolu (Cuculus) I Cuc. 65.
torda (Alca) VI U. 13.
" (Utamania) " " 13.
Toria nipalensis IV Col. 53.
torotoro (Dacelo) III Al. 23; III Al. R. 15.
" (Halcyon) " " 23.
torquata (Alcedo) " " 4; III Al. R. 1.
" (Anas) VI A. 54, 61, 102, 103.
" (Antigone) V Ra. 3.
" (Aptenodytes) VI U. 10.
" (Ceryle) III Al. 4.
" (Glareola) IV Cur. 15.
" (Grus) V Ra. 3.
" (Hiaticula) IV Cur. 26.
" (Hypotaenidia) V Ra. 22.
" (Lypornix) I Bucc. 85.
" (Malacoptila) " " 85.
" minor (Pluvialis) IV Cur. 26.
" (Otis) " " 4.
" (Pernis) II Per. 2.
" (Pluvialis) IV Cur. 23.
" (Psittaca) III P. 80.
" (Querquedula) VI A. 61.
" (Strix) II Str. 17.
" (Ulula) " " 17; II Noc. 20.
torquatula (Charadrius) IV Cur. 45.
torquatus (Accipiter) II Ass. 38.
" (Anser) VI A. 103.
" (Astur) II Ass. 38.
" (Bucco) I Bucc. 4, 24, 85.
" (Buccotrogon) " " 37.
" (Charadrius) IV Cur. 23.
" (Colymbus) VI U. 30.
" (Corvus) I Cor. 5.
" (Cracticus) " " 129.
" (Elanus) II Mil. 9.
" (Falco) II Ass. 39; II Acc. 91.
" (Halcyon) III Al. 29.
" (Histrionicus) VI A. 22.
" (Lanius) I Cor. 129.
" (Nisus) II Ass. 38; II Acc. 91.
" (Palaeornis) III P. 80, 84; III P. R. 35.
" (Palumbus) IV Col. 66.
" (Pogonorhynchus) I Bucc. 4.
" (Psittacus) III P. 72, 78, 80.
" (Rallus) V Ra. 22.
torresii (Sterna) VI Ster. 6.
torrida (Eos) III P. 122.
torringtonii (Carpophaga) IV Col. 71.
" (Lepidoenas) " " 71.
" (Palumbus) " " 71.
totanirostris (Morinellus) IV Cur. 47.
" (Orcophilus) " " 47.
Totanus V Sc. 60.
Totanus acuminatus " " 38.
" affinis " " 71.
" bartramius " " 78.
" brevipes " " 74.
" calidris " " 65.
" chloropygius " " 71.
" cinereus " " 77.

Totanus crassirostris V Sc. 76.
" damacensis " " 48.
" fistulans " " 61.
" flavipes " " 69.
" fuliginosus " " 74.
" fuscocapillus " " 69.
" fuscus " " 64.
" glareola " " 71, 73.
" glareoloides " " 71.
" glottis " " 61.
" griseopygia " " 74.
" horsfieldii " " 61.
" hypoleucos " " 80.
" incanus " " 74.
" indicus " " 51.
" javanicus " " 77.
" lathami " " 68.
" leucurus " " 71.
" macroptera " " 71.
" macularius " " 83.
" maculatus " " 64.
" melanoleucus " " 63.
" naevius " " 65.
" natans " " 64.
" natator " " 69.
" oceanicus " " 74.
" ochropus " " 70.
" polynesiae " " 74.
" pulverulentus " " 74.
" rufus " " 19.
" (Scolopax) " " 68.
" semipalmatus " " 76.
" solitarius " " 71.
" speculiferus " " 76.
" stagnatilis " " 28, 68.
" striatus " " 65.
" tenuirostris " " 68.
" variegatus " " 78.
Tourterelle brune de la Chine IV Col. 118.
" grise de la Chine " " 127.
tovi (Psittaculus) III P. 29; III P. R. 7.
" (Psittacus) " " 29.
townsendi (Aphriza) IV Cur. 45.
townsendii (Haematopus) " " 76.
townssendii (Phalacrocorax) VI Pc. 23.
Trachelotis coerulescens IV Cur. 4.
" rhaad " " 4.
" scolopacea " " 5.
trachydactyla (Scolopax) V Sc. 6.
Trachypelmus subcristatus VIII Ti. 13.
Trachyphonus purpuratus I Bucc. 71.
" squamiceps " " 70.
" subsulphureus " " 44.
" vaillantii " " 65.
trachyrhynchus (Cryptopelecanus) VI Pc. 35.
" (Pelecanus) " " 35.
Trachytelmus frantzii VIII Ti. 18.
Tragopan abyssinicus I Buc. 19.
traillii (Oriolus) I Cor. 114.
" (Pastor) " " 114.
" (Psarolophus) " " 114.
tranquilla (Geopelia) IV Col. 131.
" (Lypornix) I Bucc. 88.
tranquilla (Monasa) I Bucc. 88.
tranquillus (Cuculus) I Bucc. 88.
Treron IV Col. 44.
Treron abyssinica " " 48.
" apicauda " " 62.
" aromatica " " 52.
" australis " " 43.
" axillaris " " 52.
" bicincta " " 51.
" calva " " 46.
" capellei " " 58.
" chlorigaster " " 46.
" chloroptera " " 52.
" crassirostris " " 47.
" curvirostra " " 52.
" delalandii " " 49.
" floris " " 59.
" fulvicollis " " 57.
" griseicauda " " 53.
" jerdonii " " 46.
" korthalsii " " 60.
" magnirostris " " 58.
" malabarica " " 52.
" multicolor " " 51.
" nasica " " 55.
" nipalensis " " 53.
" nudirostris " " 47, 49.
" olax " " 56.
" oxyura " " 62.
" phoenicoptera " " 45.
" pompadura " " 52.
" psittacea " " 59.
" pulverulenta " " 53.
" sancti thomae " " 45.
" sieboldii " " 61.
" sphenura " " 60.
" vernans " " 49.
" viridifrons " " 45.
" viridis " " 50.
Tribonyx V Ra. 50.
Tribonyx mortieri " " 50.
" ventralis " " 51.
tribrachis (Ceyx) III Al. 17.
tribrachys (Alcedo) " " 17.
Trichoglossus III P. 108; III P. R. 43.
Trichoglossus capistratus III P. 109; III P. R. 48.
" chlorolepidotus III P. 111; III P. R. 49.
" cocineifrons III P. R. 43.
" cyanogrammus III P. 109.
" flavoviridis III P. R. 49.
" forsteni III P. 111; III P. R. 46.
" haematodus III P. 109.
" haematotus III P. 109; III P. R. 43.
" massena III P. 110; III P. R. 43.
" matoni III P. 111.
" meyeri III P. R. 50.
" multicolor III P. 108; III P. R. 47.

Trichoglossus nigrigularis III P. 110; III P. R. 43.
" ornatus III P. 112; III P. R. 49.
" porphyreocephalus IIIP.115.
" pulchellus III P. R. 52.
" rosenbergii III P. R. 47.
" rubritorques III P. 108; III P. R. 48.
" swainsonii III P. 108.
" versicolor " " 115.
Tricholaema flavipunctata I Bucc. 11.
trichopsis (Scops) II Noc. 14.
Triclaria cyanogastra III P. 66.
tricollaris (Charadrius) IV Cur. 24.
" (Hiaticula) " " 24.
tricolor (Anas) VI A. 74.
" (Arara) III P. 4; III P. R. 2.
" (Buteo) II But. 12.
" (Charadrius) IV Cur. 65.
" (Corvus) I Cor. 50.
" (Lobivanellus) IV Cur. 67.
" (Lorius) III P. 118; III P. R. 54.
" (Phoenicophaeus) I Cuc. 49.
" (Podiceps) VI U. 43, 45.
" (Psittacus) III P. 4.
" (Rallina) V Ra. 18.
" (Vanellus) IV Cur. 67.
tridactyla (Dacelo) III Al. R. 33.
" (Phytotoma) I Bucc. 5.
" (Procellaria) VI Proc. 37.
" (Rissa) VI L. 30.
" (Tringa) V Sc. 55.
tridactylus (Larus) VI L. 30.
trifasciatus (Charadrius) IV Cur. 33, 36.
trigonigera (Columba) IV Col. 73.
" (Stictoenas) " " 73.
trimaculatus (Bucco) I Bucc. 28.
Tringa V Sc. 27.
Tringa acuminata IV Cur. 38.
" albescens V Sc. 43.
" alpina " " 32.
" americana " " 33.
" arenaria " " 55.
" arquatella " " 30.
" atricapilla " " 18.
" audubonii " " 54.
" bartramia " " 78, 79.
" bonapartei " " 42.
" borealis IV Cur. 45.
" brevirostris V Sc. 49, 55, 79.
" cajanensis IV Cur. 57.
" canadensis V Sc. 30.
" canutus " " 29.
" cinclus " " 32.
" cinclus minor " " 33.
" cinerea " " 29.
" cooperi " " 39.
" crassirostris " " 28.
" damacensis " " 48.
" dominicensis " " 39.
" douglasii " " 54.
" eloroides " " 49.
Tringa fasciata IV Cur. 58.
" ferruginea V Sc. 29.
" frenata " " 49.
" fulicarius " " 58.
" fusca " " 58.
" gambetta " " 65.
" glacialis " " 58.
" glareola " " 71.
" glareola (Scolopax) V Sc. 74.
" grisea IV Cur. 54; V Sc. 29.
" guinetta " " 68.
" helvetica IV Cur. 54.
" himantopus V Sc. 54.
" hyperboreus " " 58.
" hypoleucos " " 80.
" interpres IV Cur. 43.
" islandica V Sc. 29.
" keptuschka IV Cur. 58.
" leucoptera V Sc. 18.
" lobata IV Cur. 67; V Sc. 58.
" lomatina " " 29.
" longicauda " " 78.
" macularia " " 83.
" maculata " " 39.
" magna " " 28.
" maritima " " 30.
" minuta " " 43.
" minutilla " " 48, 55.
" morinella IV Cur. 43.
" naevia V Sc. 29.
" nigricans " " 30.
" ochropus " " 70, 73.
" parvirostris " " 79.
" pectoralis " " 39.
" platyrhyncha " " 49, 50.
" pugnax " " 51.
" pusilla " " 43, 48, 55.
" pygmaea " " 33, 50.
" pyrrhetraea " " 18.
" rufa " " 29.
" rufescens " " 38, 79.
" schinzii " " 33, 42.
" semipalmata " " 55.
" solitaria " " 73.
" squatarola IV Cur. 54.
" subarquata V Sc. 31.
" subminuta " " 48.
" subruficollis V Sc. 79.
" temminckii " " 47.
" tenuirostris " " 28.
" tridactyla " " 55.
" undata " " 30.
" urvilli IV Cur. 48.
" vanellus " " 56.
" varia " " 54.
" variabilis V Sc. 33.
" virgata IV Cur. 45.
" wilsoni V Sc. 48.
Tringoides bartramius " " 79.
" (Calidris) " " 55.
" hypoleucos " " 80.
" macularius " " 83.
trinotatus (Astur) II Ass. 45.

trinotatus (Falco) II Ass. 45; II Acc. 90.
" (Nisus) " " 45; " " 90.
tristigmata (Columba) IV Col. 158.
" (Phlegoenas) " " 158.
tristis (Bucco) I Bucc. 19.
" (Corvus) I Cor. 36.
" (Gymnocorvus) " " 36.
" (Melias) I Cuc. 54.
" (Phoenicophaës) " " 54.
" (Procellaria) VI Proc. 27.
triton (Cacatua) III P. 135; III P. R. 63.
" (Psittacus) " " 135.
trivirgatus (Astur) II Ass. 22; II Acc. 65.
" (Falco) " " 22.
" indicus (Astur) II Ass. 22; II Acc. 65.
trochila (Chamaepelia) IV Col. 135.
troglodytes (Ocydromus) V Ra. 73.
" (Rallus) " " 73.
Trogon asiaticus I Bucc. 16.
" luzoniensis " " 7.
troile (Colymbus) VI U. 15.
" (Uria) " " 15, 16.
tropica (Fregatta) VI Proc. 4.
" (Procellaria) " " 4.
" (Thalassidroma) " " 4.
Tropidorhynchus buruensis I Cor. 113.
trowbridgii (Pelionetta) VI A. 16.
trudeaui (Sterna) VI Ster. 29.
" (Thalasseus) " " 29.
Trygon bicincta IV Col. 51.
" holosericeus " " 41.
" terrestris " " 166.
Trynga falcinella V Sc. 31.
Tryngites rufescens " " 79.
tschudii (Capito) I Bucc. 63.
tui (Conurus) III P. 29.
" (Psittaculus) " " 29; III P. R. 7.
" (Psittacus) " " 29.
tuipara (Psittaculus) III P. 28; III P. R. 7.
" (Psittacus) " " 28.
tumida (Carpophaga) IV Col. 81.
" (Globicera) " " 81.
tumulus (Megapodius) VIII Ti. 57.
Turaco leucotis I Cuc. 75.
Turacus albocristatus " " 77.
" giganteus " " 77.
Turcoena manadensis IV Col. 106.
" modesta " " 107.
turcosa (Cyanocitta) I Cor. 48.
turcosus (Cyanocorax) " " 48.
Turdus cyanurus III Pit. 13.
" iliacus carolinensis I Bucc. 79.
" malaccensis III Pit. 12.
" maxillaris I Cor. 115.
" melinus " " 99.
Turtur IV Col. 116.
Turtur albiventris " " 124.
" amboinensis " " 110, 113.
" auritus " " 116.
" bitorquatus " " 121.
" cambayensis " " 120.
" chinensis " " 127.
Turtur ceylanensis IV Col. 129.
" cinereus " " 127.
" (Columba) " " 116.
" damarensis " " 124.
" douraca " " 123.
" dussumieri " " 120.
" erythrocephalus " " 118.
" erythrophrys " " 121.
" fallax " " 124.
" gaimardii " " 120.
" humilis " " 125.
" isabellinus " " 117.
" levaillantii " " 121.
" lugens " " 119.
" (Macropygia) " " 110.
" neglectus " " 122.
" orientalis " " 118.
" picturatus " " 129.
" (Prion) VI Proc. 17.
" (Procellaria) " " 17, 18.
" risorius IV Col. 125.
" risorius ferus " " 123.
" rostratus " " 130.
" rupicola " " 118.
" semitorquatus " " 124.
" senegalensis " " 119.
" suratensis " " 129.
" tigrinus " " 127.
" vinaceus " " 123.
" vitticollis " " 123.
Turtures " " 115.
turturoides (Ptilinopus) " " 60.
tusalia (Coccyzura) " " 107.
tuta (Dacelo) III Al. R. 29.
Tutu III Mo. 5.
tutu (Alcedo) III Al. 38.
Tylorhamphus camtschaticus VI U. 25.
" cristatellus " " 25.
" pygmaeus " " 23.
tymbonomus (Cuculus) I Cuc. 23.
Tympanistria bicolor IV Col. 143.
" (Columba) " " 143.
" fraseri " " 143.
" (Peristera) " " 143.
typhon (Ardea) V Ar. 3.
" rectirostris " " 3.
" robusta " " 3.
" sumatrana " " 3.
typica (Gazzola) I Cor. 6.
" (Halobaena) VI Proc. 18.
" (Reinwardtoena) IV Col. 104.
typicus (Biensis) V Ra. 10.
" (Polyboroides) II Ass. 55.
typus (Adamastor) VI Proc. 23.
" (Anastomus) V Cic. 15.
tyrannus (Falco) II Ass. 2.
" (Pterura) " " 2.
" (Spizaetus) " " 2; II Acc. 52, 59.
tyro (Dacelo) III Al. 20; III Al. R. 13.

U.

uliginosus (Falco) II Cir. 2.
ultramarina (Cyanocitta) I Cor. 64.

ultramarinus (Garrulus) I Cor. 64.
Ulula II Str. 8; II Noc. 17.
Ulula acadica " " 8; " " 18.
" albigularis " " 16; " " 20.
" aluco " " 12; " " 19.
" badia " " 23; " " 17.
" cayennensis " " 14; " " 19.
" cinerea " " 8, 9; " " 18.
" fasciata " " 13; " " 19.
" fulvescens " " 19.
" funerea II Str. 8; " " 18.
" fuscescens " " 11; " " 18.
" harrisii " " 9; " " 18.
" huhula " " 17; " " 20.
" hylophila " " 13; " " 19.
" indrani " " 19; " " 20; II Oti. 12.
" leptogrammica II Str. 20; II Noc. 21.
" myrtha " " 19; " " 21.
" nebulosa " " 11; " " 18.
" (Noctua) " " 38; " " 32.
" pelii " " 23; " " 21.
" polygrammica " " 19.
" pulsatrix II Str. 17.
" seloputo " " 22; II Noc. 21.
" sinensis " " 21; " " 21.
" (Strix) " " 42.
" suinda II Noc. 19.
" superciliaris " " 19.
" tengmalmi II Str. 8.
" torquata " " 17; II Noc. 20.
" uralensis " " 10; " " 18.
" virgata " " 15; " " 19.
" woodfordtii " " 12; " " 19.
" zonocerca " " 19.
umbellata (Ciconia) V Cic. 9.
umbretta (Scopus) V I. 15.
umbrinus (Corvus) I Cor. 19.
umizusume (Uria) VI U. 22.
uncinatus (Cymindis) II Per. 8; II Acc. 136.
" (Falco) " " 8.
undata (Tringa) V Sc. 30.
undatus (Laimodon) I Bucc. 8.
" (Pogonorhynchus) " " 8.
undina (Aptenodytes) VI U. 10.
" (Eudyptula) " " 10.
" mersa VI A. 12.
undulata (Anas) " " 114.
" (Ardea) V Ar. 56.
" (Euphema) III P. 105; III P. R. 42.
" (Hubara) IV Cur. 3.
" (Psophia) " " 3.
" (Scolopax) V Sc. 8, 74.
" (Strix) II Oti. 21.
undulatum (Tigrisoma) V Ar. 56.
undulatus (Botaurus) " " 56.
" (Crypturus) VIII Ti. 29.
" (Haematornis) II But. 25.
" (Melopsittacus) III P. 105.
" (Psittacus) " " 24, 105.
" (Tinamus) VIII Ti. 29.
" (Zebrilus) V Ar. 56.
unduliventer (Falco) II Ass. 46.
" (Nisus) II Ass. 47; II Acc. 96.
uniappendiculatus (Casuarius) IV St. 10.
unicincta (Asturina) II Asc. 2; II Acc. 102.
unicinctus (Astur) " " 2.
" (Falco) " " 2.
uniclavata (Gallinago) V Sc. 4.
uniclavatus (Scolopax) " " 12.
unicolor (Anous) VI Ster. 36.
" (Cyanocorax) I Cor. 49.
" (Haematopus) IV Cur. 75.
" (Haliaetus) II Aq. 15.
" (Lypornix) I Bucc. 89.
" (Psittacus) III P. 123.
" (Uria) VI U. 18.
" (Vinago) IV Col. 51.
unidentatus (Pogonias) I Bucc. 7.
unifasciata (Erismatura) VI A. 9.
unisulcata (Alca) VI U. 13.
unitorques (Monasa) I Bucc. 85.
Upland goose VI A. 99.
Upupa fusca I Cor. 94.
" magna " " 94.
" papuensis " " 94.
" speciosa " " 94.
" striata " " 94.
" superba " " 94.
uralensis (Ptynx) II Str. 10.
" (Strix) " " 10.
" (Ulula) " " 10; II Noc. 18.
Uria VI U. 14.
Uria aleutica " " 26.
" alle " " 20.
" antiqua " " 22.
" arra " " 16.
" balthica " " 18.
" brachyptera " " 21.
" brünnichii " " 16.
" carbo " " 17.
" cristatella " " 25.
" dubia " " 26.
" francesii " " 16.
" glacialis " " 18.
" groenlandica " " 18.
" grylle " " 18.
" grylloides " " 18.
" kittlitzii " " 21.
" lacrymans " " 15.
" leucophthalmos " " 15.
" leucopsis " " 15.
" lomvia " " 15.
" mandtii " " 18.
" minor " " 18, 20.
" mystacea " " 26.
" nigra " " 18.
" pica " " 16.
" pusilla " " 23.
" rhingvia " " 15.
" scapularis " " 18.
" senicula " " 21.
" striata " " 18.
" swarbeg " " 15.
" tetracula " " 26.

Uria troile VI U. 15, 16.
„ umizusume „ „ 22.
„ unicolor „ „ 18.
„ wrangeli „ „ 21.
urica (Merops) III Me. 9.
Urile bicristatus VI Pe. 17.
„ (Pelecanus) „ „ 17.
„ penicillatus „ „ 18.
urinator (Colymbus) VI U. 34.
Urinatores „ „ 1.
urinatrix (Halodroma) VI Proc. 37.
„ (Pelecanoides) „ „ 37.
„ (Procellaria) „ „ 37.
„ (Puffinuria) „ „ 37.
Urocissa coerulea I Cor. 71.
„ flavirostris „ „ 70.
„ magnirostris „ „ 70.
„ sinensis „ „ 70.
Uroleuca cayana „ „ 51.
Uropelia campestris IV Col. 138.
urophasianus (Anas) VI A. 55.
uropygialis (Ceyx) III Al. R. 34.
„ (Limosa) V Sc. 25.
„ (Megalaima) I Bucc. 42.
„ (Numenius) V Sc. 93.
Urospiza approximans II Ass. 42.
„ sulaënsis II Acc. 76.
urubitinga (Asturina) II Asc. 6; II Acc. 103.
„ (Cathartes) II Vul. 4; II Acc. 139.
„ (Falco) II Asc. 6.
„ (Hypomorphnus) „ „ 6.
„ (Morphnus) „ „ 6.
„ (Rupornis) „ „ 6.
urvilli (Squatarola) IV Cur. 48.
„ (Tringa) „ „ 48.
ustus (Scops) II Noc. 11.
Utamania torda VI U. 13.

V.

vagabunda (Coracias) I Cor. 77.
„ (Dendrocitta) „ „ 77.
vagans (Cuculus) I Cuc. 15.
„ (Dacelo) III Al. R. 28.
„ (Dendrocygna) VI A. 88.
„ (Dendrocygna arcuata) „ „ 88.
„ (Halcyon) III Al. R. 28.
vaillantii (Coccyzus) I Cuc. 44.
„ (Merops) III Me. 2.
„ (Trachyphonus) I Bucc. 65.
validissimus (Corvus) I Cor. 28.
validus (Centrococcyx) I Cuc. 66.
„ (Corvus) I Cor. 29.
valisneriana (Anas) VI A. 25.
„ (Aristonetta) „ „ 25.
„ (Aythyia) „ „ 25.
„ (Fuligula) „ „ 25.
vanelloides (Charadrius) IV Cur. 65.
Vanellus „ „ 55.
Vanellus albicapillus „ „ 68.
„ albifrons „ „ 68.
Vanellus callaeas IV Cur. 67.
„ cayanus „ „ 62.
„ cayennensis „ „ 57.
„ cinctus „ „ 48, 59.
„ coronatus „ „ 62.
„ crassirostris „ „ 60.
„ cristatus „ „ 56.
„ flavipes „ „ 59.
„ gallinaceus „ „ 67.
„ grallarius „ „ 59.
„ gregarius „ „ 58.
„ griseus „ „ 53.
„ helveticus „ „ 54.
„ indicus „ „ 68.
„ inornatus „ „ 63, 69.
„ lateralis „ „ 68.
„ leucurus „ „ 59.
„ macrocercus „ „ 58.
„ macropterus „ „ 67.
„ melanogaster „ „ 54.
„ miles „ „ 66.
„ novae hollandiae „ „ 67.
„ pallidus „ „ 58.
„ rufiventris „ „ 59.
„ senegalensis „ „ 68.
„ speciosus „ „ 62.
„ spinosus „ „ 60.
„ spixii „ „ 63.
„ squatarola „ „ 53.
„ strigilatus „ „ 68.
„ tricolor „ „ 67.
„ (Tringa) „ „ 56.
„ varius „ „ 53.
„ ventralis „ „ 61.
„ villotaei „ „ 59.
Vanga curvirostris I Cor. 129.
„ destructor „ „ 129.
varia (Barita) „ „ 127.
„ (Ceryle) III Al. 2.
„ (Coracias) I Cor. 127.
„ (Erolia) V Sc. 31.
„ (Pica) I Cor. 39.
„ (Tringa) IV Cur. 54.
variabilis (Rhynchaea) V Sc. 17.
„ (Tringa) „ „ 33.
varians (Glaucopis) I Cor. 73.
„ (Corvus) „ „ 73.
„ (Crypsirhina) „ „ 73.
varié (Tinamou) VIII Ti. 32.
variegata (Anas) VI A. 65.
„ (Casarca) „ „ 65.
„ (Chizaerhis) I Cuc. 79.
„ (Cryptura) VIII Ti. 32.
„ (Erolia) V Sc. 31.
„ (Geococcyx) I Cuc. 40.
„ (Musophaga) „ „ 79.
„ (Rhynchaea) V Sc. 16.
„ (Rhynchaspis) VI A. 35.
variegatus (Bucco) I Bucc. 79.
„ (Centropus) I Cuc. 65.
„ (Coridonyx) „ „ 63.
„ (Cryptunus) VIII Ti. 32.
„ (Cuculus) I Cuc. 26.

variegatus (Indicator) I Cuc. 2.
„ (Mellitophagus) III Me. 11.
„ (Merops) „ „ 10, 11.
„ (Oriolus) I Cor. 110.
„ (Pardirallus) V Ra. 13.
„ (Polophilus) I Cuc. 63.
„ (Rallus) V Ra. 13.
„ (Tetrao) VIII Ti. 32.
„ (Tinamus) „ „ 32.
„ (Totanus) V Sc. 78.
variolosus (Cuculus) I Cuc. 26.
varius (Charadrius) IV Cur. 34.
„ (Cracticus) I Cor. 127.
„ (Cuculus) I Cuc. 14.
„ (Graculus) VI Pe. 20.
„ (Hypoleucus) „ „ 20.
„ (Pelecanus) „ „ 20.
„ (Pluvialis) IV Cur. 53.
„ (Vanellus) „ „ 53.
vasa (Grand) III P. 37.
„ (Petit) „ „ 37.
„ (Psittacus) „ „ 37.
Vaza „ „ 37.
velatus (Psittacus) „ „ 114.
velox (Falco) II Ass. 30.
„ (Geococcyx) I Cuc. 41.
„ (Pelecanopus) VI Ster. 11.
„ (Sterna) „ „ 11, 24.
velvetina (Oidemia) VI A. 17.
venatoria (Kitta) I Cor. 68.
ventralis (Accipiter) II Acc. 70.
„ (Charadrius) IV Cur. 61.
„ (Gallinula) V Ra. 51.
„ (Hoplopterus) IV Cur. 61.
„ (Philomachus) „ „ 61.
„ (Tribonyx) V Ra. 51.
„ (Vanellus) IV Cur. 61.
venusta (Columba) IV Col. 138.
„ (Pitta) III Pit. 13; III Pit. R. 17.
venustus (Brachyurus) III Pit. 13.
„ (Conurus) III P. 96.
„ (Platycercus) III P. 96; III P. R. 40.
„ (Psittacus) III P. 96, 103.
veranyi (Ardea) V Ar. 31.
veredus (Charadrius) IV Cur. 38.
vermiculatus (Tinamus) VIII Ti. 28.
vernalis (Psittacula) III P. 132.
„ (Psittacus) „ „ 132.
vernans (Columba) IV Col. 49, 50, 51.
„ (Osmotreron) „ „ 50.
„ (Treron) „ „ 49.
verreauxi (Nisus) II Ass. 15.
verreauxii (Aquila) II Aq. 9.
„ (Avicida) II Per. 6.
„ (Bubo) II Oti. 12.
„ (Clupeilarus) VI L. 13.
„ (Leptopila) IV Col. 158.
„ (Macropygia) V Ra. 37.
„ (Musophaga) I Cuc. 76.
„ (Nisus) II Ass. 37; II Acc. 74.
„ (Otis) IV Cur. 4.
versicolor (Anas) VI A. 57.
versicolor (Bucco) I Bucc. 15.
„ (Columba) IV Col. 74.
„ (Coriphilus) III P. 115.
„ (Cuculus) I Cuc. 33.
„ (Megalaima) I Bucc. 15.
„ (Nanodes) III P. 115; III P. R. 53.
„ (Psittacus) „ „ 25.
„ (Pterocyanea) VI A. 57.
„ (Strepera) I Cor. 123.
„ (Trichoglossus) III P. 115.
versteri (Poiocephalus) „ „ 36.
vespertinus amurensis (Falco) II Acc. 46.
„ (Falco) II Fal. 32; „ „ 46.
veterum meridionalis (Noctua) II Str. 29; II Noc. 26.
„ (Noctua) II Str. 28; II Noc. 26.
„ (Porphyrio) V Ra. 52, 53.
vetula (Coccygus) I Cuc. 39.
„ (Cuculus) „ „ 39.
„ (Dominicanus) VI L. 13.
„ (Saurothera) I Cuc. 39, 40.
viaticus (Cuculus) „ „ 40.
vibrisca (Palaeornis) III P. 79, 85; III P. R. 36.
„ (Psittacus) III P. 85.
viduata (Anas) VI A. 90.
„ (Dendrocygna) „ „ 90.
victoriae (Goura) IV Col. 169.
„ (Lophyrus) „ „ 169.
vieilloti (Pogonia) I Bucc. 6.
vieillotii (Pogonorhynchus) „ „ 6.
vigorsi (Garrulus) I Cor. 61.
„ (Glottis) V Sc. 61.
„ (Psittacara) III P. 23.
„ (Psittacus) „ „ 23.
vigorsii (Brachyurus) III Pit. 10.
„ (Otis) IV Cur. 5.
„ (Phasianurus) VI A. 55.
„ (Pitta) III Pit. 10, 11; III Pit. R. 15.
villotaei (Vanellus) IV Cur. 59.
vinacea (Amazona) III P. 50; III P. R. 26.
„ (Chloroenas) IV Col. 78.
„ (Columba) „ „ 78, 123.
vinaceus (Psittacus) III P. 50.
„ (Turtur) IV Col. 123.
Vinago „ „ 44.
Vinago abyssinica „ „ 48.
„ australis „ „ 47, 48.
„ bicincta „ „ 51.
„ calva „ „ 49.
„ capellei „ „ 58.
„ korthalsii „ „ 60.
„ malabarica „ „ 52.
„ militaris „ „ 45.
„ olax „ „ 56.
„ pityriopsis „ „ 47.
„ psittacea „ „ 59.
„ sphenura „ „ 60.
„ unicolor „ „ 51.
vindhiana (Aquila) II Aq. 7.
vintsioides (Alcedo) III Al. 12; III Al. R. 6.

viola (Fuligula) VI A. 73.
violacea (Amazona) III P. 63; III P. R.29.
" (Ardea) V Ar. 61.
" (Columba) IV Col. 165.
" (Geotrygon) " " 165.
" (Musophaga) I Cuc. 74.
" (Oreopelia) IV Col. 165.
" (Starnoenas) " " 165.
violaceus (Amblycorax) I Cor. 31.
" (Buceros) I Buc. 7.
" (Centropus) I Cuc. 61.
" (Corvus) I Cor. 31.
" (Cyanocorax) " " 46.
" (Eurystomus) " " 143.
" (Graculus) VI Pe. 17.
" (Nyctherodias) V Ar. 61.
" (Nycticorax) " " 61.
" (Pelecanus) VI Pe. 17.
" (Phimus) I Cuc. 74.
" (Psittacus) III P. 63, 67.
" (Pyrrhocorax) I Cor. 117.
vipio (Grus) V Ra. 3.
virens (Bucco) I Bucc. 13.
" (Columba) IV Col. 23.
" (Jotreron) " " 30.
" (Megalaima) I Bucc. 13.
" (Omeotreron) IV Col. 23.
virescens (Ardea) V Ar. 41.
" (Butorides) " " 41.
" (Kitta) I Cor. 117.
" (Oriolus) " " 111.
" (Psittaculus) III P. 27; III P. R. 7.
" (Psittacus) III P. 27.
" (Sphecotheres) I Cor. 115.
virgata (Anas) VI A. 87.
" (Aphriza) IV Cur. 45.
" (Strepsilas) " " 45.
" (Tringa) " " 45.
" (Ulula) II Str. 15; II Noc. 19.
virgatum (Syrnium) II Str. 15.
virgatus (Falco) II Ass. 32; II Acc. 74.
" (Nisus) " " 32; " " 74.
" rhodogaster (Nisus) II Ass. 32; II Acc. 76.
virginiana (Strix) II Oti. 10.
virginianus (Bubo) " " 10; II Noc. 4.
" (Rallus) V Ra. 10.
virginicus (Charadrius) IV Cur. 50, 53.
" (Pluvialis) " " 53.
virgo (Anthropoides) V Ra. 6.
" (Grus) " " 6.
" (Scops) " " 6.
viridi-aurea (Anas) VI A. 73.
viridicauda (Psittacula) III P. 68; III P. R. 30.
viridicollis (Psittacus) III P. 83.
viridifrons (Crocopus) IV Col. 45.
" (Treron) " " 45.
viridimystax (Palaeornis) III P. 84.
viridirostris (Phoenicophaeus) I Cuc. 52.
" (Zanclostomus) " " 54.
viridirufa (Alcedo) III Al. 5; III Al. R. 2.
viridirufus (Phoenicophaeus) I Cuc. 49.
viridis (Alcedo) III Al. 5.
" (Anas purpureo-) VI A. 73.
" atricapilla moluccensis (Merula) III Pit. 3.
" (Bucco) I Bucc. 32, 34.
" (Centropus) I Cuc. 65, 68.
" (Chalybaeus) I Cor. 122.
" (Colaris) " " 142.
" (Columba) IV Col. 22, 23, 50.
" (Corydonix) I Cuc. 65.
" (Cuculus guineensis) I Cuc. 76.
" geelvinkianus (Ptilopus) IV Col. 23.
" (Gracula) I Cor. 110.
" (Graucalus) " " 115.
" (Jotreron) IV Col. 22.
" (Leptosomus) I Cuc. 36.
" madagascariensis (Palumbus) IV Col. 48.
" (Megalaima) I Bucc. 32.
" (Merops) III Me. 6.
" (Mimeta) I Cor. 110, 115.
" (Mimetes) " " 110.
" moluccensis (Merula) III Pit. 11.
" (Oriolus) I Cor. 110, 115.
" (Paradisea) " " 122.
" (Parra) V Ra. 65.
" (Phoenicophaeus) I Cuc. 49.
" (Pluvialis) IV Cur. 49.
" (Polophilus) I Cuc. 65.
" (Psittacus) III P. 40, 94.
" (Psittacus macrourus) III P. 86.
" (Ptilinopus) IV Col. 22.
" (Ptilopus) " " 22.
" (Ptilorchynchus) I Cor. 117.
" (Sphecothera) " " 115.
" stirps geelvinkiana (Ptilopus) IV Col. 23.
" (Treron) IV Col. 50.
viridissima (Columba) " " 8.
viridissimus (Conurus) III P. 14.
" (Graydidascalus) " " 66.
" (Merops) III Me. 6.
" (Psittacus) III P. 14, 66.
" (Ptilopus) IV Col. 6.
vitiensis (Columba) " " 77.
" (Janthoenas) " " 77.
" (Porphyrio) V Ra. 55.
vittata (Amazona) III P. 58; III P. R. 28.
" (Procellaria) VI Proc. 16, 17.
vittatus (Conurus) III P. 24; III P. R. 6.
" (Prion) VI Proc. 16.
" (Psittacus) III P. 24, 58.
vitticaudus (Falco) II Per. 8.
vitticollis (Turtur) IV Col. 123.
vocifer (Falco) II Aq. 16.
" (Haliactus) II Aq. 16; II Acc. 118.
" (Oedicnemus) IV Cur. 19.
vocifera (Aquila) II Aq. 16.
vociferus (Charadrius) IV Cur. 23.
" (Oxyechus) " " 23.
" (Scolopax) IV Sc. 63.
Vouron patra IV St. 5.

Vuari VIII Ti. 49.
vulgaris americanus (Otus) II Oti. 2.
" (Anser) VI A. 109.
" (Arenaria) V Sc. 55.
" (Buteo) II But. 3; II Acc. 105.
" (Capito) I Bucc. 79.
" (Clangula) VI A. 20.
" (Gyps) II Vul. 7.
" (Himantopus) V Sc. 105.
" japonicus (Buteo) II But. 7.
" (Otus) II Oti. 1; II Noc. 1.
" (Phaeopus) V Sc. 93.
" (Polyborus) II Pol. 2.
vulneratus (Platycercus) III P. 92; III P. R. 39.
vulpanser (Tadorna) VI A. 67.
Vultur II Vul. 5; II Acc. 139.
Vultur aegypius II Vul. 9.
" albicilla II Aq. 11.
" angolensis " " 18.
" atratus II Vul. 2.
" audax II Aq. 10.
" aura II Vul. 3.
" auricularis II Vul. 9; II Acc. 141.
" barbatus " " 10.
" bengalensis " " 8; II Acc. 140.
" brasiliensis " " 3.
" californianus " " 2.
" calvus " " 8; II Acc. 141.
" cinereus " " 9.
" eulophus " " 8.
" fulvus " " 6; II Acc. 140.
" " indicus " " 7; " " 140.
" " kolbei " " 7; " " 140.
" " occidentalis II Vul. 6; II Acc. 140.
" " orientalis II Vul. 6; II Acc. 140.
" " rüppelli II Vul. 7; II Acc. 140.
" galericulatus II Vul. 8.
" gryphus " " 1.
" harpyia II Ass. 25.
" imperialis II Vul. 9.
" indicus II Vul. 7, 8; II Acc. 140.
" jota " " 2, 3.
" kolbi " " 7; II Acc. 140.
" leuconotus " " 8.
" monachus " " 9; II Acc. 141.
" nubicus " " 9.
" occipitalis " " 8; II Acc. 141.
" papa " " 1.
" percnopterus II Vul. 5.
" pileatus " " 5.
" pondicerianus " " 8.
" radiatus II Ass. 54.
" rüppelli II Vul. 7; II Acc. 140.
" tenuiceps " " 140.
" tenuirostris II Vul. 8; II Acc. 140.
Vultures " " 1; " " 138.
vulturina (Amazona) III P. 66; III P. R. 30.
" (Aquila) II Aq. 9; II Acc. 116.
vulturina (Gypopsitta) III P. 66.
vulturinus (Cathartes) II Vul. 2.
" (Corvus) I Cor. 3.
" (Falco) II Aq. 9.
" (Psittacus) III P. 66.

W.

waalia (Columba) IV Col. 48.
wagleri (Chettusia) IV Cur. 69.
" (Conurus) III P. 12; III P. R. 3.
" (Pygoscelis) VI U. 5.
walik-mehra (Macropygia) IV Col. 108.
wallacei (Ceyx) III Al. R. 34.
" (Dacelo) " " 34.
" (Eos) III P. R. 57.
" (Megapodius) VIII Ti. 54, 75.
" (Paradisea) I Cor. 91.
" (Prioniturus) III P. 45; III P. R. 22.
" (Ptilinopus) IV Col. 18.
" (Ptilopus) " " 18.
" (Semioptera) I Cor. 91.
wallaciana (Paradisea) " " 79.
walleri (Strix) II Noc. 16.
washingtonii (Haliaetus) II Aq. 12.
watsonii (Ephialtes) II Oti. 21.
" (Scops) II Noc. 11.
Wax-billed Barbet I Bucc. 88.
weddelli (Tinamus) VIII Ti. 8.
weddellii (Conurus) III P. 10; III P. R. 3.
westermanii (Carpophaga) IV Col. 95.
" (Eclectus) III P. 42; III P. R. 16.
" (Psittacodis) III P. 42.
White-breasted Barbet I Bucc. 85.
wiedii (Actitis) V Sc. 83.
wilsoni (Actodromus) " " 48.
" (Gallinago) " " 6.
" (Glaucopis) I Cor. 73.
" oceanica (Oceanites) VI Proc. 6.
" (Oceanites) " " 6.
" (Scolopax) V Sc. 6.
" (Squatarola) IV Cur. 54.
" (Tringa) V Sc. 48.
wilsonianus (Otus) II Oti. 2.
wilsonii (Buteo) II But. 20.
" (Falco) " " 20.
" (Fulica) V Ra. 63.
" (Holopodius) V Sc. 60.
" (Paradisea) I Cor. 87.
" (Phalaropus) V Sc. 60.
" (Poëcilopternis) II But. 20.
" (Sterna) VI Ster. 17.
wilsonius (Charadrius) IV Cur. 30.
" (Ochthodromus) " " 30.
winterfeldii (Charadrius) " " 45.
wolffii (Circus) II Acc. 51.
woodfordtii (Athene) II Str. 12.
" (Ulula) II Str. 12; II Noc. 19.
woodhousei (Cyanocitta) I Cor. 64.
woodpecker (Gold-winged) I Bucc. 66.
wrangeli (Uria) VI U. 21.

X.

xanthocheilus (Charadrius) IV Cur. 50.
" (Pluvialis) " " 50.
Xanthocitta cyanocapilla I Cor. 53.
xanthodactyla (Ardea) V Ar. 12.
xanthogaster (Platycercus) III P. 98.
" (Ptilonopus) IV Col. 11.
xanthogastra (Columba) " " 11.
xanthogenius (Conurus) III P. 18; III P. R. 5.
Xantholaema philippensis I Bucc. 24.
xantholora (Chrysotis) III P. 59.
xantholoro (Amazona) " " 59; III P. R. 28.
xanthonotus (Calyptorhynchus) III P. 155.
" (Oriolus) I Cor. 109.
xanthonyx (Falco) II Fal. 29.
xanthops (Agapornis) III P. R. 31.
" (Amazona) III P. 57; III P R. 27.
" (Psittacula) " " 31.
" (Psittacus) III P. 55, 57.
xanthopterus (Phaeocephalus) III P. R. 10.
xanthorhyncha (Anas) VI A. 43, 59.
xanthorhynchus (Chrysococcyx) I Cuc. 32.
" (Cuculus) " " 32.
xanthorinus (Cygnus) VI A. 81.
xanthothorax (Circaëtus) II Ass. 50.
" (Falco) II Ass. 50; II Acc. 98.
" (Herpetotheres) II Ass. 50.
" (Micrastur) " " 50.
" (Nisus) II Ass. 50; II Acc. 98.
xanthotus (Calyptorhynchus) III P. 155; III P. R. 70.
Xanthoura guatemalensis I Cor. 53.
" peruviana " " 53.
xanthura (Pampusana) IV Col. 162.
Xema brunnicephala VI L. 35.
" brunniceps " " 35.
" collaris " " 44.
" melanocephala " " 43.
" poiocephala " " 37.
" sabinei " " 44.
xenorhyncha (Ciconia) V Cic. 7.
Xenorhynchus australis " " 6.
Xenus cinereus V Sc. 77.
Xiphidiorhynchus pectoralis " " 108.
Xylobucco I Bucc. 47.
Xylocota gigantea V Sc. 8.
" jamesoni " " 8.
" paludosa " " 8.
" stricklandii " " 15.

Y.

yelkuan (Procellaria) VI Proc. 29.
" (Puffinus) " " 29.
Yellow-checked barbet I Bucc. 34.
" necked carrion Crow II Vul. 4.
Ynambu azulato VIII Ti. 23.
" guazu " " 35.
Ynambui " " 42.
Ynambui listado " " 29.
yncas (Corvus) I Cor. 53.
yncas (Cyanocorax) I Cor. 53.
ypecaha (Aramides) V Ra. 14.
" (Rallus) " " 14.
Yuiz do mato I Bucc. 90.
Yulmis VIII Ti. 49.

Z.

zabélé (Pezus) VIII Ti. 33.
Zanclostomus aeneus I Cuc. 50.
" diardi " " 54.
" elongatus " " 55.
" flavirostris " " 50.
" javanicus " " 55.
" viridirostris " " 54.
Zapornia minuta V Ra. 31.
" pygmaea " " 30.
" sandwichensis " " 25, 32.
zebrilus undulatus V Ar. 56.
Zenaida amabilis IV Col. 140.
" auriculata " " 140.
" aurita " " 140.
" (Columba) " " 140.
" gallopagoensis " " 140.
" maculata " " 141.
" pentheria " " 142.
" (Peristera) " " 140.
" ruficauda " " 141.
" stenura " " 142.
Zenaidura carolinensis " " 142.
" marginella " " 142.
zenorhynchus (Larus) VI L. 22.
zeylanica (Megalaima) I Bucc. 34.
zeylanicus (Bucco) " " 34, 36.
zoeae (Carpophaga) IV Col. 91.
" (Columba) " " 91.
" (Zonoenas) " " 92.
Zoenaenas mülleri " " 93.
" pinon " " 94.
Zonaenas radiata " " 93.
zonarius (Falco) II Ass. 47.
" (Micronisus) " " 47.
" (Nisus) II Ass. 47; II Acc. 96.
" (Platycercus) III P. 94; III P. R. 39.
" (Psittacus) " " 94.
zonata (Aquila) II Ass. 12.
zonatus (Charadrius) IV Cur. 28.
Zonibyx modestus " " 48.
zoniventris (Falco) II Acc. 37.
zonocerca (Ulula) II Noc. 19.
Zonoenas rufigaster IV Col. 97.
" zoeae " " 92.
zonorhyncha (Gavina) VI L. 22.
zonorhynchus bruchi (Larus) " " 22.
" mexicanus (Larus) " " 22.
zonothorax (Micrastur) II Acc. 98.
zonura (Musophaga) I Cuc. 79.
" (Schizaerhis) " " 79.
zonurus (Circaëtus) II Acc. 113.
" (Spizaetus) II Ass. 12.
zorca africanus (Scops) II Oti. 20; II Noc. 14.
" asiaticus (Scops) " " 20; " " 14.
" (Scops) " " 19; " " 13.
" (Strix) " " 19.

ADDENDA ET CORRIGENDA.

p. 7, ligne 1 d'en haut, au lieu de *Cebns*, lisez *Cebus*.
" 23, " 22 " " " " " *bartramins*, " *bartramius*.
" 27, " 33 " " " " " *amanonina*, " *amazonina*.
" " " 12 d'en bas, " " " *haematötis*, " *haematotis*.
" " " 3 " " " " " *prêtei*, " *prêtrei*.
" 28, " 8 d'en haut, " " " *amphileusis* " *amphilensis*.
" " " 22 " " " " " *cygnoidcs*, " *cygnoides*.
" 29, " 27 " " " " " *smipalmata* " *semipalmata*.
" 32, " 3 " " " " " *chrysotorqucs*, " *chrysotorques*.
" 38, " 26 " " " " " *dc Mahé*, " *de Mahé*.
" 43, " 8 " " " " " *abyssinicns* " *abyssinicus*.
" 47, entre *carolinensis* (*Conurus*) *et carolinensis* (*Peristera*), ajoutez *carolinensis* (*Pandion*) II Aq. 22.
" 55, ligne 29 d'en bas, au lieu de *lementine*, lisez *Clementine*.
" 56, " 15 d'en haut, " " " *Polophilus*, " *Polophilus*.
" " " 9 d'en bas, " " " *fulvicollis*, " *fulvicollis*.
" 60, " 11 " " " " " *Stephanilyx*, " *Stephanibyx*.
" " " 3 " " " " " *oronoides*, " *coronoides*.
" 71, " 33 d'en haut, " " " *fusens*, " *fuscus*.
" 72, " 6 d'en bas, " " " *poregrinus*, " *peregrinus*.
" 78, " 11 d'en haut, " " " *Stix*, " *Strix*.
" 79, " 29 d'en bas, " " " *supersiliosa*, " *superciliosa*.
" 82, " 24 " " " " " *Misaëtus*, " *Nisaëtus*.
" 86, après *Hieraspiza tinus*, lisez *Hierococcyx leucolophus* I Cuc. 16.
" 87, ligne 20 d'en haut, au lieu de *melanoptcrus*, lisez *melanopterus*.
" 89, " 2 d'en bas, " " " *Porhyrio*, " *Porphyrio*.
" 95, " 25 " " " " " *Hiracococcyx*, " *Hierococcyx*.
" " " 9 " " " " " *Gymn rhina*, " *Gymnorhina*.
" 101, " 20 d'en haut " " " *alayensis*, " *malayensis*.
" 105, " 3 " " " " " *orientalus*, " *orientalis*.
" " après *Merle*, lisez: merlini (Coccygus) I Cuc. 40.
" (Saurothera) " " 40.
" 107, ligne 27 d'en bas, au lieu de *moloxitta*, lisez *moloxita*.
" 108, " 4 " " " " " *Ochtodromus*, " *Ochthodromus*.
" " " 16 " " " " " *Querquednla*, " *Querquedula*.
" 109, " 21 " " " " " *Alula*, " *Ulula*.
" 111, " 4 " " " " " *Misaëtus*, " *Nisaëtus*.
" 115, " 23 d'en haut, " " " *oapa*, " *oopa*.
" 119, " 4 " " " " " *pêcheur*, " *pêcheur*.
" 125, " 23 " " " " " *Ptiloloptis*, " *Ptiloleptis*.
" " " 18 d'en bas, " " " *Puceros*, " *Buceros*.
" 128, " 20 et 21 " " " " " *Psittacella*, " *Psitacella*.
" 136, " 12 d'en haut, " " " *regulis*, " *regalis*.
" 142, " 21 d'en bas, " " " *signapa*, " *siguapa*.
" 144, " 31 d'en haut, " " " *Stephanilyx*, " *Stephanibyx*.
" 145, " 28 " " " " " *aranca*, " *aranea*.
" 150, " 16 d'en bas, " " " *â gorge rousse*, " *à gorge rousse*.